
The image shows the front cover of an antique book. The cover is decorated with a complex marbled paper pattern, featuring swirling veins of grey, blue, and red on a light background. A decorative border in gold tooling runs along the edges of the cover. In the bottom center, there is a rectangular white paper label with black printed text. To the left of the label, the number '286' is handwritten in pencil.

286

FROM  
THE LIBRARY  
OF  
SIR WILLIAM OSLER, BART.  
OXFORD







The "editio princeps" of Celsus.

fine copy  
very rare

00.2.18

NA.4

THE EDITIO PRINCEPS OF CELSUS.

296

Hain 4835

m. 16.

Celsus



CELSUS (AULUS [AURELIUS] CORNELIUS)

53 B. C.-7 A. D.

286. De medicina.

Nicolaus [Laurentii], Florence.

1478.

Sm. folio; sigs. A<sup>8</sup>; [B]<sup>6</sup> a<sup>4</sup> b-i<sup>6</sup> l<sup>6</sup> m-z<sup>6</sup> &<sup>6</sup> aa-gg<sup>6</sup> hh<sup>4</sup>; 196 leaves (one blank); 34 lines; roman characters of 2 sizes; {Firenze, press iv, types 2, 3}; old MS. foliation; headlines (book-nos.); capital spaces with guide-letters.

i<sup>a</sup>; PRIMOLIBRO CORNELII CELSI.||  
DE MEDICINA HAEC CONTINEN-  
TVR:|| 7<sup>b</sup>, l. 37; .FINIT TABVLA. || 9<sup>b</sup>;  
BARTHOLOMEVS [sic] FONTIVS SAX-  
ETTO SVO. S. || 10<sup>a</sup>; CORNELII CELSI  
DE MEDICINA LIBER INCIPIT || 196<sup>b</sup>  
[Colophon]; CORNELII CELSI DE  
MEDICI||NA LIBER FINIT FLOREN||  
TIAE A NICOLAO IM||PRESSVS ANNO||  
SALVTIS M||CCCC L||XXV||III||.

Hain-C. \*4835. Proctor 6116. B. M. Bodl. Inc. Med. 147.


Leaf A8 (blank) missing. Pellechet (her no. 3464) wrongly gives 204 leaves. Sig. on gg1 omitted in this copy. Last sheet numbered hh 2-5. Quire 1 misbound before quire i.

Hain and Pellechet give BARTHOLOMAEVS on leaf 9<sup>b</sup>. The smaller type occurs in the table only. Initials inserted in dull red ink. MS. additions in margins, partly cut away.

This is the editio princeps of Celsus.

On this and other copies bought by Sir W. Osler, or coming under his notice, see no. 7243, p. 17, and his MS. notes in no. 7121, ii, p. 399.







## PRIMO LIBRO CORNELII CELSI.

### DE MEDICINA HAEC CONTINENTVR :

<b>M</b> edicinae inuentio & diuifio : uariaeq; de ea illuftrium medicorum opiniones.	.CHARTA.]	.I.
1 Quemadmodum fanos agere conueniat .		VII
2 Quae ftomacho imbecillis feruanda fint .		VII
3 Obferuationes quaedam prout res nouae accidunt : & corporum genera & fexus & aetates & tempora anni funt .		VIII
4 De iis qui aliqua parte corporis laborant & primum de iis quibus caput in firmum eft.		XI
5 De iis qui lippitudine : grauedine : deftillatione : tōffillifq; laborant.		XII
6 Ad folutam aluum remedia.		
7 Remedia ad coli dolorem .		
8 Quae agenda funt ftomacho laborantibus .		XII
9 Quid obferuandum fit dolore neruorum laborantibus .		XIII
10 Obferuatio inpeftilentia .		XIII

### LIBRO SECVNDO HAEC CONTINENTVR.

1 Quae anni tempora : quae tempeftatum genera : quae partes aetatis : qualia corpora uel tuta uel morbis oportuna funt & quod ualitudinis genus inquo q; timeri poffit.	.CHARTA .	XIII
2 De fignis aduerfae ualitudinis futurae .		XVI
3 Quae bona in aegrotantibus figna funt .		XVI
4 Mala figna aegrotantium .		XVII
5 De fignis longae ualitudinis .		XVII
6 De inditiis mortis .		XVIII
7 De notis quas aliquis in fingulis morborum generibus habere poffit.		XIX
8 Quae notae in quoq; morbi genere uel fpem uel periculum oftendant.		XXII
9 De morborum curationibus .		XXV
10 De fanguinis detractione per uenas .		XXVI
11 De fanguinis detractione per cucurbitulas .		XXVII
12 De deiectione .		XXVIII
13 De uomitu .		XXIX
		.A. i.



14	De frictione.	XXIX
15	De gestatione.	XXX
16	De abstinencia.	XXXI
17	De sudore.	XXXI
18	Qui cibi : potionesue : aut ualentis . aut mediae : aut imbecillae materiae sint	XXXII
19	Quae natura ac proprietas cuiusq; rei sit qua uescimur .	XXXIII
20	Quae res boni succi sint.	XXXIII
21	Quae res mali succi sint.	
22	Quae res lenes . quaeue acres sint .	
23	Quae res crassiores . quae tenuiores pituitam faciunt .	
24	Quae res stomacho idoneae sunt .	XXXIII
25	Quae res alienae stomacho sunt .	XXXV
26	Quae inflant . aut inflationem leuant .	
27	Quae res aut calfaciunt aut refrigerant .	
28	Quae res intus facile uitiantur uel minime corrumpuntur .	
29	Quae res aluum mouent .	XXXV
30	Quae res aluum astringant .	XXXVI
31	Quae res urinam mouent .	
32	Quae res somnum mouent . aut sensus excitant .	
33	Quae res corpus aut erodant / aut reprimant : aut refrigerent . aut calfaciant aut durent . aut emolliant .	XXXVI

### . TERTIO LIBRO HAEC CONTINENTVR .

1	De morborum generibus . . Charta :	XXXVII
2	Quomodo morbi cognoscantur . & an increcant . an consistant / an minuantur & qua ratione ab initio qui languere incipit / curari debeat .	XXXVII
3	De febrium generibus .	XXXVIII
4	De curationum diuersis generibus .	XXXIX
5	De febrium speciebus & singularum curationibus / & primo quando cibus febricitantibus dandus sit .	XLI
6	Quando potiones febricitantibus dari expediat .	XLII
7	Quomodo pestilentes febres curari debeant	XLIII
8	Curatio semitertianae febris . quae hemitracos dicitur .	XLV
9	Curatio lentarum febrium .	XLV
x	Remedia in febribus ad capitis dolorem & praecordiorum inflammationem /	



	& ariditatem & scabritiem linguae.	XLVI
11	Remedia contra frigus quod febrem praecedat.	XLVI
12	Curatio horroris in febribus.	XLVII
13	Curatio quotidianae febris.	
14	Curatio tertianae febris.	XLVII
15	Curatio quartanae febris.	XLVIII
16	Curatio duarum quartanarum.	XLVIII
17	Curatio quotidianae febris : quae ex quartana facta sit.	XLVIII
18	De tribus insaniae generibus : & primo de eius curatione : quae a graecis phrenesis dicitur.	XLVIII
19	Cardiaci morbi curatio.	LI
20	De lethargo & eius curatione.	LII
21	De aqua inter cutem hoc est hydropico morbo.	LIII
22	De tæbe & eius speciebus & curationibus.	LV
23	De comitialis morbi curationibus.	LVII
24	De regii morbi curatione.	LVIII
25	De elephantiae curatione.	
26	De attonitis & eorum curatione.	LVIII
27	De resolutione neruorum : quae apoplexia uel paralyfis dicitur.	LVIII

#### QVARTO LIBRO HAEC CONTINENTVR.

De humani corporis interioribus sedibus.	.CHARTA.	.LX.
De curationibus morborum : qui nascuntur a capite & primo de cephalaea & hydrocephalo eiusque doloribus.		LXII
De morbo qui circa faciem nascitur : quæ graeci cynicū spasmū uocāt.		LXIII
De resolutione linguae.		LXIII
De destillatione ac grauedine.		LXIII
De ceruicis morbis curationibusque.		LXIII
De faucium morbis ac curationibus & primum de angina.		LXV
De difficultate spirandi.		LXV
De tussi.		LXVI
De stomachi morbis & curationibus.		LXVIII
De laterum doloribus.		LXIX
De uiscerum morbis & primo de pulmone.		LXX
De iocineris morbo & curatione.		LXX
De lienis morbo & curatione.		LXXI
De renum morbis & curationibus.		LXXII
	A.ii.	



De intestinorum morbis & primo de cholera.	LXXII
De coeliaco uentriculi morbo.	LXXIII
De tenuioris intestini morbo.	LXXIII
De morbo intestini plenioris.	
De torminibus ; idest dysenteria.	LXXIII
De leuitate intestinorum.	LXXV
De lumbricis aluum occupantibus.	
De tenasmo intestinorum morbo.	LXXV
De uentris fluxu & curatione.	LXXVI
De uuluae morbo & curationibus.	LXXVII
De nimia profusione seminis exnaturalibus.	LXXVIII
De coxarum morbis & curationibus.	
De genuum doloribus & cura.	
De articularum doloribus inmanibus pedibusq.	LXXVIII

. QVINTO LIBRO HAEC CONTINENTVR.

De simplicibus facultatibus quaruncunq; rerum ex quibus medicamenta fiunt ; & primo de iis quae sanguinem supprimunt.	LXXX
Quae uulnus glutinant.	
Quae concoquunt & mouent pus.	
Quae aperiunt uulnera.	LXXX
Quae purgant.	LXXXI
Quae rodunt.	
Quae exedunt corpus.	
Quae adurunt.	
Quae crustas ulceribus inducunt.	
Quae crustas ulceribus resoluunt.	
Quae discutiant ea quae in aliqua parte corporis coierunt.	LXXXI
Quae euocant & educunt.	LXXXII
Quae exasperata leuent.	
Quae carnem nutriunt & ulcus implent.	
Quae molliunt.	
Quae cutem purgant.	
De mixturis simplicium rerum ; & de ratione ponderum ; & quid malagma & emplastrum & pastillus inter se differant.	LXXXII
DE Malagmati & primo malagma aduersu calidas podagras.	LXXXIII
Malagma ad materiam extrahendam.	LXXXIII



Malagma ad iecur dolens.

LXXXIII

Malagma ad lienem.

Malagma ad laterum dolores.

LXXXIII

Malagma Polyarchi ad resoluenda quae astricta sunt; & mollienda quae dura sunt. & digerenda quae coeunt.

LXXXIII

Malagma nilei ad eadem ualens.

Malagma mosci ad molliendum.

Malagma medi ad digerenda quae coeunt.

Malagma Panthemi ad eadem.

Malagma Andreac ad strumam.

Aliud malagma ad idem ualeus.

Malagma ad strumam & phymata.

Malagma ad strumam & tubera & carcinodas.

Malagma protarchi ad parotidas & fauim & mala ulcera. LXXXIII

Malagma aduersus panum: quod phygetron graeci uocant: & phymata.

LXXXV

Malagma aduersus phymata.

Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.

Malagma ad sanguinem supprimendum & phymata.

Malagma ad carcinodas & phymata lenienda.

Malagma ad liuorem faciei contusae.

Malagmata stomachica ad aperiendum.

Niconis malagma ad resoluendum aperiendumque ac purgandum.

Malagma Aristogenis ad ossa & neruos.

Malagma euticlei ad articulos & ad omnem dolorum.

LXXXV

Malagma Sofagorae ad dolores articulorum.

LXXXVI

Chrysippi malagma ad idem ualens.

Clesipontis malagma ad idem ualens & ad parotidas & phymata & strumam.

Malagma ad articulos.

Malagma Aristonis aduersus podagras et recentia phymata et omni dolores.

Theofeni malagma ad pedum dolores.

Numenii malagma ad podagram ceterosque articulos induratos.

Dexii malagma si quando callus in articulis increuit.

DE EMPLASRTIS.

Barbarum emplastrum nigrum quod cruētis protinus uulneribus iniicitur.

Colcon emplastrum nigrum ad idem ualens.

LXXXVI

Pasilicon emplastrum nigrum ad idem.

LXXXVII

Smaragdinum emplastrum ad idem.

LXXXVII

.iiii.



Emplastrum ruffum ad idem.

LXXXVII

Paracollepticum emplastrum ad idem.

Cephalicum emplastrum philotae capiti conueniens.

Emplastrum uiride ad idem ualens.

Tetrapharmacum emplastrum ad pus mouendum.

Enneapharmacum emplastrum ad pus mouendum & ad purgandum ualens.

Attalum emplastrum ad uulnera

Iudaei emplastrum fracto capiti accommodatum.

Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum

LXXXVII

Aliud diadaphnidon ad extrahendum & pus mouendum.

LXXXVIII

Philocratis emplastrum ad extrahendum & pus mouendum.

Rhypodes emplastrum ad extrahendum.

Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

De emplastris exedentibus.

Emplastrum quod exest corpus & ossa resoluit & super crescentem carnem coercet.

Emplastra aduersus morsus & alia recentiora uulnera.

Ethesium emplastrum rubrum ad idem ualens.

Aliud emplastrum ad idem ualens.

LXXXVIII

Leuca emplastra non grauibz uulneribus accommodata & maxime senilibz.

LXXXIX

Elefantinum emplastrum.

Lenia emplastra quas liparas graeci uocant.

Emplastrum lene.

Arcagathi emplastrum lene.

Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.

DEPASTILLIS & primo de iis qui ad recentia uulnera glutinanda sanandaq; apti sunt.

Alius pastillus ad glutinanda uulnera.

De sphragide pastillo: quem polybus confecit: ad glutinandum uulnus.

Pastillus ad ulcera sordida & nigritiem in auribus: naribus obscenis partibus: inflammationesq; eorum.

LXXXIX

Pastillus andronis ad uiam inflamatam & ad naturalia sordida etiam cancro laborantia.

LXXXX

Pastillus ad fissa ani: uel ora uenarum fundentia sanguinem uel cancerum.

LXXXX

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

LXXXX





**DEPESSIS.****LXXXX**

Ad sanguinem euocandum.

Ad uulnam molliendam.

Boeti pessus ad idem ualens.

Ad inflammationem uulvae Numenii pessus.

Ad eiciendum euulua infantem mortuum.

Si mulier uitio locorum concidit qua curatione utendum sit.

De medicamentis quibus aridis utimur.

Ad carnem supercrescentem exedendam.

**LXXXX**Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat: eamque leniter exedendam  
plures compositiones.**LXXXXI**

Hierae compositio.

Iudaei compositio.

Iollae compositio.

Ad sanguinis profluvia uel ex membrana cerebri uel aliis locis et ad can-  
crum & ad inducendam cicatricem et ad coercendam carnem crescentem.

Timei compositio ad ignem sacrum uel ad cancerum.

Ad sternutamenta excitanda.

Gargarizationes quibus fieri debeant.

**LXXXXI**

De antidotis et quibus malis opulentur.

**LXXXXII**

Compositio antidoti.

Aliud antidotum ambrosia nominatum: quod Sopyrus ptolaemco regi  
composuit.

Antidotum Mithridatis.

**DE ACOPIIS.**

Acopum neruis utile.

Acopum elaeodes neruis utile.

**LXXXXII**

Enchirista ad ulcera purganda et implenda.

**LXXXXIII**

Ad sacrum ignem.

**DE CATAPOTIIS**Catapotium ad somnum accersendum et leuationem doloris et simul ad con-  
coquendum.

Catapotium ualentius ad somnum.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Catapotium aliud ad multa ualens.

Catapotium ad inducendum somnum quod uulua dolens phibuit.

**LXXXXIII**

Adiecur sanandum

**LXXXXIII**

Ad finiendos dolores lateris.

Ad thoracis dolores finiendos.

Catapotium Anthenionis ad tussim.

**LXXXXIII**

A. iiii.



Catapodium Heraclidis tarentini ad tussim & somnum.	LXXXXIII.
Catapodium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.	
Collige Cassii medici.	
Adiuuantem mortuum aut secundas expellendas.	
Laborantibus ex partu quid dari debeat.	
Ad adiuuandam uocem.	
Aduersus difficultatem urinae.	
Asteriaces compositio quomodo fiat.	
De quinque generibus noxarum corporis : & primo deuulneribus : quae maxime per tela inferuntur.	LXXXXIII.
Quae uulnera insanabilia sint.	LXXXXV.
Quae uulnera difficilem curationem habeant.	
Quae uulnera tutiorem curationem habeant.	
Observationes quaedam & aetatis & corporis & uitae & temporis inuulneribus.	LXXXXV.
Signa percussi cordis.	LXXXXVI.
Signa pulmonis icti.	
Signa iocineris uulnerati.	
Signa percussorum renium.	
Signa uulnerati lienis.	
Signa percussae uuluae.	
Signa percussi cerebri uel membranae eius.	
Signa percussi stomachi.	
Signa ieiuni intestini & uentriculi uulnerati & aliorum intestinorum.	
Signa percussae medullae quae in spina est.	
Signa septi transuersi percussi.	
Signa uesicae uulneratae.	LXXXXVI.
De sanguine & sanie & pure : & eorum speciebus : quandoque meliora / deterioraue sint.	LXXXXVII.
Curatio aduersus profusionem sanguinis inuulneribus.	LXXXXVII.
Curationes aduersus uulnerum inflammationes.	LXXXXVIII.
De glutinatione uulnerum.	LXXXXVIII.
Quo modo uulnus ligari conueniat.	LXXXXVIII.
De ratione uictus & notis uulnerum : curationibusque eorum.	LXXXXVIII.
Curationes propriae articularum.	.C.
Vulnus quomodo purgandum est.	.C.
Quomodo uulnus implendum est.	.C.
De uulneribus : quae extrinsecus per uulnera incident : curationibusque eorum.	.CI.
Curatio ulceris.	.CI.



Curatio erisipelorum.	.CI.
Curatio gangrenae.	.CII.
Quomodo cicatrix uulneri inducenda purgandaq; sit.	.CII.
De uulneribus; quae per morsus inferuntur; eorumq; curationibus.	.CIII.
Curatio aduersus rabificantis morsum.	.CIII.
Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.	.CIII.
Speciales curationes aduersus ictus serpentium & primo aduersus ictus aspidis.	.CIII.
Aduersus ictum scorpionis.	
Aduersus aranei & scorpionis ictum.	
Aduersus chelydri ictum & Cerastis.	.CIII.
Aduersus phalangii ictum.	.CV.
Aduersus ictus italorum anguium; qui minus terribiles peregrinis sunt.	
Remedium generale aduersus omnia uenena; & primo aduersus cantharidas.	
Aduersus cicutam.	
Aduersus hyoscyamum.	
Aduersus caerulam.	
Aduersus sanguisugam si epota est; & lac quod intus coit.	
Aduersus fungos inutiles.	
De adustis corporis locis & quomodo curari debeant.	.CV.
De interioribus ulceribus; quae aliqua corporum parte corrupta nascuntur.	.CVI.
De carcinomate & eius curatione.	.CVI.
De theriomate & eius curatione.	.CVII.
De sacro igne & eius curatione.	.CVII.
De chironeo ulcere & eius curatione.	.CVIII.
De ulceribus; quae ex frigore in pedibus & manibus oriuntur & eorum curationibus.	.CVIII.
De struma & eius curatione.	.CVIII.
De furunculo & eius curatione.	.CIX.
De phymate & eius curatione.	.CIX.
De phlygetro & eius curatione.	.CIX.
De fistulis & earum generibus & curationibus.	.CX.
De melicera.	.CXI.
De achrocordone & Thymio & Myrmetio & clauo; curationibusq; eorum.	.CXII.
De pustularum generibus & earum curationibus.	.CXII.
De scabie & eius curatione.	.CXIII.
De impetiginis speciebus & curationibus.	.CXIII.
De papulis & earum curationibus.	.CXIII.



Deustilliginis speciebus: idest de 'Alpho & Mela & Lence & earum curatione. CXIII.

**SEXTO LIBRO HAEC CONTINENTVR.**

Deuitiis singularium corporis partium & primo decapillis fluentibus. CXV.

Deporrigne & eius curatione.

De sycosi & eius curatione.

De areis & earum curationibus. CXV.

De uaris & lenticulis & ephelide & eorum curationibus. CXVI

De oculorum morbis curationibusq; eorum: et primo de iis morbis: qui lenibus medicamentis curantur. CXVI

De diuersis oculorem colliriis. CXVII

Philonis collirium. CXVIII

Dyonisi collirium.

Cleonis collirium.

Theodoti collirium acharistum appellatum.

Cythion uel Tephion collirium.

Euelpidis collirium trygodes nominatum. CXVIII

Nilei collitium omnium optimum. CXIX

De carbunculis oculorum & eorum curatione. CXIX

De pustulis oculorum & curatione eorum. CXX

Phylactos collirium ad pustulas oculorum.

De ulceribus oculorum & eorum curatione et de diabalanu collirio.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Depediculis palpebrarum.

De oculorum grauioribus morbis: qui ex inflammationibus oriuntur: et ualidioribus medicamentis curantur: et de Andreae collirio et de diacera to. CXX

Memigmenoneuelpidis collirium. CXXI

De oculorum ulceribus supercrescentibus: sordidis: cauis: ueteribus: et decurationibus singulorum.

Smilion collirium.

Phinon collirium euelpidis.

Sphaerion collirium Euelpidis.

Liquidum euelpidis collirium.

De cauis oculorum ulceribus et curationibus.

Hermonis collirium.

De cicatricibus oculorum: quae ex ulceribus factae sunt: et quomodo cura CXXI



ri debeant : & de Asclepia & Canopite & pixinio colliriis	CXXI
De alio genere inflammationis oculorum.	CXXII
Caesarianum collirium.	
Hieracis collirium.	
De xerophthalmia genere lippitudinis .	
Rhinton collirium.	CXXII
Ad oculos scabros colliria.	CXXIII
Ad cartilaginem oculorum : quae propter lippitudinem oritur : remedia & colliria.	
Diacrocu collirium.	
Ad cartilaginem oculorum : quae propter senectutem aut aliam imbecillitatem fit .	
De suffusione oculorum : quae hypochylis dicitur.	
De resolutione oculorum : quae paralysis dicitur.	CXXIII
De mydriasi oculorum.	CXXIII
De imbecillitate oculorum.	
Ad oculos qui extrinsecus offenduntur : cum sanguine suffusi sunt .	
De aurium morbis & curationibus.	CXXIII
Aduersus aurium uermes.	CXXVI
Ad compressa aurium foramina.	
Ad grauem auditum.	
Ad sonitum aurium intra se ipsas.	CXXVI
Ad ea quae in aurem inciderunt extraehenda.	CXXVII
De narium morbis et curationibus .	CXXVII
De dentium dolore & curationibus .	CXXVIII
De Tonsillis & earum cura.	CXXIX
De oris ulceribus & curationibus & quae antherae sint .	CXXIX
De linguae ulceribus .	CXXX
De Parotidibus gingiuarum tuberculis : De quae aliis ulceribus gingiuarum.	CXXX
De uuae morbo & curatione .	CXXXI
De cancro oris.	CXXXI
De parotidibus quae sub auribus oriuntur .	CXXXII
De umbilici prominentis curatione.	
De obscenarum partium uitii & curationibus .	
De colis morbis & curationibus.	CXXXII
De cancri qui in cole nascitur curatione.	CXXXIII
De phagaedenae incole nascentis curatione.	CXXXIII



De carbunculo qui incole nascitur.	CXXXIII
De testiculorum morbis & eorum curatione.	
De ragadiis.	
De condilomate.	CXX XIII.
De haemorrhoidis.	CX XXV
Si anus uel os uuluae procidit qua curatione utendum sit.	
De ulcere fungo simili inano.	
De digitorum ulceribus.	CX XXV

.SEPTIMO LIBRO HAEC CONTINENTVR.

De chirurgica & qui in ea claruerint : & qualis esse chirurgus debeat : & quid hoc in libro describatur.	CXXXVI
De luxatis. .i. <i>sua loca dimotis</i>	CX XXVII
De iis quae per se intumescunt quomodo excidenda & curanda sunt.	.CXXXVII
De bonis malisque signis exulceratorum.	CXXXVIII
De fistulis.	
De anifistulis.	CXXXVIII
De talis e corpore extrahendis	CXL
De gangliis & meliceride & heromate & steathomate capitis tuberculis.	CXLI
De oculorum uitiiis : quae scalpello & manu curantur.	CXLII
De crithe tuberculo palpebrarum.	
De chalazia palpebrarum.	
De ungue oculorum : quod pterigion a graecis uocatur.	CXLII
De enchati tuberculo.	CXLIII
De ancyloblepharo oculorum uitio.	
De aegylopa fistula oculorum.	CXLIII
De pilis palpebrarum oculum irritantibus.	CXLIII.
De glaucophthalmo oculorum.	CXLIII
De ectropio.	CXLV
De staphylomate oculi.	
De clauis oculorum.	
De natura oculorum & de eorum suffusione.	CXLV
De pituita oculorum.	CXLVI
De aurium morbis qui manu & scalpello curantur.	CXLVII
Curta in auribus labrisque ac naribus quomodo sarciri & curari possint.	



De polypi curatione per ferrum.	CXLVIII
De Ozena.	CXLVIII
De oris uitiiis quae manu & ferro curantur & primododentibus.	CXLVIII
De uua.	CL
De lingua.	
De abscessu sub lingua.	
De labris.	
De ceruicis uitiiis & curatione.	
De umbilici uitiiis.	CL
Quomodo aqua hydropicis emittatur.	CLI
De intestinorum uulneratorum curationibus.	CLII
De interiore parte abdominis rupta: & qua ratione curanda sit.	CLIII
De uaricibus uentris.	
De testiculorum natura & morbis eorum.	CLIII
De testiculorum curationibus communibus: & primo de incisione & curati	
one inguinis uel scroti.	CLIII
De intestini curatione.	CLVI
De omenti curatione.	CLVII
De ramicis curatione.	CLVII
De carne: quae inter tunicas testiculorum concreuit: et de neruo indura	
to.	CLVIII
De ramice inguinis.	
Ad tegendam glandem colis si nuda est.	CLVIII
Quomodo glans penis contestata aperiri possit.	CLVIII
Infibulandi ratio.	
De urinae reddendae difficultate et decalculo curationihusq; eorum.	
Quae curatio calculosis adhibeatur.	CLVIII
Signa calculorum uel harenosorum uel mollium.	CLXI
De calculis foeminarum.	CLXI
Quae curatio calculo euulso habenda sit.	CLXII
De cancro qui excisa uesica nascitur: et qua curatione uti deceat.	
	CLXIII
Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt quomodo curari conue	
niat.	CLXIII
Qua curatione partus emortuus ex utero excutiat.	CLXIII
De ani uitiiis et eorum curatione.	CLXV
De condilomatum curatione.	CLXVI
De uaricum curatione.	CLXVI.



Curatio digitorum coherentium .  
De cangrenae curatione .


CLXVII  
CLXVII

.OCTAVO LIBRO HAEC CONTINENTVR.,

De positu & figura totius humani corporis .	CHRTA CLXVII
Ossa uitiata & corrupta qbus signis cognoscant & q curatōe curētur .	CLxx
Quomō os excidatur & de modiolō & terebra ferrametis ad id patis .	CLxxI
De caluariæ curatione .	CLXXII
De narium fractarum curatione .	CLXXV
De aurium fractarum curatione .	CLXXVI
De maxillae fractae curatione ; deq quibusdam ad omnia ossa pertinenti bus	CLXXVI
De iuguli fracti curatione .	CLXXVII
De costarum fractarum curatione .	CLXXVII
De spinæ curatione .	CLXXVIII
De humerorum ; brachiorum ; femorum ; crurum ; digitorumq fractorum uel euulforum communibus curationibus .	CLXXVIII
De fracti humeri curatione .	CLXXIX
De brachii fracti curatione .	CLXXX
De crurum femorumq fractorum curatione .	
De fracti digiti curatione .	
Communes curationes ad humeros ; brachia ; crura ; femina ; digitosq con fractos pertinentes .	CLXXX
De luxatis ossibus .	CLXXXI
De maxillae luxatae curatione .	CLXXXIII
De capite luxato .	
De spina luxata .	CLXXXIII
De humero luxato .	CLXXXIII
De cubiti luxati curatione .	CLXXXV
De manu luxata .	
De palma .	
De digitis .	
De femore .	CLXXXV
De genu .	CLXXXVI
De talo .	CLXXXVI
De planta .	CLXXXVII
De digitis .	CLXXXVIII

.FINIT TABVLA.







BARTHOLOMEVS FONTIVS SAXETTO SVO.S.

Ex omnibus ingenii monumentis nullum Saxette latius / aut aeternius litterarum inuentione consensu omnium reperitur. Nam cum humanae memoriae sempiterna monumenta litterae sint: nisi eas primum aegyptii repperissent: deinde Cadmus ephoenicia ingraeciam: mox Euander & Demaratus initaliam transtulissent: quaecunque maiores nostri fecerunt / iam pridem in occulto laterent. Animorum enim nostrorum sensus rerumque gestarum historiam exprimunt: & ut quaecunque uel iuenta uel facta sunt / ita effingunt posteritati que transfundunt. Summis itaque laudibus in primis inuentores litterarum sunt prosequendi: deinde etiam librorum impressores non negligendi. Nam cum sua industria & labore antiquis ac nouis scriptoribus aeternitatem concedant: studiosisque uiris in magna librorum copia utilitatem non parua ferant: meritam laudem referre debent. Ab his ego: ut multorum utilitati consulerem: Cornelii Celsi scriptoris grauissimi atque eloquentissimi de medicina libros imprimendos curauimus. In quibus tanta fide & diligentia usus sum ut manes Cornelianos nobis gratiam habituros: cunctos autem medicinae ac litterarum percipidos certe acturos existimem. Nam cum eius libri pluribus essent in locis temporum iniuria mutilati atque iuncti: uetustis exemplaribus tua opera e gallia conquisitis in unum omnia saepius conferens in antiquum ferme statum redegi. Celsum igitur squallidum antea & deformem / renouatum nunc & iam prope in suam faciem restitutum obeam maxime causam ad te mitto: ut cum particeps mecum in eo corrigendo laboris fueris: in eodem nunc meliore comptiore que hospite relegendo partem etiam capias uoluptatis. Vale.



# CORNELII CELSI DE MEDICINA LIBER INCIPIT

**V**T alimēta sanis corporibus agricultura: sic san-  
nitatem aegris medicina promittit. Haec nusq̃  
quidem nō est. Siquidem etiam imperitissimae  
gētes herbas / alia que prōpta in auxiliū vulne-  
rū / morborū que nouerūt. Verūtamen apud græ-  
cos aliquanto magis q̃ in ceteris nationibus ex-  
culta est. ac ne apud hos quidē a prima origine: sed paucis ante  
nos saeculis: ut pote cum uetustissimus auctor Aesculapius cele-  
bretur. Qui quoniam adhuc rudem & uulgarem hanc scientiam  
paulo subtilius excoluit: indeorum numerum receptus est. Huius  
deinde duo filii Podalirius & Machaō bello troiano ducem Aga-  
memnonē secuti non mediocrem opem commilitonibus suis attu-  
lerunt. Quos tamen Homerus nō in pestilentia: neq̃ inuariis ge-  
neribus morborum aliquid attulisse auxilii: sed uulneribus tantū  
modo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex  
quo apparet has partes medicinæ solas ab his esse tentatas: easq̃  
esse uetustissimas. Eodem uero auctore disci potest morbos tum  
ad iram deorum immortalium relatos esse: & ab iisdem opem po-  
sci solitam. Veri que simile est inter non nulla auxilia aduersæ  
nauitudinis plerūq̃ tamē eam bonam cōtigisse ob bonos mores:  
quos neq̃ defidia / neque luxuria uitiant. Siquidem hæc duo /  
corpora prius ingræcia: deinde apud nos afflixaerunt. Idcirco que  
multiplex ista medicina / neq̃ olim / neq̃ apud alias gentes neces-  
saria / uix aliquos ex bonis ad senectutis p̃cipia perducit. Ergo  
etiā post eos / de quibus rettuli nō nulli clari uiri medicinam ex-  
ercuerunt: donec maiore studio litterarum disciplina agitari coe-  
pit. quæ ut animo p̃cipue ōnium necessaria / sic corpori inimi-  
ca est. Primōq̃ medendi scientia / sapientiæ pars habebatur: ut &  
morborum curatio & rerum naturæ contemplatio sub iisdem  
auctoribus nata sit. Scilicet iis hanc maxime requirentibus: qui

*Aesculapius*

*Podalirius &  
Machaon.*

*Quid boni mores ad uir-*

*Litterarum disciplina ut animo  
sic corpori inimica.*



corporum suorum robora in quieta cogitatione / nocturna que uigilia minuerant. Ideo que multos ex sapientiae professoribus peritoseiusfuisse accepimus. Clarissimos uero ex iis Pythagoram & Empedoclem & Democritum. Huius autem / ut quidā crediderūt / discipulus Hippocrates couis / primus quidem ex omnibus memoria dignus ab studio sapientiae disciplinam hanc separauit / uir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles caristiū : deinde Praxagoras & Chrysippus : tum Herophilus & Erasistratus sic artem hanc exercuerunt : ut etiam indiuerfas curandi uias processerint. Iisdem que temporibus intres partis medicina diducta est : ut una esset quæ uictu : altera quæ medicamentis : tertia quæ manu mederetur. Pri mam diaeteticam : secundam pharmaceuticam : tertiam chirurgicam græci nominauerunt. Eius autē / quæ uictu morbos curat longe clarissimi auctores etiam altius quaedam agitare conati rerum quoque naturae sibi cognitionem uendicauerunt : tanquam sine ea trunca & debilis medicina esset. Post quos Serapion primus omnium nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus / inusu tantum & experimentis eam posuit. Quem Apollonius & Glaucias & aliquanto post Heraclides tarentinus & aliqui non mediocres uiri secuti ex ipsa professione se empiricos appellauerunt. Sic in duas partis ea quoque / quæ uictu curat / medicina diuisa est : aliis rationalem artem : aliis usū tantū sibi uendicantibus : nullo uero quicquid post eos / qui supra cōprehensi sunt / agitante / nisi quod acceperat : donec Asclepiades mendendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoque quaedam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime uiros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinae partibus ut difficillima : sic etiam clarissima ē ea : quæ morbis medetur : ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est : quod alii sibi experimentorum tantummodo noticiam necessariam esse contendunt : alii nisi corporum rerum que ratione comperta non satis potentem usū esse proponunt : indicandum est quæ maxime ex utraque parte dicantur : quo facilius nostra quoque opinio iterpo

agoras.

Diocles & Democritus

Hippocrates Couis.

Diocles.

Praxagoras & Chrysippus

Herophilus & Erasistratus.

Medicina Triis in partes diducta

Dieta.

Pharmaceutica.

Chirurgica.

Apion

Apollonius & Glaucias

Heraclides Tarentinus

Empirici.

Asclepiades.

Themison



## PRIMVS

ni possit. Igitur hi qui rationalem medicinam profitentur: hæc necessaria esse proponunt: abditatum & morbos continentium causarum noticiam: deinde euentium: post hæc etiam naturalium actionum: nouissime partium interiorum. Abditas causas uocant in quibus requiritur ex quibus principiis nostra corpora sint: quid secundam: quid aduersam ualitudinem faciat. Neque enim credunt posse eum scire quomodo morbos curare conueniat: qui unde hi sint, ignoret. Neque esse dubium / quin alia curatione opus sit: si ex quattuor principiis uel superans aliquid uel deficiens aduersam ualitudinem creat: ut quidam ex sapientiae professoribus dixerunt. alia si in humidis omne uitium est: ut Herophilo uisum est. alia si in spiritu: ut Hippocrati. alia si sanguis in eas uenas / quæ spiritui accommodatæ sunt: transfunditur & inflammationem quam græci phlegmone nominant: excitat: ea quæ inflammatio talem motum efficit / qualis in febre est: ut Erasistrato placuit. alia si manantia corpuscula per inuisibilia foramina subsistendo iter claudunt: ut Asclepiades contendit. Eum uero recte curaturum / quæm prima origo causæ non fefellerit. Neque uero inficiantur experimenta quod esse necessaria. Sed ne adhuc quidem aditum fieri potuisse / nisi ab aliqua ratione contendunt. Non enim quidlibet antiquiores uiros ægris inculcasse / sed cogitasse quid maxime conueniret: & id usu explorasse / quod ante coniectura aliqua duxisset. Neque interesse an nunc iam pleraque explorata sint: si a consilio tamen coeperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Sæpe uero etiam noua incidere genera morborum: in quibus nihil adhuc usus ostenderit. Et ideo necessarium sit animaduvertere unde ea coeperint / sine quo nemo mortalium reperire possit / cur hoc quod illo potius utatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas causas persequuntur. Euidentes uero has appellant: in quibus quærent initium morbi: calor attulerit an frigus: fames an satietas: & quæ similia sunt. Occursurum enim uitio dicunt eum qui originem non ignorat. Naturales uero corporis actiones appellant per quas spiritum trahimus & emittimus: cibum potionem quæ & assumimus & concoquimus. Itaque per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur

*Medicinæ rationalis*

*Abditæ causæ*

*Euidentes causæ*

*Naturæ corporis actiones*



Tum requirunt etiam quare uenæ nostræ modo submittant se : modo attollant. quæ ratio somni / quæ uigiliæ sit . Sine quorum noticia neminē putant uel occurrere : uel mederi morbis inter hæc nascentibus posse. Ex quibus q̄ maxime pertinere ad rem concoctio uidetur. Huic potissimum insistent : & duce alii Erasistrato atteri cibum in uentre contendunt. alii Plistonico Praxagoræ discipulo putrescere. alii credunt Hippocrati p̄ calorem cibos concoqui. Accedunt quæ Asclepiadis aemuli : qui omnia ista uana & superuacua esse proponunt. Nihil enim cōcoqui : sed crudam materiā sicut assūpta est incorpore ñe diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant . Illud uero cōuenit : alium dandum cibum laborantibus / si hoc : aliud / si illud uerum est. Nam si teritur itus : eum quærendum esse / qui facillime teri possit . Si putrescit : eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit : eum qui maxime calorem moueat. At nihil ex his esse quærendum / si nihil concoquitur. Ea uero sumenda : quæ maxime manent qualia assūpta sunt. Eademq̄ ratione cum spiritus grauis est : cum somnus aut uigilia urget : eum mederi posse arbitrantur : qui prius illa ipsa qualiter eueniant perceperit. Præter hæc cum in interioribus partibus & dolores & morborum uaria genera nascantur : neminem putant his adhibere posse remedia : quæ ipse ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum : eorumq̄ uiscera atque intestina scriptari. longe quæ optime fecisse Herophilum & Erasistratum : qui nocentes homines a regibus ex carcere acceptos / uiuos inciderint : Considerarint quæ etiā spiritu remanente / ea quæ natura ante clausisset : eorumq̄ posituram : colorem : figuram : magnitudinem : ordinem : duritiem : molliem : liuorem : cōtactum : processum deinde singulorum & recessus : & siue quid inseritur alteri : siue quid partem alterius in se recipit. Neq̄ enim cum dolor intus incidit : scire quid doleat eum : qui qua parte quodq̄ uiscus intestinum ue sit / non cognouerit . Neque curari id quod ægrum ē posse ab eo : qui quid sit / ignoret. Et cum per uulnus alicuius uiscera patefacta sunt : eum qui sane cuiusq̄ colorem partis ignoret / nescire quid integrum / quid corruptum sit. Ita ne succur

ora incidit ac p̄feruari

uiuos incidit



rere quidem posse corruptis. Aptius que extrinsecus imponi remedia compertis interiorum et sedibus & figuris / cognita que eorum magnitudine. Similes que omnia quæ posita sunt rationes habere. Neque esse crudele sicut plerique proponunt / hominum nocentium & horum quoque paucorum suppliciis remedia populis innocentibus saeculorum omnium quæri. Contra ii / qui se empiricos ab experientia nominant euidentes quidem causas ut necessarias amplectuntur. Obscurarum uero causarum & naturalium actionum quæstionem ideo superuacuum esse contendunt / quoniam incomprehensibilis natura sit. Non posse uero comprehendere: patere ex eorum / qui de iis disputarunt / discordia: Cum de ista re / neque inter sapientiarum professores / neque inter ipsos medicos conueniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat / quàm herophilo? Cur huic potius / quàm Asclepiadi? Si rationes sequi uelit: omnium posse uideri non improbables. Si curationes: ab omnibus his aegros perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputationi / neque auctoritati cuiusque / fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiarum studiosos maximos medicos esse / si ratiocinatio hoc faceret. nunc illis uerba superesse: deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorum / genera medicinae: & aliud opus esse romae: aliud in aegypto: aliud in gallia. Quod si morbos eae causae facerent / quæ ubique eadem essent: remedia quoque ubique eadem esse debuissent. Saepe etiam causas apparere: ut puta lippitudinis / uulneris: neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subiiciat euidens causa: multo minus eam posse subiicere / quæ indubio est. Cum igitur illa incerta / incomprehensibilis sit: a certis potius & exploratis petendum esse praesidium: id est his / quæ experientia in ipsis curationibus docuerit: sicut in caeteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem / aut gubernatorem disputatione / sed usu fieri. Ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere / eo quoque disci: quod qui diuersa de his senserint: ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse / quia non ab obscuris causis / neque a naturalibus actionibus: quæ apud eos diuersæ erant: sed ab experimentis pro ut cuique responderant: medendi

*Empirici ab experientia*

*Nam comprehendere non posse*



## LIBER

uias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quaestionibus dedu-  
 ctam esse medicinam: sed ab experimentis. Aegrorum enim qui  
 sine medicis erant / alios propter auditatem primis diebus pro-  
 nus cibum assumpsisse: alios propter fastidium abstinuisse: leua-  
 tum que magis eorum morbum esse / qui abstinerant. Item que a  
 lios in ipsa febre aliquid edisse: alios paulo ante eam: alios post re-  
 missionem eius. optime deinde his cessasse / qui post finem febris  
 id fecerint. Eadem que ratione / alios inter principia protinus usos  
 esse cibo pleniore: alios exiguo: grauiore que eos factos / qui se  
 implerent. Hæc / similia que cum quotidie inciderent: diligentes  
 homines notasie quae plerumque melius responderent: deinde aegro-  
 tantibus ea praecipere coepisse. Sic medicinam ortam / sub inde a  
 liorum salute / aliorum interitu pernitiola discernentem a saluta-  
 ribus. Repertis deinde iam remediis homines de rationibus eorum  
 differere coepisse: nec post rationem / medicinam esse inuentam:  
 sed post inuentam medicinam / rationem esse quaesitam. Require-  
 re etiam si ratio idem doceat quod experientia / an aliud. Si idem /  
 superuacuum esse. Si aliud / etiam contrariam. Primo tamen re-  
 media exploranda summa cura fuisse. nunc uero iam explorata  
 esse: neque ulla / aut noua genera morborum reperiri: aut nouam  
 desiderari medicinam. Quod si iam incidat mali genus aliquod  
 ignotum: non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum ob-  
 scuris: sed eum protinus uisurum / cui morbo id proximum sit: ten-  
 taturumque remedia similia illis / quae uicino malo saepe succurre-  
 rint: & per eius similitudinem opem reperturum. Neque .n. se di-  
 cere consilio medicum non egere: & inrationale animal hanc ar-  
 tem posse praestare: sed has latentium rerum coniecturas ad rem  
 non pertinere: quia non intersit / quid morbum faciat: sed quid  
 tollat. Neque ad rem pertineat quomodo: sed quid optime dige-  
 ratur: Siue hac de causa concoctio incidat / siue de illa: & siue co-  
 coctio sit illa / siue tantum digestio. Neque quaerendum esse quo-  
 modo spiritum: sed quid grauem / tardum que spiritum expediat.  
 Neque quid uenas moueat: sed quid quaeque motus genera signi-  
 ficient. Hæc autem cognosci experimentis: & in omnibus eiusmo-



di cogitationibus inutranq; partē differi posse. Itaq; ingenium & facundiam uincere: morbos autem non eloquentia / sed remediis curari. Quæ si quis elinguis / usu discreta bene norit: hunc aliquāto maiorem medicum futurum: q̄ si sine usu linguam suam excoluerit. Atq; ea quidem / de quibus est dictum / superuacua esse tantummodo. Id uero quod restat etiam crudele: uiuorum hominum alium atq; præcordia incidi: & salutis humanæ præsidem artem non solum pestem alicui / sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum præsertim ex his / quæ tanta uiolentia quærantur / alia non possint omnino cognosci: alia possint etiam sine scelere. Nam colorem: liuorem: molliem: duritiem: similia que omnia non esse talia inciso corpore / qualia integro fuerint. quia cum corporibus inuiolatis: hæc tamen metu: dolore: inedia: cruditate: lassitudine: mille aliis mediocribus affectibus sæpe mutantur: multo magis uerisimile est interiora: quibus maior mollities / lux ipsa noua sit: subgrauissimis uulneribus & ipsa trucidatione mutari. Neq; quicq; esse stultius / q̄ quale quidq; uiuo homine est: tale existimare esse moriente / immo iam mortuo. Nam uterū quidem qui minus adrem pertineat spirante homine posse diduci? Simulatq; uero ferrum ad præcordia accessit: & discissum transuersum septum est: quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit (diaphragma græci uocāt) hominem protinus animā amittere. Ita demum mortui præcordia & uiscus omne inconspicuum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse / quale mortui sit / non quale uiui fuit. Itaq; consequi medicum: ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat qualia uiui uiscera habeamus. Siquid tamen sit / quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur: id sæpe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem inharena: uel militem inacie: uel uiatorem a latronibus exceptum sic uulnerari / ut eius interior aliqua pars aperiatur: & in alio alia: ita sedem: positum: ordinem: figuram: similia que cognoscere prudentem medicum non caedem / sed sanitatem molientem: id que per misericordiam discere / quod alii dira crudelitæ cognouerint. Ob hoc ne mortuorum quidem laterationem ne

*Diaphragma*



cessariam esse. Quae & si non crudelis: tamen foeda sit: cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quantum uero inuiuis cognosci potest ipsa curatio ostendat. Cum haec per multa uolumina / perque magnae contentionis disputationes a medicis saepe tractata sint atque tractentur: subiiciendum est quae proxima uero uideri possint. Ea neque addicta alterutri opinioni sunt: neque ab utraque nimium abhorrentia: media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet sine ambitione uerum scriptantibus: ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae uel secundam ualitudinem praestent: uel morbos excitent: quomodo spiritus / aut cibus uel detrahatur uel digeratur: ne sapientiae quidem professores scientia comprehendunt: sed coniectura persequuntur. Cuius autem rei non est certa notitia: eius opinio certum reperire remedium non potest. Verum quae est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre / quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia: tamen eas adiuuat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio quamuis non faciat medicum aptiorem: tamen medicinae reddit profectum. Veri quae simile est & Hippocratem & Erasistratum / & quicumque alii non contenti febres & ulcera agitare / rerum quoque naturam ex aliqua parte scriptati sunt: non ideo quidem medicos fuisse: uerum ideo quoque maiores medicos excitasse. Ratione uero opus est ipsi medicinae: & si non inter obscuras causas / neque inter naturales actiones: tamen saepe. Est. n. haec ars coniecturalis: neque respondet ei plerumque non solum coniectura / sed etiam experientia. Et interdum non febris / non cibus / non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius / sed aliquando / morbus quoque ipse nouus est: quem non incidere / manifeste falsum est: cum aetate nostra quaedam ex naturalibus partibus carne prolapsa & arente / intra paucas horas expirauerit: Sic ut nobilissimi medici / neque genus mali / neque remedium inuenerint. Quos ego nihil tentasse iudico: quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua uoluerit: ne occidisse / nisi seruasset: uideretur. Veri tamen simile est: potuisse aliquid cogitare detracta

*Ad fir. medicina. Attende*



.PRIMVS.

si uerecundia: & fortasse responsurum fuisse id quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinæ genus neque semper similitudo aliquid confert: & si quando confert: tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera & morborum & remediorum cogitare / quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit / medicus aliquid oportet inueniat: quod non utique fortasse / sed sæpius tamen etiã respondeat. Petet autem nouum quoque consilium non ab rebus latentibus (istæ enim dubiæ & incertæ sunt: ) sed ab his quæ explorari possunt: idest euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum: an sitis: an frigus: an calor: an uigilia: an fames fecerit: an cibi / uini quæ abundantia: an intemperantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet / quæ sit ægri natura: humidum magis / an magis siccum corpus eius sit: ualidi nerui an infirmi: frequens aduersa ualitudo an rara. ea quæ cum est: uehemens esse soleat / an leuis: breuis / an longa. Quod is uitæ genus sit secutus: laboriosum / an quietum: cum luxu / an cum frugalitate. Exiis enim / similibus quæ sæpe curandi noua ratio ducenda est. Quauis ne hæc quidem sic præteriri debent / quasi nullam controuersiam recipiant. Nam & Erasistratus non ex iis fieri morbos dixit: quoniã & alii & iidem alias / post ista non febricitarent: & quidam medici sæculi nostri sub auctore: ut ipsi uideri uolunt: Themisone contendunt nullius causæ notitiam quicquid ad curationes pertinere: satis quæ esse quædam cõmunia morborum intueri. Siquidem horum tria genera esse: unum adstrictum: alterum fluens: tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros: modo nimium: modo alia parte parum: alia nimium. Hæc autem genera morborum / modo acuta esse: modo longa: & modo increfcere: modo cõsistere: modo minui cõsuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est: si corpus adstrictum est / digerendum esse: si profluuio laborat / continendum: si mixtum uitium habet / occurrendum subinde uehementiori malo. & aliter acutis morbis medendum: aliter uetustis: aliter incrementibus: aliter substituentibus: aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obseruationem medicinam esse. quam ita finiunt / ut quasi

*Themison.*



ados.

uiam quandam: quam methodon græci nominant. eorum quæ /  
 quæ in morbis communia sunt / contemplatricem esse cōtendunt:  
 ac neq; rationalibus se / neq; experimenta tantum spectantibus  
 annumerari uolunt: cum ab illis eo nomine dissentiant / quod in  
 coniectura rerum latentium nolunt esse medicinam: ab his, eo  
 quod parum artis esse in obseruatione experimentorum credūt.  
 Quod ad Erasistratum pertinet: primum ipsa euidencia eius opi  
 nioni repugnat: quia raro nisi post horum aliquid morbus ue  
 nit. Deinde non sequitur: ut quod alium non afficit / aut eundem  
 alias: id ne alteri quidem / aut eidē tempore alio noceat. Possūt  
 enim quædam subesse corpori / uel ex infirmitate eius / uel ex ali  
 quo affectu: quæ uel in alio non sunt / uel in hoc alias nō fuerūt:  
 ea quæ per se non tanta ui concitant morbum: tamen obnoxium  
 magis aliis iniuriis corpus efficiunt. Quod si cōtemplationem  
 rerum naturæ: quam temere medici sibi uendicant / satis compre  
 hendisset / etiam illud scisset: nihil omnino ob unam causam fie  
 ri: sed id pro causa apprehendi: quod contulisse plurimum uide  
 tur. Potest autem id dum solum est non mouere / quod iunctum  
 aliis maxime mouet. Accedit ad hæc: quod ne ipse quidem Era  
 sistratus / qui transfuso i arterias sanguine febrem fieri dicit: id  
 quæ nimis repleto corpore incidere repperit: cur ex duobus æque  
 repletis, alter in morbum inciderit: alter omni periculo uacarit:  
 quod quotidie fieri apparet: non discereuerit. Ex quo disci  
 potest: ut uera sit illa transfusio / tamen illam non per se cum  
 plenum corpus est fieri: sed cum horum aliquid accesserit. The  
 misonis uero æmuli si perpetua quæ promittunt / habent: magis  
 etiamq; ulli rationales sunt. Neq; enim si quis non omnia tenet,  
 quæ rationalis alius probat / protinus alio nouo nomine artis in  
 diger. Si modo / quod primum est: non memoriæ soli / sed ratio  
 ni quoq; insistit. Si uero / quod proprius est / uix ulla ppetua præ  
 cepta medicinalis ars recipit: idem sūt quod ii / quos experimēta  
 sola sustinent. Eo magis quoniam si compresserit aliquem mor  
 bus an fuderit / quilibet etiam imperitissimus uidet. Quid autē  
 compressum corpus resoluat: quid solutum teneat / si a ratione  
 tractum



tractum est: rationalis est medicus. Si ut ei qui se rationalem negat/ confiteri necesse est: ab experientia empiricus est. Ita apud eum morbi cognitio extra artem: medicina intra usū ē. Neq; adiectum quicq; empiricorum professioni / sed demptum est: quoniam illi multa circumspiciunt: hi tantum facillima & non plus q̄ uulgaria. Nam & ii qui pecoribus ac iumentis medentur/ cum propria cuiusq; ex multis animalibus nosse non possint: communibus tantummodo insistant. Et exteræ gentes cum subtilem medicinæ rationem non nouerint: communia tantum uident. Et qui ample ualitudinarios nutriunt, quia singulis summa cura consulere non substinent: ad communia ista confugiunt. Neq; hercules istud & antiqui medici nescierunt: sed his contenti nō fuerunt. Ergo etiam uetustissimus auctor Hippocrates dixit mederi oportere & communia & propria inuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. Siquidem & compressorum & fluentium morborum genera diuersa sunt: facilius que id in iis quæ fluunt / inspicitur potest. Aliud est enim sanguinem: aliud bilem: aliud cibum uomere: aliud deiectionibus: aliud torminibus laborare: aliud sudore digerere: aliud tabe consumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit: ut in oculos / aures que. Quo periculo nullum humanum membrum uacat. Nihil autem horum sic / ut aliud curatur. Ita protinus in his a communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicinam descendit. Atq; in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est. quia non eadem omnibus etiam in similibus casibus opitulatur. Siquidem certæ quædam res sunt: quæ in pluribus uentrem aut astringunt / aut resoluunt. Inueniuntur tamen in quibus aliter atq; in cæteris idem eueniat. In his ergo communium inspectio contraria est: propriorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum soluit. Ergo etiam ingeniosissimus sæculi nostri medicus / quem nuper uidimus / Cassius febricitanti cuidam & magna siti affecto: cū post ebrietatem eum premi coepisse cognosceret: aquā frigidā ingessit. Quæ ille epota / cum uini uī miscendo frezisset: protinus febrem

Cassius:



somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus oportune  
 prouidit: non ex eo / quod aut astrictum corpus erat / aut flu  
 ebat: sed ex ea causa / quæ ante præcesserat. Est que etiam pro  
 prium aliquid & loci & temporis istis quoque auctoribus: qui  
 cum disputant quemadmodum sanis hominibus agendum sit:  
 præcipiunt ut grauib; aut locis au tēporibus magis uitetur fri  
 gur: æstus: satietas: labor: libido: magis que ut cōquiescat iis  
 dem aut locis aut temporibus si quis grauitatē corporis sentit:  
 ac neq; uomitu stomachum / neq; purgatione aluum sollicitet.  
 Quæ uera quidem sunt: a communibus tamen ad quædam  
 propria descendunt. nisi persuaderenobis uolant: sanis quidē  
 considerandū esse / quod cælum / quod tempus anni sit: ægris  
 uero non esse. Quibus tanto magis omnis obseruatio necessa  
 ria est / quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin e  
 tiam morborū i iisdem hominibus aliæ atq; aliæ proprietates  
 sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est: contrariis  
 sæpe restituitur. Plurima que indando cibo discrimina reperi  
 untur. Ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius fert  
 adolescens / q̄ puer: facilius in denso cælo / q̄ intenui: facilius  
 in hyeme / q̄ æstate: facilius uno cibo / q̄ prandio quoque assue  
 tus: facilius in exercitatus / q̄ exercitatus homo sustinet. Sæ  
 pe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est: qui minus  
 inediam tolerat. Ob quæ competit eum qui propria non nouit  
 communia tantum intueri debere: eum que qui nosse propria  
 potest: illa quidem non oportere negligere: sed his quoque infi  
 stere. Ideo que cum par scientia sit: utiliorem tamen medicum  
 esse amicum / q̄ extraneum. Igitur ut ad propositum meum re  
 deam / rationalem quidem puto medicinā esse debere: instrui  
 uero ab euidentibus causis: obscuris omnibus non a cogitatio  
 ne artificis / sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum  
 corpora & crudele & superuacuum est: mortuorum corpora di  
 scentibus necessarium. Nam positum & ordinē nosse debent.  
 Quæ / cadauera melius q̄ uiuus & uulneratus homo represen  
 tant. Sed & cætera quæ modo in uiuis cognosci possunt: in ip



## PRIMVS

sis curationibus uulneratorum paulo tardius / sed aliquanto mitius usus ipse monstrauit. His propositis primum dicam quem admodum sanos agere conueniat: tum ad ea transibo / quæ ad morbos curationes que eorum pertinebunt.

### CAPVT PRIMVM QVEMADMODVM SANOS AGERE CONVENIAT .

**S**anus homo: qui & bene ualet & suæ spontis est / nullis obligare se legibus debet: ac neq; medico / neq; alijs egeret. Hunc oportet uariam habere uitæ genus. modo ruri esse: modo in urbe: sæpius que in agro: nauigare: uenari: quiescere interdum: sed frequentius se exercere. Siquidem ignauia corpus hebetat: labor firmat. illa maturam senectutem: hic longā adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo: interdum aquis frigidis uti. modo ungi: modo id ipsum negligere. nullum cibi genus fugere / quo populus utatur. interdum in cōuiuio esse: interdum ab eo se retrahere. modo plus iusto / modo non amplius assumere. bis die potius / quam semel cibum capere: & semper q̄ plurimum / dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes / cibi que necessarii sūt: sic athletici / superuacui. Nam & intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis / corpus affligit: & ea corpora / quæ more eorum repleta sunt / celerrime & senescunt & ægrotant. Concubitus uero / neq; nimis concupiscendus: neq; nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat. frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit: sed natura / ratione ætatis & corporis: scire licet eum non inutilem esse: quem corporis neq; lassitudo / neq; dolor sequitur. Idem interdum peior est: noctu tutior. ita tamen si neq; illum cibus / neq; hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc firmis seruanda sunt: cauendum que ne insecunda ualitudine / aduersæ præsidia consumantur.

*Ignauia  
Labor*

*Cibus*

*Athletici*

*Concubitus*



QVAE STOMACHO IMBECILLIS SERVANDA  
SINT. CAPVT. II.

**A**T imbecillis stomacho: quo in numero magna pars urbano  
rum/omnes que pene cupidi litterarum sunt: obseruatio  
maior/necessaria est. ut quod uel corporis / uel loci/uel studii  
ratio detrahit / cura restituat. Ex his igitur qui bene concoxit/  
mane tuto surget. qui parum: quiescere debet. & si mane sur  
get di necessitas fuerit: redormire. Qui non concoxit: extoto  
conquiescere: ac neq; labori se: neq; exercitationi/ neq; negoci  
o credere. Qui crudum sine praecordiorum dolore ructat: is  
ex intervallo aquam frigidam bibere: & se nihilo minus conti  
nere. Habitare uero aedificio lucido per flatum aestiuum hiber  
num solem habente. cauere meridianum solem: matutinum &  
uesperinum frigus: item que auras fluminum atque stagnorum  
minime que nubilo caelo soli aperienti se committere, ne modo  
frigus/modo calor moueat. Quae res maxime grauedines/de  
stillationes que concitat. Magis uero grauib; locis ista seruã  
da sunt: in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet  
integrum corpus esse: cum quotidie mane urina alba: dein  
ruffa est. Illud concoquere: hoc concoxisse significat. Vbi ex  
perrectus est aliquis/paulum intermittere: deinde nisi hyems  
est/fouere os multa aqua frigida debet: longis diebus meridi  
ari potius ante cibum: sin minus/post eum. per hyemem potis  
simum totis noctibus cõquiescere. Sin lucubrandum est: non  
post cibum id facere/sed post concoctionem. Quem interdum  
uel domestica/uel ciuilia officia tenuerunt: huic tempus aliquod  
seruandum curationi corporis sui est. Prima autem eius curati  
o/exercitatio est: quae semper antecedere cibũ debet: in eo qui  
minus laborauit & bene concoxit amplior: in eo qui fatigatus  
est & minus concoxit/remissior. Commode uero exercent/cla  
ra lectio: arma: pila: cursus: ambulatio. At que hæc non utiq;  
plana cõmodior est. Siquidem melius ascensus quoque & de  
scensus cum quadam uarietate corpus moueat: nisi tamen id p



quam imbecillum est. Melior autem est sub dio / q̄ in porticu .  
 melior si caput patitur insole / quam in umbra . melior in umbra  
 quam parietes aut uiridaria efficiunt / quam quæ tecto subest .  
 melior recta / quam flexuosa . Exercitationis autem plerunque  
 finis esse debet sudor : aut certe lassitudo / quæ citra fatigatio  
 nem sit . id quæ ipsum / modo minus / modo magis faciendum  
 est . Ac ne his quidem athletarum exemplo / uel certa esse lex :  
 uel immodicus esse labor debet . Exercitationem recte sequi  
 tur / modo unctio uel insole uel ad ignem : modo balneum : sed  
 conclaui quam maxime & alto & lucido & spatiofo . Ex his uero  
 neutrum sæpe fieri oportet : sed sæpius alterutrum pro corpo  
 ris natura . Post hæc paulum conquiescere opus est . Vbi ad ci  
 bum uentū est : nunquam utilis est nimia satietas . Sæpe inuti  
 lis nimia abstinentia . sæpe si qua intemperantia subest : tutior  
 est in potione / quam in esca . Cibus a salsamentis : oleribus : si  
 milibus quæ rebus melius incipit . Tum caro assumenda est .  
 quæ assa optima / aut elixa est . Condita omnia duabus de cau  
 sis inutilia sunt . quoniam & plus propter dulcedinem assumi  
 tur : & quod modo par est / tamen ægrius concoquitur . Se  
 cūda mēsa bono stomacho nihil nocet : imbecillo coacescit . Si  
 quis itaque hoc parum ualet : palmulas / poma quæ & similia me  
 lius primo cibo assumit . Post multas potiones : quæ aliquantū  
 sitim exceßerunt / nihil edendum est . post satietatem / nihil a  
 gendum . Vbi expletus est aliquis : facilius concoquit / si quic  
 quid assumpsit potione aquæ frigidæ includit : tum paulisper  
 inuigilat : deinde bene dormit . Siquis interdū se implebit :  
 post cibū neque frigori / neque æstui / neque labori se debet cō  
 mittere . Neque enim tam facile hæc inani corpore / quam re  
 pleto nocent . Si quibus de causis futura inedia est : labor om  
 nis uitandus est .

*Potio  
 cibum a salsamentis & oleribus*

*Condita inutilia esse.*

*Secunda mensa.*

OBSERVATIONES quædam pro ut res nouæ accidunt &  
 corporum genera & sexus & ætates & tempora anni sunt .  
 CAPVT TERCIVM



a atq; hæc quidem pene perpetua sunt. Quasdam autem ob  
 seruationes desiderant & nouæ res & corporum genera &  
 sexus & ætates & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in  
 grauem: neque ex graui insalubrem transitus satis tutus est.  
 Ex salubri in grauem prima hyeme: ex graui in eum qui salu  
 bris est prima æstate transire melius est. Neque uero ex multa  
 fame / nimia satietas: neque ex nimia satietate / fames idonea  
 est. Periclitatur que & qui semel & qui bis die cibum in conti  
 nenter contra consuetudinem assumit. Item neque ex nimio  
 labore subitum ocium: neque ex nimio ocio subitus labor sine  
 graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid uolet: paulatim  
 debet assuescere. Omnem etiã laborem facilius uel puer uel  
 senex / q̃ insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoque minus oci  
 osa uita utilis non est: quia potest incidere laboris necessitas.  
 Si quando tamẽ insuetus aliquis laborauit: aut multo plus quã  
 solet: etiam si qui assueuit: huic ieiuno dormiendum est: mul  
 to magis si etiam os amarum est: uel oculi caligant: aut uenter  
 perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiu  
 no est: sed etiam in posterum diem permanendum: nisi cito id  
 quies sustulit. Quod si factum est / surgere oportet & lente pa  
 ululum ambulare. At si somni necessitas non fuit: quia modi  
 ce magis aliquis laborauit: tamen ingredi aliquid eodem mo  
 do debet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem  
 cibum sumpturis: ubi paulum ambulauerunt / si balneum non est:  
 calido loco / uel in sole / uel ad ignem ungi atq; sudare. Si est t  
 ante omnia intepidario residere: deinde ubi paulum conquie  
 uerunt: intrare & descendere in solium: tum multo oleo ungi /  
 leniter que perfricari: ite tum in solium descendere. Post hæc  
 os aqua calida fouere: deinde frigida. Balneum his feruens  
 idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato pene febris  
 est: huic abunde est loco tepido demittere se inguinibus tenui  
 i aquam calidam: cui paulum olei adiectum: deinde totum qui  
 dem corpus: maxime tamen eas partes / quæ in aqua fuerunt / le  
 niter perfricare ex oleo: cui uinum & paulum contriti salis sic

*ociosa uita utilis non est*



adiectum. Post hæc omnibus fatigatis aptum est cibum sumere: eo que humido uti: aqua / uel certe diluta portione esse contentos: maxime que ea / quæ moueat urinam. Illud quoque nosse oportet: quod ex labore sudati frigida portio perniciosissima est. atque etiam cum sudor se remisit itinere fatigatis in utilis. A balneo quoque uenientibus Asclepiades inutilem eam iudicauit. Quod in iis uerum est: quibus alius facile nec tuto resoluitur: qui que facile inhorrescunt: perpetuum in omnibus non est: cum potius naturale sit portione æstuantem stomachum refrigerari: frigentem calefieri. Quod ita præcipio: ut tamen fatear ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiam prodesse post uarium cibum / frequentes que dilutas portiones / uomitus: & postero die longa quies: deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio urget: inuicem modo aqua / modo uinum bibendum est: raro que balneo utendum. Leuat que lassitudinem etiam laboris mutatio: eum que / quem nouum genus eiusdem laboris pressit / id quod inconluetudine est: reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est: insolitum contra lassat. Quod enim contra consuetudinem est: nocet / seu molle / seu durum est. Proprie quædam adeum pertinent: qui ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio. post iter: primum sedile: deinde unctio: tum calida aqua in balneo magis superiores partes / quàm inferiores foueat. Siquis uero exustus in sole est: huic in balneum protinus eundum est: perfundendum que oleo corpus & caput: deinde insolium bene calidum descendendum est: tum multa aqua per caput infundenda prius calida / deinde frigida. At ei qui perfrigit / opus est in balneo primum inuoluto sedere donec insudet: tum ungi: deinde lauari: cibum modicum / portiones meracas assumere. Is uero qui nauigauit & nausea pressus est: si multam bilem euomit: uel abstinere cibo debet: uel paulum a liquid assumere. Si pituitam acidam effudit / utique sumere cibum: sed assueto leuiorem. si sine uomitu nausea fuit: uel abstinere: uel post cibum uomere. Qui uero toto die / uel in uehicu

*Cubile insolitum*

*Qui ambulando fatigatur*

*Exustus in sole*

*Nausea pressus*

*Pituita acida*



lo uel inspectaculis sedet: huic nihil currendum: sed lente ambulandum est. Lenta quoque in balneo mora: dein coena exigua prodesse consueverunt. Siquis in balneo æstuat: reficit hunc ore exceptum & in eo retentum acetum. Si id non est: eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisque naturam sui corporis, quoniam alii graciles: alii obesi sunt: alii calidi: alii frigidiores: alii humidi: alii sicci: alios astricta: alios resoluta alius exercet. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis uero homo implere se debet: plenus extenuare: calidus refrigerare: frigidus calefacere: madens siccare: siccus madefacere. item que alium firmare is cui fusa: soluere is cui astricta est. Succurrendum quod semper patti maxime laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio: frequentior quies: unctio: & si post prandium est balneum: contracta alius: modicum frigus hyeme: somnus & plenus & non nimis longus: molle cubile: animi securitas: assumpta per cibos & potiones maxime dulcia & pingua: cibus & frequentior & quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida si quis in eam descendit: magis que si falsa est: in ieiunio balneum: inurens sol: & omnis calor: cura: uigilia: somnus nimium uel brevis: uel longus: lectus per æstatem terra: hyeme durum cubile: cursus: multa ambulatio: omnisque uehemens exercitatio: uomitus: deiectio: acidæ res & austera: & semel die assumptæ epulæ: & uini non perfrigidi ieiunio potio inconsumetudinem adducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum & deiectionem: de his quoque proprie quædam dicenda sunt. Eiectum esse ab Asclepiade uomitum in eo uolumine / quod detuenda sanitate composuit: uideo. ne que reprehendo / si offensus eorum est consuetudine: qui quoti die eiiciendo uorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam longius processit: idem purgationes quoque eodem uolumine expulit. Et sunt hæc perniciosæ / si nimis ualentibus medicamentis fiunt. Sed hæc tamen submouenda esse non est perpetuum. quia corporum / temporumque ratio potest ea facere necessaria: dum

*qda natura sui corporis*

*implent corpus*

*extenuat corpus*

*utis*



& modo / & non nisi cum opus est: adhibeatur. Ergo ille quo  
que ipse siquid iam corruptum esset / expelli debere confellius  
est. Ita non extoto res condemnanda est. Sed esse eius etiam  
plures causæ possunt: est que in ea quædam paulo subtilior ob  
seruatio adhibenda. Vomitus utilior ē hyeme / quam æstate.  
Nam tum & pituitæ plus: & capitis grauitas maior subest. In  
utilis est gracilibus: & imbecillum stomachū habentibus. Vi  
lis est plenis & biliosis omnibus: si uel nimium se replerunt:  
uel parum concoxerunt. Nam siue plus est: quam quod conco  
qui possit: periclitari ne corrumpatur: non oportet. Si uero  
corruptum est: nihil commodius est: quam id / qua uia primū  
expelli potest: eiicere. Itaq; ubi amari ructus tum dolore &  
grauitate præcordiorum sunt: adhuc protinus confugiendum  
est. Item prodest ei / cui pectus æstuat: & frequens saliuā / uel  
na usea est: aut cui sonant aures: aut madent oculi: aut os ama  
rum est. Similiter que ei / qui uel cælum / uel locum mutat: iisq;  
quibus: si per plures dies non uomuerunt: dolor præcordia in  
festat. Neque ignoro inter hæc præcipi quietem. quæ non sem  
per contingere potest agendi necessitatem habentibus. nec in  
omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non o  
portere confiteor. Interdum ualitudinis causa recte fieri expe  
rimentis credo. Commoneo tamen nequis / qui ualere & sene  
scere uolet / hoc quotidianum habeat. Qui uomere post cibum  
uolet: si exfacili facit: aquam tantum tepidam ante debet assu  
mere. si difficilius: aquæ / uel salis / uel mellis paulum adicere.  
At qui mane uomiturus est: ante bibere mulsum / uel isopum:  
aut esse radiculam debet. deinde aquam tepidam / ut supra scrip  
tum est / bibere. Cætera quæ antiqui medici præeperunt / sto  
machum omnia infestant. Post uomitum / si stomachus infirmus  
est: paulū cibi / sed huius idonei: gustandum: & aquæ frigida  
cyathi tres bibēdi sūt. Si autē uomitus fauces exaspauit: qui uo  
muit / si mane id fecit: ambulare debet: tum ungi: deinde coena  
re. Si post coenam / postero die lauare / & in balneo sudare. hic  
proximus cibus / mediocris utilior est: is que esse debet cum pa  
bi.



ne hesterno: uino austero meraco / & carne assa / cibis que om-  
nibus quam siccissimis. Qui uomere bis in mense uult: melius  
consulet, si biduo continuarit / quam si post quintum decimum  
diem uomuerit: nisi hæc mora grauitatem pectori faciet. De  
iectio autem medicamento quoque petenda est: ubi uenter sup-  
pressus parum reddit: ex eo que inflammationes: caligines: ca-  
pitis dolores: alia que superioris partis mala increpant. quid  
enim inter hæc adiuuare possunt quies & inedia quæ per illas  
maxime eueniunt? Qui eiicere uolet / primum cibis uinis que u-  
tetur his / quæ hoc præstant. Dehinc si parum illa proficiunt:  
aloen sumat. Sed purgationes quoque ut interdum necessariæ  
sunt: sic ubi frequentes sunt / periculum afferunt. Assuescit .n.  
non ali corpus: & ob hoc infirmum erit: cum omnibus morbis  
obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem unctio: a qua  
salsa: magis que si calida est: omnia salsa: amara: carnosæ: si  
post cibum est balneum: uinum austerrum. Refrigerat inieunio  
& balneum & somnus: nisi nimis longus est & omnia acida: a  
qua quam frigidissima: oleum si aquæ misceatur. Humidum  
autem corpus efficit labor maior quam excōsuetudine: frequēs  
balneum: cibus plenior: multa potio: post hæc ambulatio &  
uigilia. Per se quoque ambulatio multa & uehemens et matuti-  
na exercitatio et non protinus cibus adiectus: ea genera escæ /  
quæ ueniunt ex locis frigidis et pluuiis & irriguis. Contra sic-  
cat modica exercitatio: fames: unctio sine aqua: calor: sol mo-  
dicus: frigida aqua: cibus exercitationi statim subiectus: et is  
ipse ex siccis et aestuosis locis ueniens. Aluum astrigit labor:  
sedile: creta figularis corpori illita: cibus imminutus: et is ip-  
se semel die assumptus ab eo qui bis solet: exigua potio: neq;  
adhibita nisi cum cibi quis quantum assūpturus est cepit: post  
cibum quies. Contra soluit aucta ambulatio atq; esca: post mo-  
tus qui post cibum est: subinde portiones cibo immixtæ. Illud  
quoque scire oportet: quod uentrem uomitus solutum compri-  
mit: compressum soluit. Item que comprimit is uomitus / qui  
statim post cibum est: soluit is qui tarde supuenit. Quod ad

rio

*humidū corpus faciat*

*siccū faciat corpus*

*aluum astringat*

*soluant aluum:*

*stus*



PRIMVS  
SECUNDVS.

etates uero pertinet: inedia facillime sustinent mediae aeta-  
tes. minus iuuenes: minime pueri & senectute confecti. Quo-  
minus fert facile quisq; eo saepius debet cibum assumere. ma-  
ximeq; eo eget qui increfcit. Calida lauatio & pueris & seni-  
bus apta est. Vinum dilutius pueris: senibus meracius. neutri  
etati quae inflationes mouent. Iuuenū minus quae assumant  
& quomodo curentur: interest. Quibus iuuenibus fluxit aluus  
plerunq; in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fu-  
it astricta: saepius in senectute soluitur. Melior est autē in iue-  
ne fusior: in senē astrictior. Tempus quoq; anni considera-  
re oportet. Hyeme plus esse conuenit: minus. sed meracius bi-  
bere: multo pane uti: carne potius elixa: modice oleribus: se-  
mel die cibum capere / nisi si nimis uenter astrictus est. Si  
prandet aliquis: utilius est exiguum aliquid & ipsum siccum  
sine carne / sine portione sumere. Eo tempore anni calidis om-  
nibus potius utendum est: uel calorem mouentibus. Venus tū  
non aequē pernitiōsa est. At uere paulum cibo demētum: ad-  
iiciendumq; portioni: sed dilutius tamen bibendum est: ma-  
gis carne utendum / magis oleribus: transeundum paulatim ad  
assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aesta-  
te uero portione & cibo corpus saepius eget. Ideo prandere  
quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt & caro &  
olus: portio quam dilutissima: ut & sitim tollat / nec corpus in-  
cendat. frigida lauatio: caro assa: frigidi cibi / uel qui refrige-  
rent. Ut saepius autem cibo utendum / sic exiguo est. Per au-  
tumnū propter caeli uarietatem periculum maximum est.  
Itaque neque sine ueste / neque sine calciamentis prodire opor-  
tet: praecipue quē diebus frigidioribus: neque sub dio noc-  
te dormire: aut certe bene operiri. Cibo uero iam paulo ple-  
niore uti licet: minus / sed meracius bibere. Poma nocere qui-  
dam putant: quae immodice toto die plerunq; sic assumuntur  
nequid ex densiore cibo remittatur Ita non haec sed consuma-  
tio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus q̄ in his  
b.ii.

etates

Calida lauatio  
vinum.

Aluus

Hyems

Venus  
Vet

Venus  
Aestas

Autumnus

Poma



noxae est. Sed his uti non saepius quam alio cibo conuenit. Denique aliquid densiori cibo cum hic accedit / necessarium est demi. Neque æstate uero neque autumno utilis uenus est. Tolerabilior tamen per autumnum: æstate intotum si fieri potest abstinendum.

DE iis qui aliqua parte corporis laborant: & primum de iis quibus caput infirmum est

CAPVT. IIII.

**P**roximum est ut de iis dicam: qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est: is si bene concoxerit: leniter perfricare id mane manibus suis debet. nunquam id si fieri potest / ueste uelare: aut ad cutem tonderi. uti leque lunam uitare: maximeque ante ipsum lunæ solisque conspectum: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt: eos quotidie pestere: multum ambulare. sed si licet neque sub recto neque in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem: maximeque post cibum & uinum: potius ungi / q̄ lauare: nunq̄ ad flammam ungi interdum ad prunam si in balneū uenit sub ueste primum paulum intepidatio insudare: ibi ungi: tum transire in calidarium. ubi sudabit: in solum non descendere: sed multa calida aqua per caput se totum perfundere: tum tepida de frigida. diutiusque ea caput quam cæteras partes perfundere deinde id aliquādiu perfricare: nouissime detergere & ungere. Capiti nihil æque prodest atque aqua frigida. Itaque is cui hoc infirmum est per æstatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subiicere. Semper autem etiam si sine balneo unctus est. neq; totum corpus refrigerare sustinet. caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum cæteras partes attingi nolit demittere id ne ad ceruices aqua descendat: eam q̄ neqd oculis aliis ue partibus noceat defluentē subinde manibus ad os regerere. huic modicus cibus necessarius est qui facile concoquat. itq; si ieiunio caput læditur assumendus etiam medio die ē. Si nō læditur semel potius. bibere huic assidue

*infirmum.*

*ueste uelare:*

*curanda:*

*ardor mirandus:*



uinum dilutum / leue / quam aquam magis expedit : ut cum ca-  
put grauius esse coeperit: sit quo confugiat. ei que ex toto ne-  
que uinum / neq; aqua semper utilia sunt. medicamentum utrun-  
que est / cum inuicem assumitur. Scribere: legere: uoce conten-  
dere huic opus nō est utiq; post coenam: postquā nec cogitatio  
quidem ei satis tuta est: maxime tamen uomitus alienus est.

DE IIS qui lippitudine: grauedine: destillatione: consillisq;  
laborans. CAPVT.V.

**N**eq; uero iis solis / quos capitis imbecillitas torquet usus a-  
quæ frigida prodest: sed iis etiam / quos assidue lippitu-  
dines: grauedines: destillationes: consillis que male habent.  
His autem non caput tantum quotidie perfundendum est: sed  
os quoque multa frigida aqua fouendum est. Præcipue que  
omnibus / quibus hoc utile auxilium est: eo utendum est ubi  
grauius caelum austri reddiderunt. Cum que omnibus in utilis  
sit post cibum aut contentio / aut agitatio animi: tum iis præ-  
cipue / qui uel capitis uel arteriæ dolores habere consuerunt:  
uel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam grauedines / de-  
stillationes que possunt: si quam minime cum / qui his oportu-  
nus est / aerem: uel loca aquas que mutet. si caput in sole prote-  
git / ne incendatur: ne ue subitum ex repentino nubilo frigus  
id moneat. Si post concoctionem ieiunus caput radit. Si post  
cibum neq; legit / neque scribit

*Contentio / aut aī agitatio post-*

AD SOLVTAM ALVVM REMEDIA.  
CAPVT. VI.

**Q**uem uero frequenter cita aluus exercet: huic opus est  
pila / similibus que superiores partes exercere: dum ie-  
iunus est ambulare: uitare solis nimium ardorem: continua  
balnea: ungi citra sudorem: non uti cibis uariis / minime  
que inrulentis / aut leguminibus: oleribus ue iis / quæ  
b.iii.

*Cura aluus*



celeriter descendunt omnia denique fugere / quæ tarde conco-  
quuntur. Venatio: duri quæ pisces: & ex domesticis animalibus  
assa caro maxime iuuant. Nunquam uinum salsum bibere ex-  
pedit: ne tenue quidem aut dulce: sed austerum & plenus: neque  
id ipsum per uetus. Si mulso uti uolet: id ex decocto melle fa-  
ciendum est. Si frigidae potiones uentrem eius non turbant:  
his utendum porissimum est. Siquid offensae in coena sensit:  
uomere debet: id quæ postero quoque die facere. tertio modici  
ponderis panem ex uino esse / adiecta uua / uel olca / uel ex de-  
fruto / similibusque aliis. deinde ad consuetudinem redire. Sem-  
per autem post cibum conquiescere: ac neque intendere animum:  
neque ambulatione quamuis leui dimoueri.

REMEDIA AD COLI DOLOREM. CAPVT. VII.

**A**T si laxius intestinum dolere consuevit: quod colum no-  
minant: cum id nihil nisi genus inflationis sit: id agen-  
dum est: ut concoquat aliquis: ut lectione & aliis generibus exer-  
ceatur: utatur balneo calido: cibis quoque & potionibus calidis:  
denique omnimodo frigus euitet. item dulcia omnia / legumina  
que & quicquid inflare consuevit.

QVAE agenda sint stomacho laborantibus. CAPVT. VIII

**S**I quis uero stomacho laborat: legere clare debet: post lecti-  
onem ambulare: tum pila / uel armis / alio uero quo genere:  
quo superior pars mouetur / exerceri. Non aquam / sed uinum  
calidum bibere ieiunus. Tum cibum bis die assumere: sic tamē  
ut facile concoquat: Vti uino tenui & austero: & post cibum  
frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant:  
pallor: macies: praecordiorum dolor: nausea & nolentium uo-  
mitus: in ieiunio dolor capitis. Quæ in quo non sunt / is firmi  
stomachi est. Neque credendum utique nostris est: qui cum in ad-  
uersa ualitudine uinum aut frigidam aquam concupierint: de



liarum patrociniū in accusationem nonmerentis sto machi  
habent. At qui tarde concoquunt: & quorum ideo præcordia  
inflantur: qui ue propter ardorem aliquem noctu sitire consue  
runt: anteq̃ conquiescant / duos tres ue cyathos per tenuem fi  
stulam bibant. Prodest etiam aduersus tardam concoctionem  
clare legere: deinde ambulare: tum uel ūgi / uel lauare assidue:  
uinum frigidum bibere / & post cibum magnam portionem: sed  
ut supra dixi per siphonem. deinde omnes portiones aqua frigi  
da includere. Cui uero cibus acescit: is ante eum bibere aquam  
egelidam debet & uomere. At is cui ex hoc frequens deiectio  
incidit: quotiens aluus ei constiterit: frigida portione potissi  
mum utatur.

QVID OBSERVANDVM SIT DOLORE NERVO  
RVM LABORANTIBVS. CAPVT.VIIII.

**S** I cui uero dolere nerui solent: quod in podagra / chiragra  
ue esse consuevit: huic quantum fieri potest, exercendum  
id est: quod affectum est: obiciendumq̃ labori & frigori: nisi  
cum dolor increuit. Sub dio quies optima est. Venus semper  
inimica est. Concoctio / sicuti in omnibus corporis affectibus,  
necessaria est. Cruditas enim id maxime lædit: et quotiens of  
fensum corpus est / uitiosa pars maxime sentit. Vt concoctio  
autem ōnibus uitis occurrat: sic rursus aliis frigus, aliis calor.  
Quæ sequi quisq̃ pro habitu corporis sui debet. Frigus inimi  
cum est seni: tenui: uulneri: præcordiis: intestinis: uesicæ: auri  
bus: coxis: scapulis: naturalibus: ossibus: dentibus: neruis: uul  
uæ: cerebro. Idem summam cutem facit pallidam: aridam: du  
ram: nigram. Ex hoc horrores, tremores que nascuntur. At p  
dest iuuenibus et omnibus plenis, erectior que mens est et me  
lius concoquitur ubi frigus quidem est: sed cauetur. Aqua ue  
ro frigida infusa præter quam capiti, etiã stomacho prodest.  
Item articulis / doloribusq̃: qui sunt sine ulceribus. item rubi  
eundis nimis hominibus: si dolore uacant. Calor autem adiut



nat omnia / quæ frigus infestat . item lippientes / si nec dolor /  
nec lacrimæ sunt . Nervos quoq; / qui contrahuntur præcipueq;  
ea ulcera : quæ ex frigore sunt . Idem corporis colorem bonum  
facit : urinam mouet . Si nimius est : corpus effoeminat : nervos  
emollit : stomachum soluit . Minime uero aut frigus / aut calor  
tuta sunt : ubi subita insuetis sunt . Nam frigus lateris dolores /  
aliaq; uitia . frigida aqua strumas excitat . Calor concoctione  
prohibet : somnum aufert : sudorem digerit : obnoxium morbis  
pestilentibus corpus efficit .

## OBSERVATIO IN PESTILENTIA . CAPVT . X .

**E**t etiam observatio necessaria : qua quis in pestilentia uti  
tur adhuc integer : cum tamen securus esse non possit .  
Tum igitur oportet peregrinari : nauigare . Vbi id non licet :  
gestari : ambulare sub dio ante æstum leniter : eodem q; modo  
ungi : & ut supra comprehensum est : uitare fatigationem : cru  
ditatem : frigus : calorem : libidinem . multoq; magis se contine  
re siqua grauitas in corpore est . tum neq; mane surgendum : ne  
que pedibus nudis ambulandum est . minime que post cibum a  
ut balneum . neq; ieiuno neq; coenato uomendum est . Neq; mo  
uenda alius : atq; etiam si per se mota est : comprimenda est .  
Abstinendum potius si plenius corpus est . Item que uitandum  
balneum : sudor : meridianus somnus utiq; / si cibus quoq; ante  
cessit : qui tamen semel die tunc commodius assumitur : insuper  
etiam modicus / ne cruditatem moueat . Alternis diebus inuicẽ  
modo aqua / modo uinum bibendum est . Quibus seruatis ex re  
liqua uictus consuetudine q; minimum mutari debet . Cum uero  
hæc in omni pestilentia facienda sint : tum in ea maxime / quã  
austri excitarint . Atq; etiam peregrinantibus eadem necessari  
a sunt : ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus : uel  
ubi in graues regiones uenerunt . Ac si cætera res aliqua probi  
bebit : utiq; abstinere debet . Atq; ita ab uino ad aquam : ab  
hac ad uinum eo qui supra positus est modo transitus ei esse .



## CORNELII CELSIDE MEDICINA. LIBER. II.

**I**nsantis autem aduersæ ualitudinis signa cōplura sunt. In quibus explicandis non dubitabo auctoritate antiquorum uirorum uti maxime que Hippocratis: cum recentiores quoque medici / quibus quædam incurationibus mutarint: tamen hæc illum optime præfagisse fateantur. Sed antequam dico quibus præcedentibus morborum timor subsit: non alienum uidetur exponere. quæ tempora anni: quæ tempestatum genera. quæ partes ætatis: qualia corpora maxime tuta / uel periculis oportuna sint. quod genus aduersæ ualitudinis in quoque timeri maxime possit. Nō quo non omni tempore in omni tempestatum genere omnis ætatis: omnis habitus hominum per omnia genera morborum & ægrotent & moriantur: sed quo frequentius tamen quædam eueniant. Ideoque utile est scire unum quenque quid & quando maxime caueat.

Quæ anni tempora: quæ tempestatum genera: quæ partes ætatis: qualia corpora uel tuta uel morbis opportuna sunt: & quod ualitudinis genus in quoque timeri possit. CAPVT. I

**I**gitur saluberrimum uer est: proxima deinde ab hoc hyems periculosior æstas. Autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus uero optime æquales sunt / siue frigidæ siue calidæ. pessime quæ uariant maxime. Quo fit ut autumnus plurimos opprimat. nam fere meridianis temporibus calor: nocturnis atque matutinis / simulque etiam uespertinus frigus est. Corpus uero & æstate & subinde meridianis caloribus relaxatum / subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit: sic quodcumque euenit noxium est. Vbi æqualitas autem est: tamen saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluuii / quam tantum nebulosi aut nubili: optimique hyeme / qui omni uento



uento uacant; æstate quibus fauonii perflant. Si genus aliud  
 uentorum est: salubriores septentrionalesq̃ subsolani uel au  
 stri sunt. Sic tamen ut hec interdum regionum forte muten  
 tur. Nam fere uentus ubiq̃ a mediterraneis regionibus ueniens  
 salubris a mari grauis est. Neq̃ solum in bono tempestatum  
 habitu certior ualitudo est: sed prior a morbi quoq̃ si qui in  
 ciderunt / leuiiores sunt & promptius finiuntur. Pessimum er  
 go caelum est quod ægrū fecit: adeo ut in id quoq̃ genus quod  
 natura peius est in hoc statu. salubris mutatio sit. At ætas me  
 dia tutissima est: quæ neq̃ iuuentæ calore / neq̃ senectutis fri  
 gore infestatur. Longis morbis senectus: acutis adolescentia  
 magis patet. Corpus autem habiliissimum quadratum est: ne  
 q̃ gracile: neq̃ obesum. Nam longa statura ut iniuuenta deco  
 ra est: sic matura senectute conficitur. Gracile corpus / infir  
 mum: obesum / hebes est. Vere tamen maxime quæcunq̃ humo  
 ris motu nouantur in metu esse consuerunt. Ergo tum lippitu  
 dines: pustulae: profusio sanguinis: abscessus corporis / quæ  
 apostemata græci nominant: bilis atra / quā melancholiam ap  
 pellant: isania: morbus comitialis: angina: grauedines: destil  
 lationes oriri solent. Li quoq̃ morbi / qui in articulis / neruisq̃  
 modo urgent / modo quiescunt: tum maxime & inchoantur &  
 repetunt. At ætas non quidem uacat plerisq̃ ab his morbis:  
 sed adiicit febres / uel continuas uel ardentes uel tertianas: uo  
 mitus: alui deiectiones: auricularum dolores: ulcera oris: can  
 cros & in cæteris quidem partibus, sed maxime obscenis: &  
 quicquid sudore hominem resoluit. Vix quicquam ex his in  
 autumnum non incidit: sed oriuntur eo quoq̃ tempore febres  
 incertæ: lienis dolor: aqua inter cutem tabes quā græci phthi  
 sin nominant: urinae difficultas: quam stranguriam appellant  
 tenuioris intestini morbus: quem ileon nominant. Fit item le  
 nitas intestinorum: quæ lienteria uocatur. coxæ dolores: mor  
 bi comitiales. Idem que tempus & diutinis malis fatigatos &  
 ab æstate tantum proxima pressos interimit: & aliis nouis  
 morbis conficit: & quosdam longissimis implicat: maximeq̃



quartanis: quæ per hyemem quoque exerceant. Neque aliud magis tempus pestilentiae patet: cuiuscunque ea generis est: quamuis variis rationibus nocet. Hyems autem capitis dolores: tussim: & quicquid in faucibus / in lateribus / in uisceribus mali contrahitur: irritat. Extempestatibus aquilo tussim mouet: fauces exasperat: uentrem astringit: urinam supprimit: horrores excitat: item dolores lateris & pectoris. Sanum tamen corpus spissat & mobilius atque expeditius reddit. Auster aures hebetat: sensus tardat: capitis dolores mouet: aluum soluit: totum corpus efficit hebes / humidum / languidum. Cæteri uenti quo uel huic uel illi propiores sunt: eo magis uicinos his / illis uel affectus faciunt. Denique omnis calor / & iecur & lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima deficiat: ut sanguis prorumpat: efficit. Frigus modo neruorum distentionem: modo rigorem infert. illud spasmus: hoc casmus græce nominatur: nigritiem in ulceribus: horrorem in febribus excitat. In siccitatibus acutæ febres: lippitudines: tormina: urinæ difficultas: articulorum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres: a lui deiectiones: angina: cancri: morbi comitiales: resolutio neruorum: quam paralyfin græci nominant. Neque solum interest quales dies sint: sed etiam quales ante præcesserint. Si hyems sicca septentrionales uentos habuit: uer autem austros & pluuias exhibet: fere subeunt lippitudines: tormina: febres: maxime que in mollioribus corporibus: ideo que præcipue in mulieribus. Si uero auster / pluuiæ que hyemem occuparunt: uer autem frigidum & siccum est: grauidæ quidem foeminae: quibus tum adest partus: abortu periclitantur. Hæc uero quæ gignunt: imbecillos / uix que uitales edunt. Cæteros lippitudo arida: & si seniores sunt / grauedines atque destillationes male habent. At si a prima hyeme auster ad ultimum uer continuarunt: laterum dolores & insania febricitantium: quam phrenesin appellant: quam celerissime rapiunt. Vbi primo calor a primo uere orsus æstatem quoque similem exhibet. necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas aquilones habuit: autumnus uero im-



bres / austrique sunt: tota hyeme / quae proxima est: tussis: destil-  
 latio: raucitas: in quibusdam etiam tabes oriuntur. Sin autem  
 autumnus quoque aequus siccus hisdem aquilonibus perflatur: om-  
 nibus quidem mollioribus corporibus: inter quae muliebria es-  
 se proposui: secunda ualitudo contingit. Durioribus uero in-  
 stare possunt & aridae lippitudines: & febres partim acutae /  
 partim longae: & ii morbi / qui ex atra bile nascuntur. Quod  
 ad aetates uero pertinet. pueri / proxime quae his / uere optime  
 ualent & aestate prima tutissimi sunt. Senes aestate & autumnii  
 prima parte. Iuuenes hyeme: qui quae inter iuuentam senectutem  
 quae sunt. inimicior senibus hyemis / aestas adolescentibus est.  
 Tum si qua imbecillitas oritur: proximum est ut infantes / tene-  
 rosque adhuc pueros serpentina ulcera oris: quae aphthas graeci  
 nominant: uomitus: nocturnae uigiliae: aurium humor: circa  
 umbilicum inflammationes exerceant. Proprie etiam dentien-  
 tium gingivarum exulcerationes: distentiones neruorum: fe-  
 briculae: alui deiectiones: maxime quae caninis dentibus ori-  
 entibus / male habent. Quae pericula plenissimi cuiusque  
 sunt: & cui maxime uenter astrictus est. At ubi aetas paulum  
 processit: glandulae & uertebrae: quae in spina sunt / aliquae  
 inclinationes: strumae: uerrucarum quaedam genera dolentia  
 (acrochordonas graeci appellant) & plura alia tubercula oriun-  
 tur. Incipiente uero iam pube ex hisdem multae & longae febres:  
 sanguinis ex naribus cursus. Maxime quae omnis puericia pri-  
 mum circa quadragesimum diem: deinde septimo mense: tum  
 septimo. anno: postea circa pubertatem periclitatur. Si qua eti-  
 am genera morborum in infantem inciderunt: ac neque pubertate:  
 neque primis coitibus: neque in foemina primis mensibus finita  
 sunt: fere longa sunt. Saepius tamen morbi pueriles / qui diuti-  
 us manserunt: terminantur. Adolescentia morbis acutis: item  
 comitialibus: tabi quae maxime obiecta est: fere quae iuuenes  
 sunt / qui sanguinem expuunt. Post hanc aetatem laterum & pul-  
 monis dolores: lethargus: colera: infania: sanguinis per quae-  
 dam etiam uelut ora uenarum (haemorrhoidas graeci appellant)



profusio. In senectute spiritus & urinæ difficultas: grædo articulo-  
rum & renum dolores: neruorum resolutiones. malus cor-  
poris habitus (cachectici græci appellant) nocturnæ uigilæ:  
uitia longiora aurium/oculorum/etiam narium: præcipue que  
soluta aliis. quæ sequuntur hanc tormina/uel leuitas intestino-  
rum: cæteraq; uentris fusi mala. Præter hæc graciles/tabes: de-  
iectiones: destillationes: item uiscerum & laterum dolores fa-  
tigant. Obesi plerumq; acutis morbis & difficultate sperandi  
strangulantur: subito q; sæpe moriuntur. Quod in corpore te-  
nuiore uix enenit.

DE SIGNIS aduersæ ualitudinis futuræ .CAPVT.II.

**A** Nte aduersam autem ualitudinem/ut supra dixi / quædā  
notæ oriuntur: quarum omnium commune est . aliter se  
corpus habere atq; consuevit: neq; in peius tantum / sed etiam  
in melius. Ergo si plenior aliquis & speciosior & coloratior  
factus est: suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neq; in  
eodem habitu subsistere/neq; ultra progredi possunt: fere re-  
tro quasi ruina quadam reuoluuntur. Peius tamen signum est  
ubi aliquis contra consuetudinem emacuit: & colorem decorē  
que amisit. quoniam in his quæ superant. est quod morbus de-  
mat. in his quæ desunt: non est quod ipsum morbum ferat. Præ-  
ter hæc protinus timeri debet. si grauiora membra sunt. si cre-  
bra ulcera oriuntur. si corpus supra consuetudinem incaluit .  
si grauior somnus pressit. si tumultuosa somnia fuerunt. si sæ-  
pius expergiscitur aliquis quam assuevit: deinde iterum soporatur.  
si corpus dormientis circa partes aliquas contra consue-  
tudinem insudat: maxime que circa pectus aut ceruices aut cru-  
ra/uel genua uel coxas. Item si marcet animus. si loqui & mo-  
ueri piget. si corpus torquet. si dolor præcordiorum est: aut  
totius pectoris: aut in plurimis uenis capitis . si salinae ple-  
num est os . si oculi cum dolore uertuntur . si tempora  
astricta sunt . si membra in horrescunt . Si spiritus gra-  
uior est . Si circa frontem intentæ uenæ mouentur . Si fre-  
quentes obscuritates: Si genua quasi fatigata sunt: totum  
c.i.



ne corpus lassitudinem sentit. Ex quibus sæpe plura: nunquam non aliqua febrem antecedunt. Inprimis tamen illud considerandum est. Nunquid sæpius horum aliquid eueniat: ac neque ideo corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum: sine quarum notitia non facile quicquid infuturum præfagiri potest. Facile itaque securus est in his aliquis: quæ sæpe sine periculo euasit. Ille sollicitari debet: cui hæc noua sunt: aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta habuit.

QVAE bona inægrotantibus signa sint. .CAPVT. III

**V** Bi uero febris aliquem occupat: scire licet non periclitari si in laus aut dextrum / aut sinistrum: ut ipsi uisum est: cubat cruribus paulum reductis. qui fere sani quoque iacentis habitus est: Si facile conuertitur. Si noctu dormit. Si interdum uigilat. si ex facili spirat: si non conflictatur. si circa umbilicum & pubem cutis plana est. si præcordia eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraque parte sunt. Quod si paulo tumidiora sunt: sed tamen digitis cedunt & non dolent: hæc ualitudo / ut spatium aliquod habebit: sic tuta erit. Corpus quoque quod æqualiter molle & calidum est: quod quæ æqualiter totum insudat: & cuius febricula eo sudore finitur: securitatem pollicetur / quando iam ad sanitatem uenit corpus. Sternutamentum etiam inter bona inditia est. Et cupiditas cibi uel aprimo seruata / uel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet ea febris / quæ eodem die finita est. ac ne ea quidem: quæ quauis longiore tempore euauit: tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit: sic ut corpus integrum: quod ilicrines græci uocant: fieret. si quis autem incidit uomitus / mixtus esse & bile & pituita debet: & in urina subsidere album. leue. æquale: sic ut etiam si quæ quasi nubecula innatarint / in urina deferantur. At ueter ei qui apiclotutus est: reddit modo mollia figurata eodem fere tempore / quo secunda ualitudie assueuit: modo conuenientia iis quæ assumuntur. peior cita alius est. sed ne hæc quædæ terrere potius de



bet: si matutinis temporibus coacta magis est: aut si procedē  
te tempore paulatim contrahitur & ruffa est: neq; foeditate o  
doris similem alium sani hominis excedit. Ac lumbricos quo  
que aliquos sub fine morbi descendisse nihil nocet. Si inflam  
matio insuperioribus partibus dolorem / tumorem que fecit:  
bonum signum est. Sonus uentris inde ad inferiores partes e  
uolutus: magis que etiam si sine difficultate cum stercore ex  
cessit.

MALA SIGNA AEGROTANTium. CAPVT. IIIL.

**C**ontra grauis morbi periculum est: ubi supinus æger ia  
cet porrectis manibus & cruribus. Vbi residere uult in ip  
so acuti morbi impetu: præcipue que pulmoibus laborantibus.  
Vbi nocturna uigilia premitur / etiam si interdiu somnus acce  
dit. Exquo tamen peior est: qui inter quartam horam & noc  
tem / q̄ qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen ē  
si somnus / neq; noctu / neq; interdiu accedit. Id enim fere sine  
continuo dolore esse non potest. Aequē uero signum malum  
est etiam somno ultra debitum urgeri: peius que quo magis se  
sopor interdiu / noctu que continuat. Mali etiam morbi testi  
monium est uehementer & crebro spirare: a sexto die coepisse  
inhorrescere: pus expuere: uix excreare: dolorem habere conti  
nuum: difficulter ferre morbum: iactare brachia & crura: sine  
uoluntate lacrimare: habere humorem glutinosum dentibus in  
haerentem: cutem circa umbilicum & pubem nigram: præcor  
dia inflammata. dolentia. dura. tumida. intenta: magis que si  
hæc / dextra parte / quam sinistra sunt. periculosissimum ta  
men est / si uenæ quoq; ibi uehementer agitantur. Mali etiam  
morbi signum est: nimis celeriter emacrescere: caput & pedes  
manusq; calidas habere uentre & lateribus frigētibus. aut frigi  
das extremas partes acuto morbo urgēte: aut post sudorē in  
horrescere. aut post uomitum singultum esse. uel rubere ocu  
los. aut post cupiditatem cibi / post ue longas febres hunc  
fastidire: aut multum sudare: maxime que frigido sudore.



aut habere sudores non per totum corpus æquales: qui que fe-  
brem non finiant: & eas febres / quæ quotidie tempore eodem  
reuertantur: quæ ue semper pares accessiones habeant: neq; ter-  
tio quoq; die leuentur: quæ ue continent / ue per accessiones  
increscant: per discessiones tantum molliantur . nec unq; inte-  
grum corpus dimittant . Pessimum est si ne leuatur quidem fe-  
bris / sed æque concitata continuat . Periculosum est etiam  
post arquatam morbū febrem oriri utiq; si præcordia dextra  
parte dura manserunt ac dolentibus his leua . Nulla acuta fe-  
bris leuiter terrere nos debet . Neq; unq; in acuta febre / aut a  
somno non est terribilis neruorum distentio . Timere etiam  
ex somno mali morbi est . Item q; in prima febre protinus me-  
tem esse turbatam: membrum ue aliquod esse resolutum . Ex  
quo casu quauis uita redditur: tamen id fere membrum debi-  
litatur . Vomitus etiam periculosus est sinceræ pituitæ uel bi-  
lis: peior q; si uiridis aut niger est . At mala urina est in qua  
subsidiūt subrubra aut liuida . deterior in qua quasi fila quædā  
tenuia atq; alba . pessima ex his si tanq; ex fuscis factas  
nubeculas representat . Diluta quoq; atque alba uitiosa est: sed  
in phreneticis maxime . Alius autem mala ē ex toto suppressa .  
Periculosa etiam quæ inter febres fluens conquiescere hominē  
in cubili non patitur: utiq; si quod descendit: est perliquidum  
aut albidum / aut pallidum / aut spumans . Præter hæc periculū  
ostendit id quod excernitur si est exiguum . glutinosum . leue:  
album / idem que subpallidum: uel si est aut liuidum aut bilio-  
sum aut cruentum aut peioris odoris / quam ex consuetudine .  
Malum est etiam: quod post longas febres sincerum est .

DE SIGNIS LONGAE VALITVDINIS  
CAPVT QVIN TVM

**P**ost hæc inditia notum est longum morbum fieri . Sic  
enim necesse est / nisi occidit . Neq; uixialis spes in malis  
magnis est: q; ut ipetū morbi trahendo aliquis effugiat: porri



gatur que in id tempus / quod curationi locum præstet . Proti-  
nus tamen signa quædam sunt: ex quibus colligere possumus  
morbum & si non interemerit / longius tamen tempus habiturū:  
Vbi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput cācum  
& ceruices oritur. Aut ubi febre non quiescente corpus insudat.  
Aut ubi corpus modo frigidum / modo calidum est: & color  
alius ex alio fit. Aut ubi quod inter febres aliqua parte absces-  
sit: ad sanitatem non peruenit. Aut ubi æger pro spacio parū  
emacrescit. Item si urina modo liquida & pura est: modo ha-  
bet quædam subsidientia leuia: atq; alba rubra ue sunt quæ in  
ea subsidunt. aut si quasdam quasi maculas representat. aut si  
bullulas excitat.

DE INDITIIS MORTIS CAPVT QVINTVM

**S**ed inter hæc quidem proposito metu spes tamen superest .  
Ad ultima uero iam uentum esse testantur / nares acutæ:  
collapsa tempora: oculi concaui. frigidæ / languidæ que aures  
& imis partibus leniter uersæ: cutis circa frontem dura & intē-  
ta: color aut niger / aut per pallidus. multo q; magis si ita hæc  
sunt: ut neq; uigilia præcesserit: neq; uentris resolutio: neq; in-  
edia. Ex quibus causis interdum hæc species oritur: sed uno die  
finitur. Itaq; diutius durans mortis index est. Si uero in mor-  
bo uetere iam triduo talis est: in propinquo mors est: magis  
que si præter hæc oculi quoq; lumen refugiunt & illacrimant.  
quæ q; in his alba esse debent: rubescunt: atq; in hisdem uenu-  
læ pallent: pituita que in his innatans nouissime angulis inhæ-  
rescit: alterq; ex his minor est: hicq; aut uehemēter subsederūt /  
aut facti tumidiore sunt: perq; somnum palpebræ nō cōmitū-  
tur: sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neque id  
fluēs alius expressit: eadē que palpebræ pallent: & idē pallor  
labra & nares decolorat. Eadem que labra & nares oculi que  
& palpebræ & supcilia: aliqua ue ex his pueruntur: isq; ppter  
imbecillitatem iā non audit / aut non uidet eadem: mors denū-  
ciatur . Vbi ægri supini cubant: hisque genua contracta sunt.



Vbi is deorsum ad pedes sub inde delabitur. Vbi brachia & crura nudat & inaequaliter dispergit: neq; his calor subest. Vbi hiat. Vbi assidue dormit. Vbi is qui mentis lux non est: neq; id facere sanus solet: dentibus stridet. Vbi ulcus quod aut ante, aut in ipso morbo natum est: aridum & aut pallidum aut liuidum factum est. Illa quoq; mortis inditia sunt: ūgues / digitiq; pallidi: frigidus spiritus: aut si manibus quis in febre & acuto morbo uel in sania / pulmonis ue dolore uel capitis / in ueste floccos legit: fimbrias ue diducit: uel in adiuncto pariete siqua minuta eminent: carpit. Dolores etiam circa coxas & inferiores partes orti si aduiscera transierunt subitoq; deserunt / mortem subesse testantur: magisq; si alia quoque signa accesserunt. Neq; is seruari potest / qui sine ullo timore febricitans subito strangulatur: aut deuorare saliuam suam non potest. Cui ue ineodem febris corporis que habitu ceruix conuertitur sic ut deuorare æque nihil possit. Aut cui simul & continua febris & ultima corporis infirmitas est. Aut cui febre non quiescente exterior pars friget: interior sic calet: ut etiam siti faciat. Aut qui febre æque non quiescente / simul & delirio & spirandi difficultate uexatur. Aut qui epoto ueratro exceptus distentione neruorum est. Aut qui ebrius obmutuit. Is enim febre adiecta neruorum distentione cōsumitur: nisi aut febris accessit: aut eo tempore / quo ebrietas solui debet: loqui cepit. Mulier quoq; grauida acuto morbo facile consumitur: & is cui somnus dolorem augeat: & cui protinus in recenti morbo bilis atra uel infra uel supra se ostendit: cui ue alterutrum modo se prompsit: cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatū & affectum: sputum etiā biliosum & purulentum. siue separati ista: siue mixta proueniunt interitus periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem tale esse corpit: proximum est ut is circa quartum decimum diem decedat: nisi alia signa meliora / peiora ue accesserint. Quæ quo leuiora grauiora ue sub secuta sunt: eo uel seriore mortem / uel maturiorem denuntiant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est. atq; in omni



morbo uomitus / qui uarius & multorum colorum est: præcipue  
que si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in febre  
uomuisse pestiferum est. Urina uero rubra & tenuis in magna  
cruditate esse consuevit: & sæpe ante quam spatium maturescat  
hominem rapit. Itaque si talis diutius permanet: periculum mor-  
tis ostendit. Pessima tamen est præcipueq; mortifera / nigra.  
crassa. mali odoris. Atque in uiris quidem & mulieribus talis  
deterrima est. In pueris uero quæ tenuis & diluta est. Aluus  
quoque uaria pestifera est: quæ strigmentum: sanguinem: bilē  
uiridem: aliquid modo diuersis temporibus / modo simul: &  
in mixtura quadam / discreta tamen representat. Sed hæc qui-  
dem potest paulo diutius trahere. In præcipiti uero iam esse  
denūtiat quæ liquida: eadem que uel nigra uel pallida uel pin-  
guis est: utique si magna foeditas odoris accessit. Illud inter-  
rogari me posse ab aliquo scio. Si certa futuræ mortis indicia  
sunt: quomodo interdum deserti a medicis conualescant: quos-  
dam que fama prodiderit in ipsis funeribus reuixisse. Quin e-  
tiam uir iure magni nominis Democritus ne finitæ quidem ui-  
tæ satis certas notas esse proposuit. quibus medici credidisset  
adeo illud non reliquit / ut certa aliqua signa futuræ mortis ef-  
sent. Aduersus quos ne dicam illud quidem: quod in uicino  
sæpe quaedam notae positæ non bonos sed imperitos me-  
dicos decipiunt: quod Asclepiades funeri obuius intellexit e-  
um uiuere qui efferebatur: ne protinus crimē artis esset si quod  
professoris sit: illa tamen moderatius subiiciam. Coniectura  
lem artem esse medicinam: rationem q; cōiecturæ talem esse:  
ut cum sæpius aliquando responderit: interdum tamen fallat  
nos. Siquid itaque uix in millesimo corpore aliquando decipit:  
id notam non habet: cum per innumerabiles homines respon-  
deat. Id que non in iis tantum / quæ pestifera sunt / dico: sed  
in iis quoque quæ salutaria. Siquidem etiam spes interdum fru-  
stratur & moritur aliquis: de quo medicus securus primo fuit.  
Quæ que medendi causa reperta sunt non nunquam in peius  
aliquid conuertunt. Neque id euitare humana imbecillitas in tā



ta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinae fides: quæ multo sæpius per quæ multo plures ægros prodest. Neque tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces magis notas esse & salutis & mortis.

DE NOTIS quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit. CAPVT. VII.

**S**ed cum proposuerim signa quæ in omni aduersa ualitudine communia esse consueverunt: ea quoque transibo: ut quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit notas idcirco. Quædam autem sunt / quæ ante febres: quædam quæ inter eas quid / aut intus sit / aut uenturum sit: ostendunt. Ante febres. Si caput graue est: aut ex somno oculi caligant: aut frequentia sterutamenta sunt: circa caput aliquis pituitæ impetus timeri potest. Si sanguis aut calor abundat: proximum est ut aliqua parte profluium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit: ne in malum habitum corpus eius recidat / metus est. Si præcordia dolent: aut inflammatio grauis est: aut non toto die concocta fertur urina: cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio malus est: si uel capitis doloribus confluantur: uel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam & tumidam: aut capite / aut uisceribus / aut aluo laborant. Si in continua febre puero uenter nihil reddit: mutaturque ei color: nec somnus accedit: ploratque is assidue: metuenda neruorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore tenui / longoque tabem timendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit aluus: docet aut subitam deiectionem / aut febriculam instare. Vbi pedes turgent: longæ deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre & coxis est: aqua intercutem instat. Sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum periculum est iis: quibus uoluntas desidendi est: uenter nihil reddit: nisi & ægre & durum. tumor in pedibus est: idemque modo dextra / modo sinistra parte uentris inuicem oritur atque finitur: sed a



iocinere id malum proficisci uidetur. Eiusdem morbi nota ē:  
Vbi circa umbilicum intestina torquentur ( Strophon græci  
nominant ) coxæq; dolores manent: ea que neq; tempore neque  
remediis soluantur. Dolor autem articulorum pro ut in pedi  
dibus manibus ue aut alia qualibet parte sic est: ut eo loco ner  
ui contrahantur: aut si id membrum ex leui causa fatigatum &  
que frigido calido q; offenditur: podagram chiragram ue/ uel  
eius articuli inquo id sentitur morbum futurum esse denūtiat.  
Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit: dein fluere desi  
it: ii uel capitis doloribus conflictentur necesse est: uel in arti  
culis aliquas exulcerationes graues habeant: uel aliquo morbo  
etiam debilitentur. Quibus foeminis menstrua non proueni  
unt: necesse est capitis acerbissimi dolores sint: uel quælibet  
alia pars morbo infestetur. Eademq; iis pericula sunt: quibus  
articulorum uicia dolores tumoresq; sine podraga similibusq;  
morbis oriuntur & desinunt. Vtiq; si sæpe tempora iisdem do  
lent: noctu que corpora insudant: si frons prurit: lippitudinis  
metus est. Si mulier a partu uehementes dolores habet: neque  
præter ea signa mala sunt: circa uigesimum diem aut sanguis  
p nares erumpet: aut i inferioribus partibus aliquid abscedet.  
Quicumq; etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem  
habeat: is alterutra ratione eum finiet: magis que si iuuenis e  
rit/ per sanguinis profusionem: si senior/ per suppurationem.  
Febris autem quæ subito sine ratione sine bonis signis finita  
est: fere reuertitur. Cui fauces sanguine & inter diu & noctu re  
plentur sic ut neque capitis dolores: neque præcordiorum: ne  
que tussis: neque uomitus: neque febricula præcesserit: huius a  
ut in naribus/ aut in faucibus ulcus reperiatur. Si mulieri ex in  
guine febricula orta est: neque causa apparet: ulcus iuuulua est.  
Urina autem crassa exqua quod desider album est: significat  
circa articulos/ aut circa uiscera dolorem metum que morbi es  
se. Eadem uiridis aut uiscerum dolorem tumorem que cum ali  
quo periculo subesse: aut certe corpus integrum non esse testa  
tur. At si sanguis aut pus in urina est: uel uesica uel renes exul



cerati sunt. Si hæc crassa carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet: aut si bullat & male olet & interdum quasi harenam / interdum quasi sanguinem trahit: dolent autem coxæ: quæ que inter has super que pubem sunt: & accedunt frequentes ructus: interdum uomitus biliosus: extremæ que partes frigeſcunt: urinæ crebra cupiditas sed magna difficultas est: & quod inde excretum est aquæ simile uel rufum uel pallidum est: paulum tamen in eo leuamenti est: aluus uero cum multo spiritu redditur: utiq; in renibus uitium est. Aut si paulatim destillat: uel si sanguis per hanc editur: & in eo quædam cruenta concreta sunt: id que ipsum cum difficultate redditur: & circa pubem inferiores partes dolent: in eadem uesica uitium est. Calculosi uero his inditiis cognoscuntur. Difficulter uirina redditur: paulatim que interdum etiam sine uoluntate destillat. Eadem harenosa est: nō nunq̃ aut sanguis / aut cruentum / aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eam que quidam promptius recti: quidam resupinati: maxime q̃ ii qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt: colem q̃ extendendo / dolorem leuant. Grauitatis quoq; cuiusdam in ea parte sensus est: atq; ea cursu omni q̃ motu augmentur. Quidā etiam cum torquentur: pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Foemina uero oras naturalium suorum manibus ad motis scabere crebro coguntur. Non nunquam si digitum ad mouerunt ubi uesicæ cervicem is urget: calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant: his in pulmone uitium est. Mulieri gravidæ sine modo fusa aluus elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit: imbecillum est quod intus gerit. Duræ mammæ sanum illud esse testantur. Frequens singultus & præter consuetudinem continuus: iecur inflatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt: id que a tergo incidit: uel distentio neruorum: uel rigor timeri potest. At si a priore parte id euenit: uel lateris acutus dolor: uel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum: quæ tutissima inter hæc est: profusio alui sequitur. Si



ora uenarum sanguinem solita fundere subito suppressa sunt: aut aqua inter cutem / aut tabes sequitur . Eadem tabes subit si in lateris dolore orta suppuratio / intra quadraginta dies purgari non potuit . At si longa tristitia cum longo timore & uigilia est: atræ bilis morbus subest . Quibus sæpe exnaribus fluat sanguis: iis aut lienis tumet: aut capitis dolores sunt: quos sequitur ut quædam ante oculos tanquam imagines obuersentur . At quibus magni lienēs sunt: iis gingiuarum male sunt: & os olet: aut sanguis aliqua parte prorumpit . Quorum si nihil euenit: necesse est incuribus mala ulcera & ex his nigrae cicatrices fiant . Quibus causa doloris neque sensus eius est: iis mens labat . Si in uentrem sanguis confluxit: ibi in pus uertitur . Si a coxis & ab inferioribus partibus dolor in pectus transit: neque ullum signum malum accessit: suppurationis eoloco periculum est . Quibus sine febre aliqua ex parte dolor aut prurigo cum rubore aut calore est: ibi aliquid suppurat: Urina quoque quæ in homine sano parum liquida est: circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat . Hæc uero cum sine febre quoque uel latentium uel futurarum rerum notas habeant: multo certiora sunt ubi febris accessit: atque etiam aliorum morborum signa nascuntur . Ergo protinus insania timenda est / ubi expeditior alicuius, quam sani fuit sermo est: subitaque loquacitas orta est: & hæc ipsa solito audacior . aut ubi raro quis & uehementer spirat: uenasque concitatas habet præcordiis duris & tumetibus . Oculorum quoque frequens motus: & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: uel nullo dolore substante somnus ereptus: continuata que nocte & die uigilia: uel prostratum contra consuetudinem corpus in uentrem sic ut ipsius alui dolor id non coegerit . Item robusto adhuc corpore insolitus dentiū stridor / insaniæ signa sunt . Siquid etiam abscessit: & antequam suppuraret manente adhuc corpore insolita febre subsedit: periculum affert primum furoris / deinde interitus . Auris quoque dolor acutus cum febre continua uehementi que sæpe mentem turbat: & ex eo casu iuniores / interdum intra septimum diem



moriuntur: seniores tardius. quoniam neque æque magnas febres  
 experiuntur: neque æque insaniunt. ita sustinent dum is affectus  
 intus uersatur. Suffuse quoque sanguine mulieris mammae / furo-  
 rem uenturum esse testantur. Quibus autem longae febres  
 sunt: iis aut abscessus aliqui: aut articulorum dolores erunt.  
 Quorum faucibus in febre illiditur spiritus: instat iis neruo-  
 rum distentio. Si angina subito finita est: in pulmonem id ma-  
 lum transit: id que sæpe intra septimum diem occidit. Quod  
 nisi incidat: sequitur ut aliqua parte suppuret. Deinde post al-  
 iam longam resolutionem / tormina: Post hæc / intestinorum le-  
 uitas oritur. Post nimias destillationes / tabes. post lateris do-  
 lores / uicia pulmonum. post hæc / insania. Post magnos feruo-  
 res corporis / neruorum rigor aut distentio. Vbi caput uulnera-  
 tum est / delirium. Vbi uigilia torset / neruorum distentio.  
 Vbi uehementer uenæ super ulcera mouentur / sanguinis pro-  
 fluuium erit. Suppuratio uero pluribus morbis excitatur. Nam  
 si longæ febres sine dolore / sine manifesta causa remanent: in  
 aliquam partem id malum incumbit: in iunioribus tamen. nam  
 in senioribus ex eiusmodi morbo quartana fere nascitur. Ea-  
 dem suppuratio fit / si præcordia dura dolentia ante uigesimū  
 diem hominem non sustulerunt: neque sanguis ex naribus fluxit:  
 maxime que in adolescentibus. utique si inter principia aut oca-  
 lorum caligo / aut capitis dolores fuerunt: sed cum inferioribus  
 partibus aliquid abscessit. Aut si præcordia tumorem mollem  
 habent. neque habere intra sexaginta dies desinunt: hæret que  
 per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit  
 abscessus: ac si inter ipsa ulcera non fuit / circa aures erumpit.  
 Cum quæ omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet:  
 magis eo tendit is / qui in præcordiis: quam is / qui infra est. Si  
 lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis / uel in ar-  
 ticularibus aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis & cruda  
 sic diu fertur / ut alia salutaria signa sint. Ex quo eo casu plerū-  
 que infra transversum septum: quod diaphragma greci uocant:  
 fit abscessus. Dolor autem pulmonis si neque per sputa / neque



per cucurbitulas / neq; per sanguinis detractionem / neque per  
uictus ratione finitus est: uomica aliquas interdū excitat aut  
circa uigesimum diem / aut circa quadragesimum / non nunq̃  
etiam circa sexagesimum . numerabimus autem ab eo die / quo  
primum febricitauit aliquis / aut inhorruit / aut grauitatem eius  
partis sensit . Sed hæ uomicæ modo a pulmone / modo a con  
traria parte nascuntur . Quod suppurat ab ea parte quam af  
ficit / dolorem inflammationem que concitat ipsum calidius  
est: & si in partem sanam aliquis decubuit / onerare eam expō  
dere aliquo uidetur . Omnis etiam suppuratio / quæ non dum  
oculis patet sic deprehendi potest . Si febris nō dimittit: eaq;  
interdiu leuior est: noctu increfcit: multus sudor oritur: cupi  
ditas tussendi est & pene nihil in tussi excreatur: oculi caui  
sunt: malæ rubent: uenæ sublingua inalbescunt: in manibus fi  
unt adunci unguis: digiti / maximeq; summi / pallent: in pedi  
bus tumores sunt: spiritus difficiliter trahitur: cibi fastidium  
est: pustulæ toto corpore oriuntur . Quod si protinus initio  
dolor & tussis fuit & spiritus difficultas: uomica uel ante uel  
circa uigesimum diem erumpet . Si serius ista coeperint: neces  
se est quidem increfcant . sed quo minus cito affecerint / eo  
tardius soluentur . Solent etiam in graui morbo pedes cū digi  
tis unguibusq; nigrescere . Quod si non est mors consecuta &  
reliquum corpus inualuit: pedes tamen decidunt .

QVAE NOTAE in quoq; morbi genere uel spem uel peri  
cula ostendant . CAPVT . VIII.

**S** Equitur ut in quoq; morbi genere pprias notas explicē:  
quæ uel spē uel piculū ostendāt . Ex uesica dolere si puru  
lenta urina pcessit: iq; ea leue & albū subsedit: metum detra  
hit . In pulmonis morbo si sputo ipse leuatur dolor quāuis id  
purulentum est: tamen æger facile spirat: facile excreat: mor  
bum ipsum non difficulter fert: potest ei secunda ualitudo  
contingere . Neq; inter initia terreri conuenit si protinus spu  
tum mixtū est ruffo quondā & sanguine / dūmodo statim edatur .  
d.i.



Laterū dolores suppuratione facta: deinde intra quadragesi-  
mū diem purgata finiuntur. Si in iocinere uomica est & ex  
ea fertur pus purum & album: salus ei facilis. Id enim malum  
in tunica est. Ex suppurationibus uero ex tolerabiles sūt: quæ  
in exteriorem partem feruntur & acuuntur. Et ex iis quæ in-  
tus procedunt: ex leuiore; quæ contra se cutem non afficiunt:  
eamq; & sine dolore esse & eiusdem coloris / cuius reliquæ par-  
tes sunt: sinunt esse. Pus quoq; quacunq; parte erumpit: si est  
leue album & unius coloris: sine ullo metu est: & quo effuso  
febris protinus conquieuit: desieruntq; urgere cibi fastidium  
& potionis desiderium. si quando etiam suppuratio descendit  
in crura: sputumq; eiusdem factum pro rusto purulentum est:  
periculi minus est. At in tabe eius qui saluus futurus est: spu-  
tum esse debet album / æquale totum / eiusdemq; coloris sine pi-  
tuita: eiq; etiam simile esse oportet siquid in nares a capite de-  
stillat. Longe optimum est febrem omnino non esse: secundū  
est / tantulum esse: ut neque cibum impediāt: neque crebram si-  
tīm faciat. Alius in hac ualitudine ea tuta est: quæ quotidie  
coacta: ea que convenientia iis quæ assumuntur reddit. Cor-  
pus id quod minime tenue maxime que lati pectoris atque se-  
tosi est: cuius que cartilago exigua & carnosā est. Super ta-  
bem si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt & circa pec-  
tus atque scapulas dolor mansit: subito que sanguis erupit: le-  
uari morbus solet. Nam & tussis minuitur & sitis atque febrī-  
culæ desinunt. Sed iisdem fere nisi redit sanguis / uomica erū-  
pit. quæ quo cruentior / eo melior est. Aqua autem intercutem  
minime terribilis est: quæ nullo antecedente morbo coepit de-  
inde quæ longo morbo superuenit. Vtq; si firma uiscera sūt.  
si spiritus facilis. si nullus dolor. si sine calore corpus est: æ-  
qualiter que in extremis partibus macrum est. si uenter mol-  
lis. si nulla tussis: nulla sitis. si lingua ne per somnum quidē  
inarescit. si cibi cupiditas est. si uenter medicamentis moue-  
tur. si per se excernit mollia & figurata. si extenuatur. si uri-  
na & uini mutatione & epotis aliquibus medicamentis mutatur.



Si corpus sine lassitudine est & morbum facile sustinet. Siqui-  
dem in quo omnia hæc sunt: is ex toto tutus est: in quo plura  
ex his sunt: si in bona spe est. articulorum uero uicia ut poda-  
græ chiragrae quæ si iuuenes tentarunt / neque callum induxe-  
runt: solui possunt: maximeq; torminibus leniuntur & ex quo  
cunque modo uenter fluit. Item morbus comitialis ante puber-  
tatem ortus non ægre finitur: & in quo ab una parte corporis  
uenientis accessionis sensus incipit. optimum est a manibus /  
pedibus uel initium fieri: deinde a lateribus: pessimum inter  
hæc a capite. atq; in his quoque ea maxime prosunt: quæ p de-  
iectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est  
quæ sine febre est. si celeriter desinit: si contracto uentre nul-  
lus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur.  
Acia tormina quidem periculosa non sunt / si sanguis & strig-  
menta descendunt / dum febris exteræq; accessiones huius mor-  
bi absint. adeo ut etiam grauida mulier non solum reseruari  
possit: sed etiam parum reseruare. Prodestq; in hoc morbo  
si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorum leuitas  
facilius a teneris ætatibus depellitur: utique si ferri urina & a-  
lii cibo corpus incipit. Eadem aeris prodest & in coxæ dolo-  
re & humerorum & in omni resolutione neruorum. Ex quibus  
coxa si sine torpore est: si leuiter friget: quamuis magnos  
dolores habet: tamen & facile & mature sanatur. resolutum  
que membrum / si nihilominus aliter fieri sanum potest. ois  
resolutio etiam alio cita finitur. Omnis que deiectio lip-  
pienti prodest. At uarix ortus: uel per ora uenarum subita  
profusio sanguinis: uel tormina / inianiam tollunt. Hu-  
merorum dolores / qui ad scapulas uel manus tendunt / uo-  
mitu atrae bilis soluantur. Et quisquis dolor deorsum ten-  
dit / sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas  
deiectiones supprimit uomitus. Mulier sanguinem uomens p  
fusis menstruis liberatur. Quæ menstruis non purgatur: si san-  
guinem ex naribus fudit òni piculo uacat. Quæ locis laborat  
aut difficulter parum edit sternutamento leuatur. aestiua quare  
d ii



na fere brevis est cui calor & tremor est: saluti delirium est. Lienosis bono termina sunt. Denique ipsa febris: quod maxime mirum uideri potest: saepe praesidio est. Nam & praecordiorum dolores: si sine inflammatione sunt: finit: & in iocineris dolore succurrit: & neruorum distentionem rigoremque / si postea coepit: ex toto tollit. & ex difficultate urinae morbum tenuioris intestini ortum: si urinam per calorem mouet: leuat. At dolores capitis quibus oculorum caligo & rubor cum quadam frontis prurigine accedunt: sanguinis profusione uel tortu uel etiam petita summouentur. Si capitis ac frontis dolores ex uento uel frigore aut aestu sunt: grauedine & sternutamentis finiuntur. Febrem autem ardentem: quam graeci causoden uocant: subitus horror ex oluit. Si in febre aures obtusae sunt: si sanguis e naribus fluxit: aut uenter resolutus est: illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem quam biliosa aluus potest. Quibus in fistulae urinae uti minuti abscessus: quos chinata graeci uocant: esse coeperunt: iis ubi pus ea parte profluxit: sanitas redditur. ex quibus cum pleraque per se proueniant: scire licet inter ea quaeque / quae ars adhibet / naturam plurimum posse. Contra si caput febre continenti dolet: neque quicquam reddit: malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris a septimo anno ad quartum decimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit: deinde a septimo die coepit & ultra septimum mansit: periculosum est. Quantoque magis mixtos neque inter se diductos colores habet: tanto deterius. Et tamen nihil peius est quam sincerum id ledi / siue rufum est / siue cruentum / siue album / siue glutinosum / siue pallidum / siue spumans. nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt crassa: destillatio: etiam quod alias salutare habetur sternutamentum. Periculosissimumque est si haec secuta subita deiectio est. Fere uero quae in pulmonis / eadem in lateris doloribus et mitiora signa & asperiora esse consueverunt. Ex iocinere si pus cruentum exierit:



mortiferum est. At ex suppuracionibus ex pessimæ sunt: quæ  
intus tendunt sic ut exteriorem quoque cutem decolorent. Ex  
iis deinde, quæ i exteriorem partem prorumpit: quæ maxime /  
quæ q̄ planissime sunt. Quod si ne rupta quidem uomica uel  
pure extrinsecus emissio febris quieuit: aut quauis quieuerit /  
tamen repetit: item si sitis est: si cibi fastidium: si uenter liq̄  
dus: si pus est liquidum & pallidum: si nihil æger excreat / nisi  
pituitam spumantem: periculum certum est. Atque ex iis qui  
dem suppuracionibus: quas pulmonum morbi concitarunt: fere  
senes moriuntur: ex cæteris iuniore s. At in tabe sputum mi  
xtum / purulentum / febris assidua: quæ & cibi tempora eripit  
& siti affligit: in corpore tenui periculum subesse testatur. Si  
quis etiam in eo morbo diutius traxit: ubi capilli fluunt: ubi  
urina quædam araneis similia subsidencia ostendit: atq; in his  
odor foedus est: maxime que ubi post hæc orta deiectio est:  
protinus moritur. Vtiq; si tempus autumnus est: quo fere qui  
cætera parte anni traxerunt: resoluuntur. Item pus expulisse  
in hoc morbo: deinde ex toto spere desisse: mortiferum est.  
Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomica / fistula  
que oriri: quæ non facile sanescunt: nisi si multa signa bonæ  
ualitudinis subsecuta sunt. Ex reliquis uero minime facile sa  
nantur uirgines / aut ex mulieres: quibus super tabem menstru  
a suppressa sunt. Cui uero sano subitus dolor capitis ortus ē:  
dein somnus oppressit sic ut stertat / neq; expergiscatur: intra  
septimum diem pereundum est: magis si eum alius cita non  
antecefferit. Si palpebræ dormientis non coeunt. si album  
oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur: si id ma  
lum non est febre discussum. At aqua intercutem si ex acu  
to morbo coepit / ad sanitatem raro perducitur. utique si con  
traria his quæ supra posita sunt: subsequuntur. æque in ea  
quoque tussis spem tollit. Item si sanguis sursum deorsumq;  
erupit: & aqua medium corpus impleuit. Quibusdā etiā i hoc  
morbo tumores oriuntur: deinde desinunt: deinde rursus assur  
gūt. Hi quidē tutiores sūt / q̄ q̄ supra cōprehēsi sūt / si accēdūtur  
d. iii.



Sed fere fiducia secundæ ualitudinis opprimuntur. Illud iure aliquis mirabitur: quomodo quædam simul & affligunt nostra corpora & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua intercutem quem impleuit: siue in magno abscessu multum puris coit: si mul id omne effudisse æque mortiferum est: ac si quis sani corporis uulnere factus exanguis est. Articuli uero qui sic dolent ut super eos ex callo quædam tubercula innata sunt: nunquam liberantur. quæ que eorum uitia uel in senectute coeperunt: uel in senectute ab adolescentia perueniunt: ut aliquando leniri possunt: sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitalis post annum quintum & uigesimalum ortus ægre curatur: multo que egrius is qui post quadragesimalum annum coepit: adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei: uix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur: neque ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est: sed homo ex improviso concidit. cuiuscunque ætatis est: uix sanescit. Si uero aut mens læsa est: aut nervorum facta resolutio: medicinz locus non est. Deiectionibus quoque si febris accessit: si inflammatio iocineris: aut præcordiorum: aut uentris: si in modica sitis: si longius tempus: si alius uaria: si cum dolore est: et iam mortis periculum subest. maxime que si inter hæc: tormina uetera esse coeperunt. Is que morbus maxime pueros absumit usque ad annum decimum. Cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest: atque etiam si ipsa conualuit: partum tamen perdit. Quin etiam tormina ab atra bile orta mortifera sunt: aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra alius profluxit: aut intestinorum leuitas. Periculosior est: si frequens deiectio est. Si uenter omnibus horis & cum somno & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdiu. si quod excernitur aut crudum est: aut nigrum: & præter id etiam leue & mali odoris sit. si sitis urget. si post potiouem urina non redditur. quod euenit quia tunc liquor omnis non in uesicam: sed intestina descendit. si os exulceratur. si rubet facies & quasi maculis quibusdam colorum omnium



distinguitur. si uenter est quasi fermentatus: pinguis atq; rugosus. si & cibi cupiditas non est. Inter quæ cum euidentis mors sit: multo euidentior est: si iam longum quoq; id uitium est: maxime etiam si in corpore senili est. si uero intenuiore intestino morbus est: uomitus: singultus: neruorum distentio: delirium / mala sunt. At in morbo arguato durum fieri iecur pernitiosissimum est. Quos lienis male habet si tormina prebenderunt: deinde in uersa sunt / uel in aquam intercutem / uel in testinorum leuitatem: nix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris / nisi resolutus est / intra septimum diem occidit. Mulier ex partu si cum febre uehementibus etiam & assiduus capitis doloribus premitur: in periculo mortis est. si dolor atq; inflammatio est in iis partibus / quibus uiscera continentur: frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est: & in ceruices ac scapulas transit: rursusq; in caput reuertitur: aut a capite ad ceruices scapulasq; peruenit: perniciosus est: nisi uomitam aliquam excitauit sic / ut pus excussiretur: aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit: aut nisi in capite multa prurigo: toto ue corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est ubi torpor atq; prurigo peruegantur modo per totum caput modo in parte: aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est: eaq; ad summam quoque linguam perueniunt. Et cum in hisdem abscessibus auxilium sit: eo difficilior sanitas est / quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est: frigescit que crus & coxa: alius nisi coacta non reddit: id que quod excernitur mucosum est: iam que ætas eius hominis quadragesimum annum excessit: is morbus erit longissimus: minime que annuus: neq; finiri poterit / nisi aut uere aut autumno. Difficilis etq; curatio est in eadem ætate ubi humerorum dolor / uel ad manus peruenit / uel ad scapulas tendit: torporem que & dolorem creat: neq; bilis uomitu leuatur. Quacumq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est: si neq; mouetur & emacrescit: in pristinum habitum non reuertitur: eo q; minus quo ne



tustius id vitium est: & quo magis in corpore senili est. Omnis resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt hyems & autumnus. aliquid sperari potest vere & æstate. Isq; morbus mediocris uix sanatur. uehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ patet / qui sursum procedit. Mulieri grauidæ / si subito mammae emacuerunt: abortus periculum est. Quæ neq; peperit / neq; grauida est si lac habet: a mensuris defecta est. Quartana æstima brevis: autumnalis fere longa est: maximeq; quæ coepit hyeme appropinquante. si sanguis profluxit. deinde secuta est dementia cum distinctione nervorum / periculum mortis est. Itemq; si medicamentis purgatum & adhuc inanem nervorum distentio oppressit: aut si in magno dolore extremæ partes frigent. Neq; is ad uitam redit: qui ex suspensio spumante ore detractus est. Alius nigra sanguini atro similis repentina siue cum febre siue etiam sine hac est: perniciofa est.

#### DE MORBORVM CVRATIONIBVS CAPVT VIII

**C**ognitis inditiis / quæ nos uel spe consolentur / uel metu terreant: ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt: quædam propriæ. cōmunes / quæ pluribus morbis opitulātur. Propriæ / quæ singulis. Ante de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam nō ægros solū: sed sanos quoq; sustinent. quædam in aduersa tantum ualitudine adhibentur. Omne uero auxilium corporis / aut demit aliquam materiam: aut adiicit: aut euocat: aut reprimit: aut refrigerat: aut calefacit: simul que aut durat aut mollit. Quædam non uno modo tantum: sed etiam duobus inter se non contrariis adiuuant. Demitur materia / sanguinis detractione: cucurbitula: deiectione: uomitu: frictione: gestatione: omni que exercitatione: corporis abstinentia: sudore. De quibus protinus dicam.



De sanguinis detractioe per uenas.

CVFVT. VIII.

**S**anguinem incisa uena mitti nouum non est. Sed nullum pene morbum esse / in quo non mittatur / nouum est. Item mitti iunioribus & foeminis uterum non gerentibus / uetus est. In pueris uero idem expiri & in senioribus & in grauidis quoq; mulieribus: uetus non est. siquidem antiqui primam ultimamq; ætatem sustinere non posse hoc auxilii genus indicabant: persuaserant que sibi mulierem grauidam / quæ ita curata esset abortum esse facturam. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum: alias que potius obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim nō quæ ætas sit: neque quid in corpore intus geratur: sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis / imbecillus est: aut si mulier. quæ grauida non est / parum ualet: male sanguis emittitur. emoritur enim uis si quæ supererat hoc modo erepta est. ac firmus puer & robustus senex & grauida mulier ualens / tuto curantur. Maxime tamen in his medicus im peritus falli potest: quia fere minus roboris illis ætatibus subest. Mulieriq; pragnāci pō curationem quoq; uiribus opus est / non tantum ad se sed etiā ad partum sustinendum. Non quicquid autem intentionem animi aut prudentiam exigit / prorsus faciendum est. cum præcipua in hoc ars sit: quæ non annos numeret / neq; conceptionem solam uideat: sed uires æstimet: & ex eo colligat: possit nec ne superesse quod uel puerum / uel senem uel in una muliere quod duo corpora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus & obesum: inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis: plenioribus magis caro abundat. Facilius itaq; illi detractioem eiusmodi sustinent: celeriusq; ea si nimium est pinguis affligitur. Ideoq; uis corporis melius ex uenis q̄ ex ipsa specie æstimatur. neq; enim solum hæc consideranda sunt: sed etiam morbi genus quot sit. Vtrum supans an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit an integrum. Nam si ma



tertia uel deest. uel integra est istud alienum est. at si uel co-  
 pia sui male habet. uel corrupta est: nullo modo melius succur-  
 ritur. Ergo uehemens febris ubi rubet corpus / plene que ue-  
 næ tument. sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum  
 morbi neruorumq; resolutio & rigor & distentio: quicquid. de-  
 niq; fauces difficultate spiritus strāgulat. q̄cquid subito sup-  
 primit uocem. q̄squis intollerabilis dolor est: & quacunq; de  
 causa ruptum aliquid intus atq; collisum est. Item malus cor-  
 poris habitus: omnesq; acuti morbi: qui modo ut supra dixi  
 non infirmitate sed onere nocent. fieri tamen potest / ut mor-  
 bus quidem id desideret: corpus autem uix pari posse uidea-  
 tur. Sed si nullum tamen apparet aliud auxilium: periturusq;  
 sit qui laborat nisi temeraria quoq; uia fuerit adiutus. in hoc  
 statu boni medici est ostendere: quam nulla spes sine sangui-  
 nis detractione sit. fateriq; quantus in hac ipsa re metus sit.  
 Et tum demum si exigetur: sanguinem mittere. De quo dubita-  
 ri in eiusmodi re non oportet. Satius est. n. anceps auxilium  
 experiri. quam nullum. Idq; maxime fieri debet ubi nerui re-  
 soluti sunt. Vbi subito aliquis obmutuit: ubi angina strangu-  
 latur: ubi prioris febris accessio pene confecit: paremq; subse-  
 q̄ uerisimile est. neq; eandem uidentur sustinere ægri uirespos-  
 se. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus: tamen ne  
 id quidem ppetuum est. Neq; enim semper concoctionem res  
 expectat: ergo si ex superiore parte aliquis decidit. si cōtus-  
 est. si ex aliquo subito casu sanguinem uomit: quanuis paulo  
 ante sumpsit cibum: tamen protinus ei demenda materia est:  
 ne si subsederit: corpus affligat. Idemq; etiam in aliis casibus  
 repentinis / qui strangulabūt / dictum erit. At si morbi ratio  
 patitur: tum demum nulla cruditatis suspicionem remanente  
 id fiet. Ideoq; ei rei uidetur aptissimus aduersæ ualitudinis di-  
 es secundus aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die  
 sanguinem mittere necesse est: sic non uquam utile post diem  
 quartum est: cum iam spatio ipso materia & ex haurita est &  
 corpus corrumpit: ut detractro imbecillum: id facere possit:



non possit integrum. Quod si uehemēs febris urget: in ipso impetu eius sanguinem mittere: hominē iugulare est. Expectanda ergo remissio est. si non decrescit: sed crescere desinit: neq; speratur remissio: tunc quoq; quanuis peior / sola tamen occasio non omittenda est. Fere etiam ista medicina ubi necessaria est: in biduum diuidenda est. Satiū est enim in primum leuare ægrum: deinde perpurgare: quam simul ōniui effusa fortasse præcipitare. Quod si in cura quoque a quæ / quæ intercutem est ita respōdet: quanto magis necesse est in sanguine respondeat? Mitte uero is debet / si totius corporis causa fit: ex brachio. si partis alicuius: ex ea ipsa parte / aut certe q̄ proxima. quia non ubiq; mitti potest: sed in temporibus: in brachiis: iuxta talos. Neq; ignoro quosdā dicere quam longissime sanguinem inde / ubi lædit: esse mittendum. Sic enim auerti materiæ cursam: at illo modo in id ipsum quod grauat: euocari. Sed id falsum est. Proximū enim locum primo exaruit. Ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur: quatenus emittitur ubi is suppressus est: quia non trahitur / ne uenit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse: si caput fractum est: ex brachio potius sanguinem mittendum esse. Siquod in humero uitium est: ex altero brachio: credo quia si quid parum cesserit: oportuniore ex partes iniuriæ sunt: quæ iam male habent. Auertitur quoque interdum sanguis / ubi alia parte prorūpens: alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolumus / inde obiectis quæ prohibeant / alio dato itinere. Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum / usum habenti: tum ignaro difficillimum est. Iuncta enim est uena arteriis. his nerui. Ita si neruum scalpellus attingit: sequitur neruorum distentio: ea que hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neq; coit / neq; sanescit: interdum etiam ut sanguis uehementer erumpat: efficit. Ipsius quoque uenæ / si forte præcisa est / capita comprimuntur: neq; sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur: summam cutem lacerat: neque uenam incidit. Non nunquam etiam ea



latet: neq; facile reperitur. Ita multe res id difficile, inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium uena est: ex qua cum sanguis erumpit / colorem eius habitum que oportet attendere. Nam si is crassus & niger est: uitiosus est: ideo que utiliter effunditur. Si rubet & pellucet: integer est. Ea que missio sanguinis adeo non prodest: ut etiam noceat. protinus que is supprimendus est. Sed id euenire non potest sub eo medico: qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet: ut æque niger assidue ac primo die profluat. Quod quamuis ita est: tamen si iam satis fluxit: supprimendus est. Semper que ante finis faciendus est / q̄ anima deficiat. Deligandumq; brachium super imposito expresso ex aqua frigida penicillo: & postero die aduerso medio digito uena ferienda: ut recens coitus eius resoluatur: iterum que sanguinem fundat. Siue autem primo / siue secundo die sanguis / qui crassus & niger initio fluxerat & rubere & pellucere coepit: satis materiæ detractum est: atq; quod superest / sincerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum: habendūq; ita est / donec ualens cicatrix sit. quæ celerrime in uena confirmatur.

## DE SANGUINIS DETRACTIONE PER CUCURBITULAS. CAPVT. XI

**C**ucurbitularum uero duo genera sunt: aeneum & corneum. Aenea altera patet: altera clausa est. Cornea altera parte æque patens: altera foramen habet exiguum. In aenea linamentum ardens coniicitur: ac sic os eius corpori aptatur / imprimitur que: donec inhaereat. Cornea per se corpori imponitur: deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est / ore spiritus adductus est: super que caera cauum id clausum est: æque inhaerescit. Vtraq; non ex his tantum materiæ generibus: sed etiam ex quolibet alio recte fit. Ac si cætera defecerunt: caliculus quoq; aut pultarius oris cōpressioris: ei rei cōmode aptatur. Vbi inhaesit: si concisa ante scalpello cutis est



sanguinem extrahit. si integra est: spiritum. Ergo ubi materi  
a quæ intrus est/laedit. illo modo. Vbi inflatio: hoc imponi  
solet. Vfus autem cucurbitulae praecipuus est: ubi non in to  
to corpore: sed in parte aliqua vitium est. quam exhauriri ad  
confirmandam ualitudinem satis est. Idq; ipsum testimonium  
est etiam. scalpello sanguinem ubi membro succurritur ab ea  
potissimum parte quae iam laesa est: esse mittendum: quod  
nemo cucurbitulam diuersae parti imponit: nisi cum profusio  
nem sanguinis eo auertit: sed ei ipsi quae dolet quaeq; liberan  
da est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis:  
quanuis etiam spa tium aliquod accessit/siue corrupta materi  
a/siue spiritu male habente. In acutis quoq; quibusdam si &  
leuari corpus debet: & ex uena sanguinem mitti uires non pa  
tiuntur. Idq; auxilium ut minus uehemens ita magis tutū. Ne  
q; unq; piculosum est etiam si in medio febris impetu etiam si  
in cruditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinem mitti opus est:  
si incisa uena /praeceptum piculum est: aut si in parte corporis e  
tiam vitium est: huc potius confugiendum est. Cum eo  
tamen ut sciamus: hic ut nullum piculum: ita leuius praesidium  
esse: nec posse uehementi malo /nisi æque uehemens auxilium  
succurrere.

## DE DEIECTIONE

## CAPVT. XII.

**D**eiectionem autem antiqui uariis medicamentis / crebraq;  
alui ductione in omnibus fere morbis moliebantur: dabāt  
q; aut nigrum ueratrum: aut filiculam: aut squamam æris: q; le  
pidochalcon graeci uocāt: aut lactucae marinae lac: cuius gut  
ta pani adiecta abunde purgat. aut lac uel asininum uel bubu  
lum uel caprinum: etq; salis paulum adiciebant: decoquebant  
q; id: & sublati iis/quae coierant: quod quasi serum supere  
rat / bibere cogeant. Sed medicamenta stomachum fere  
laedunt. Ideo que omnibus catharticis aloe miscenda est.  
Alui si uehementius fluit/aut sæpius ducitur: hominem infir  
mat. Ergo nūq; in aduersa ualitudine medicamentum eius rei  
c. i.



causa recte datur: nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum ueracrum nigrum / aut atra bile uexatis: aut cum tristitia insa-  
nientibus: aut iis quorum nerui, parte aliqua resoluti sunt: da-  
tur. At ubi febres sunt: satius est eius rei causa cibos potiones  
que assumere: qui simul et alant et uentrem molliant. Sunt  
que ualitudinis genera: quibus ex laete purgatio conuenit. Ple-  
runquero alius potius ducenda est. quod ab Asclepiade quo-  
que sic temperatum / ut tamen seruatum sit: uideo plerunque  
saeculo nostro praeteriri. Est autem ea moderatio / quam is se-  
cutus uidetur / aptissima: ut neque saepe ea medicina tentetur:  
et tamen semel sumptum uel bis / non omitatur. Si caput gra-  
ue est. si oculi caligant. si morbus maioris intestini est: quod  
graeci colum nominant. si in imo uentre / aut in coxa dolores  
sunt. si in stomachum quaedam biliosa concurrunt: uel etiam  
pituita eo se / humor uel aliquis aquae similis confert. si spiri-  
tus difficiliter redditur. si nihil perse uenter excernit. utique si  
iuxta quoque stercus est et intus remanet. aut si stercoris odo-  
rem nihil deiciens aeger ex spiritu suo sentit. aut si corrup-  
tum est quod ex cernitur. aut si prima inedia febrem non su-  
stulit. aut si sanguinem mitti / cum opus sit / uires non patiun-  
tur: tempus uel eius rei praeteriit. aut si multum ante morbum  
aliquis portauit. aut si is qui saepe uel sponte uel casu purga-  
tus est / subito habet aluum suppressam. Seruanda uero illa  
sunt. ne ante diem tertium ducatur. ne ulla cruditate sub stan-  
te. ne incorpore infirmo / diuque in aduersa ualitudine exhausto:  
ne uel in eo / cui satis alius reddit quotidie: qui uel eam liqui-  
dam habebit. ne in ipso accessionis impetu. quia quod tum in-  
fusum est / aluo continetur: regesum que in caput multo gra-  
uius periculum efficit. Pridie uero abstinere debet aeger:  
ut aptus tali curationi sit. Eodem die ante aliquot horas a-  
quam calidam bibere: ut superiores eius partes madescant.  
tum iniicienda aluus est / si leui medicina contenti sumus /  
pura aqua: si paulo ualentiori / mulsae: si leni ex aqua / in  
qua foenum graecum uel ptisana uel malua decocta sit.



LIBER SECVNDVS

Si reprimendi causa / ex uerbenis . acris autem est n . marina aqua  
uel alia sale adiecto : atq; utraq; decocta commodior est . Acri  
or fit adiecto uel oleo uel nitro uel melle quoq; . Si acrior ē /  
eo plus extrahit : sed minus facile sustinetur . Id quod infundi  
tur / neq; frigidum esse oportet / neq; calidum : ne alterutro  
modo laedat . Cum infusum est / quantum fieri poterit contine  
re se in lectulo debet æger : nec primæ cupiditati deiectionis  
protinus cedere . Vbi necesse est tum demum desiderare . Fereq;  
eo modo dempta materia superioribus partibus leuatis mor  
bum ipsum , mollit . Cum uero quoties res coegit desiderando ali  
quis se ex hausit : paulisper debet conquiescere : & ne vires de  
ficient : utiq; eo die cibum assumere . qui plenior an æxiguus  
sit dandus : ex ratione eius accessionis / quæ expectabitur / aut  
in metu non erit : æstimari oportebit .

DE VOMITV . CAPVT . XIII .

**A** T vomitus ut in secunda quoq; ualitudine sæpe necessa  
rius biliosus est : sic etiam in iis morbis / quos bilis concei  
tauit . Ergo omnibus / qui ante febres horrore & tremore uexan  
tur : omnibus / qui cholera laborant : omnibus etiã cum quadam  
hilaritate insanientibus : & comitiali quoq; morbo oppressis /  
necessarius est . Sed si acutus morbus est , sicut in cholera : si  
febris est / ut inter horrores : asperioribus medicamentis opus nō  
est . sicut in deiectionibus quoq; supra dictū est . satisq; est ea  
uomitūs causa sumi : quæ sanis quoq; sumenda esse proposui .  
At ubi longi ualentes que morbi sine febre sūt : ut comitialis / a  
ut insania : ueratro quoq; albo utendum est . Id neq; hyeme ne  
q; æstate recte datur : optime uere : tolerabiliter autūno . Quis  
quis daturus erit : id agere ante debet : ut accepturi corpus hu  
midius sit . Illud scire oportet . ōne eiusmodi medicamentum /  
quod potui datur : non sēper ægris pdesse : semp sanis nocere .

DE FRICTIONE CAPVT . XIII .

c . ii .



.LIBER.

**D**E frictione uero & gestatione adeo multa Asclepiades  
tranquam inuentor eius posuit: quod in eo uolumine /  
quod communium auxiliorū scripsit: cum trium tantum face  
ret mentionem: huius & equi & gestationis: tamen maxi  
mam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque re  
centiores uiros in his fraudare: quae uel reppererunt / uel rec  
te secuti sunt: & tamen ea / quae apud antiquiores aliquos po  
sita sunt: auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest qn  
latius quidem & dilucidius ubi & quomodo frictione uten  
dum esset Asclepiades praeceperit: nihil tamen reppererit:  
quod non a uetustissimo auctore Hippocrate paucis uerbis cō  
prehensum sit. qui dixit. frictione si uehemens sit / durari  
corpus: si lenis / molliiri: si multa / minui: si modica / impleri.  
Sequitur ergo ut tum utendum sit: cum aut astringendum cor  
pus sit / quod fluens est. aut molliendum / quod induruit. aut  
digerendum in eo / quod copia nocet. aut alendum id / quod te  
nue & infirmum est. Quas tamen species siquis curiosius aesti  
met: quod iam ad medicum non pertinet: facile intelliget om  
nes ex una causa pendere / quae demit. Nam & astringitur ali  
quid eo dempto / quod interpositum ut id laxaretur: effecerat.  
& molliitur eo detracto / quod duritiem creabat. & impletur  
non ipsa frictione: sed eo cibo: qui postea usq; ad cutem dige  
stione quadam relaxatam penetrat. Diuersarū uero rerum in  
modo causa est. Inter unctionem autem & frictionem multum  
interest. Vngi enī leniterq; ptractari corpus etiam in acutis &  
recentibus morbis oportet: in remissione tamen & aīte cibum.  
Lōga uero frictione uti neq; in acutis morbis neq; īncrescenti  
bus conuenit / prater q̄ cum phreneticis sōnus ea requirit. Amat  
autē hoc auxiliū ualitudo lōga & iam a primo impetu inclina  
ta. Neq; ignoro quosdam dicere ōne auxilium necessarium es  
se īncrescentibus morbis: non cum iam perse finiuntur. Quod  
nō ita se habet. Potest enī morbus etiā qui p se finem habitu  
rus ē / citius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de cau  
sis necessariū ē: ut & q̄ primū bona ualitudo cōtigat & ne mor



bus qui remanet / iterum quanuis leui de causa exasperetur .  
 Potest enim morbus minus grauis esse quam fuerit : neq; ideo  
 tamen solui : sed reliquiis quibusdam inhærere : quas admo-  
 tum aliquod auxilium discutit . Sed ut leuata quoque aduersa  
 ualitudine recte frictio adhibetur : sic nunq̃ adhibenda est fe-  
 bre increfcente . Verum si fieri poterit cum ex toto corpus ea  
 uacabit : minus certe cum ea remiserit . Eodem autem modo in  
 tutis corporibus esse debet : ut cum infirmus aliquis imple-  
 ndus modo est in partibus : aut quia ipsius eius membri imbe-  
 cillitas id requirit : aut quia alterius . Nam et capitis lōgos do-  
 lores ipsius frictio leuat . Non in impetu tamen doloris et mē-  
 brum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur . Longe  
 tamen sæpius aliud perfricandum est cum aliud dolet : maxi-  
 me que cum a summis aut a mediis partibus corporis euocare  
 materiam uolumus : ideoque extremas partes perfricamus .  
 Neque audiendi sunt / qui numero finiunt quotiens aliquis p-  
 fricandus sit . Id enim ex uiribus hominis colligendum est .  
 Et si is perinfirmus est : potest satis esse quinquagies . si ro-  
 bustior : potest ducenties esse faciendum . Inter utrunque de-  
 inde pro ut uires sunt . Quo fit ut etiam minus sæpe in mu-  
 liere / quam in uiro : minus sæpe in puero uel sene / quam in  
 iuvene manus dimouendae sint . Denique si certa membra per-  
 fricantur : multa ualenti que frictione opus est . Nam neque  
 totum corpus infirmari cito per partem potest : & opus est q̃  
 plurimum materię digeri : siue id ipsū membrum : siue per id /  
 aliud leuamus . At ubi totius corporis imbecillitas hanc cura-  
 tionem per totum id exigit : breuior esse debet & lenior : ut tā-  
 tummodo summam cutem emolliat : quo facilius capax ex re-  
 centi cibo nouae materiae fiat . In malis iam ægrum esse testa-  
 tur : ubi exterior pars corporis friget : interior cum siti calet :  
 ut supra posui . Sed tunc quoq; unicum in frictione præsidiū  
 est . quæ si calorem in cutem euocauit : potest alicui medicinae  
 locum facere .



DE GESTATIONE. CAPVTXIII.

**G** Estatio quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est. utilisque est & iis corporibus: quæ iam ex toto febre carent: sed adhuc exerceri per se non possunt: & iis / quibus lentæ morborum reliquæ remanent: neque aliter eliduntur. A sclepiades etiam in recenti uehementique febre præcipue que ardente ad discutiendam eam gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit: meliusque quiete eiusmodi impetus sustinetur. Siquis tamen experiri uolet: sic experiatur. si lingua non erit aspera: si nullus tumor: nulla durities: nullus dolor uisceribus / aut capiti / aut præcordiis suberit. Et ex toto nunquam gestari corpus dolens debet / siue id in toto / siue in parte est: nisi tamen solis neruis dolentibus. neque unquam in recedente febre: sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & prouiribus cuius que & pro opibus: ne aut imbecillum hominem nimis digerant: aut humili obsint. Gestationum lenissima est naui uel in portu uel influ mine: uehementior in alto mari naui uel lectica aut scanno: acrior uehiculo. Atque hæc ipsa & intendi & leniri possunt. si nihil horum est: suspendi lectus debet & moueri. si ne id quidem est: at certe unipedi / lecti funiculus subiiciendus est: atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis / infirmis conueniunt. Valentiora uero iis qui grauium morborum initia sic sentiunt: ut adhuc febre uacent. Quod & in tæbe & in stomachi uitio & cum aqua cutem subiit & interdum in morbo regio fit: Aut ubi quidam morbi: qualis comitialis: qualis insania est sine febre: quanuis diu manent. In quibus affectibus ea quoque genera exercitationum necessaria sunt: quæ comprehendimus eo loco: quo quemadmodum sani / neque firmi homines se gererent: præcepimus.

DE ABSTINENTIA

CAPVT. XVI.



## .SECVNDVS.

**A**bstinentiæ uero duo genera sunt. Alterum ubi nihil assumit æger. Alterum ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem sitim que desiderant: ipsi deinde morbi/moderatioem: ut neque aliud quam expedit: neque eius ipsius nimium sumatur. Neque enim conuenit iuxta inedia[m] protinus.satieta[m] esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est/ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam ægro? Neque ulla res magis adiuuat laborantem/quam tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alii tempora medicis pro dono remittunt: sibi ipsis modum uendicant. Liberaliter agere se credunt qui cætera illorum arbitrio relinquunt: in genere cibi liberi sunt: quasi quaeratur quid medico liceat: non quid ægro salutare sit. Cui uehementer nocet/quotiens in eius quod assumitur uel tempore uel modo uel genere peccatur.

## DE SVDORE

## CAPVT.XVII

**S**vdor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore: aut balneo. Siccus calor est & harenæ calidæ et laconici et cli bani et quarundam naturalium sudationes: ubi e terra profusus calidus uapor ædificio includitur: sicut super baias in myrtis habemus. Præter hæc sole quoque & exercitatione is mouetur. Vtiliaque hæc genera sunt quotiens humor intus nocet: is que digerendus est. Ac neruorum quoque quædam uitia sic optime curantur. sed cætera infirmis possunt conuenire. solet exercitatio tantum robustioribus: qui tamen sine febre: uel initio morbi: uel etiã grauib[us] morbis tenentur. Cauendū autem ē nequid horū uel ī febre uel ī cruditate tētetur. At balnei duplex usus est. Nam modo discussis febribus initium cibi plenioris/ uini que firmioris ualitudini facit: modo febrem ipsam tollit. fere que adhibetur ubi summam cutem relaxari /euocari que corruptum humorem et habitū corporis mutari expedit. An



aliqui timidius eo utebantur. Asclepiades audacius. Neque ter-  
rere autem ea res / si tempestiua est : debet : & ante tempus no-  
cet. Quisquis febre liberatus est : simul atque ea uno die non ac-  
cessit : eo qui proxime est post tempus accessionis / tuto laua-  
ri potest. At si circuitum habere ea febris solita est / sic ut ter-  
tio quarto uel die reuertatur : quodcumque non accessit : balne-  
um tutum est. Manentibus uero adhuc febribus : si haec sunt len-  
tae / lienesque iam diu male habent : recte medicina ista tectatur :  
Cum eo tamen ne praecordia dura sint : ne uel ea tumeant : ne  
uel lingua aspera sit : ne uel aut in medio corpore / aut in capite  
dolor ullus sit : ne uel tum febris increascit. Atque in iis quidem  
febribus / quae certum circuitum habent : duo balnei tempora  
sunt. alterum ante horrorem : alterum febre finita. In his ue-  
ro / qui lentis febriculis diu detinentur : cum aut ex toto reces-  
sit accessio : aut si id non solet / certe lenita est : iam quae cor-  
pus tam integrum est / quam maxime esse in eo genere ualitu-  
dinis solet : imbecillus homo iturus in balneum uitare debet :  
ne ante / frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum uenit : pa-  
ulisper resistere : experirique num tempora astringantur : & an  
sudor aliquis oriatur. Illud si incidit : hoc non secutum est :  
inutile eo die balneum est . perungendus est is leniter & aufe-  
rendus est : uitandumque omnimodo frigus : & abstinencia uten-  
dum. At si temporibus integris : primum ibi / deinde alibi su-  
dor incipit : fouendum est aqua calida : tum in solio desiden-  
dum est : atque ibi quoque uidendum : num sub primo contactu  
aquae calidae summa cutis inhorrescat. quod uix tamen fieri  
potest / si priora recte accesserunt. Certum id autem signum  
inutilis balnei est. Ante uero / an postea quam in aquam calidam  
se demittat aliquis perungi debeat : ex ratione ualitudinis suae  
cognoscat. Fere tamen : nisi ubi nominatim / ut postea fiat id  
praecipietur : moto sudore leuiter corpus perungendum : dein-  
de in aquam calidam demittendum est. Atque hic id quoque haben-  
da uirium ratio est. Neque committendum ut per aestum anima  
deficiat : sed maturius is auferendus : curioseque in uestimentis



34.  
 .SECVNDVS.

inuoluendus est: ut neque adeum frigus aspiat: & ibi quoque ante quam aliquid assumat: insudet. Fomenta quoque calida sunt: milium: sal: harena: quodlibet eorum calfactum & in linteum coniectum. Si minore ui opus est: etiam solum linteum. At si maiore: extinctiones: inuoluti que panniculi & sic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi: & in uasa fistilia: ad similitudinem quas lenticulas uocant: aqua coniicitur: & sal sicco linteo excipitur. demittitur que in aquam bene calidam tum super id membrum: quod fouendum est: collocatur: iuxta que ignem ferramenta duo sunt capitibus paulo latioribus: alterum que ex his demittitur in eum salē: & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigere coepit / ad ignem referatur: & idem in altero fit: deinde inuicem inutroque. inter quæ descendit salsus & calidus succus: qui contractis aliquo morbo neruis opitulatur. His omnibus commune est digerere id quod uel præcordia oneratur: uel fauces strangulat: uel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit / in ipsis morborum generibus dicetur.

QVI CIBI: potiones ue: aut ualentis aut mediæ aut imbecillæ materiæ sint. .CAPVT. XVIII.

**C** Vm de iis dictum sit: quæ detrahendo iuuant ad ea ueniendum est: quæ nos alunt: id est cibum & potionem. hæc autem non omnium tantum morborum: sed etiam secundæ ualitudinis communia præsidia sunt. Pertinet que ad rem omnium proprietates nosse. primum ut sani sciant quomodo his utantur: deinde ut exsequentibus nobis morborum curationem liceat species rerum: quæ assidue necessariae erunt: subiicere. Neque necesse est subinde singulas eas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina: quæ que ex frumentis panificia sunt: generis ualentissimi esse. Id ualentissimum uoco: in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quadrupes domesticum. omnem grandem ferā: quales sunt capræ: ceruus: aper:



## SECVNDVS

onager. omnem grandem auem: quales sunt anser & pauo & grus. omnes beluas marinas: ex quibus cetos est: quæ q̄ his pares sunt. Item mel & caseum. quo minus mirum est: opus pilitorum / ualentissimū esse: quod ex frumento: adipe: melle: caseo constat. In media uero materia numerari ex oleribus debere ea: quorum radices uel bulbos assumimus. Ex quadrupedibus leporem: aues omnes a minimis ad phoenicopterum. item pisces omnes: qui salem non patiuntur: solidi uel saliantur. In becillissimam uero materiam esse omne olus & quicquid in cauliculo nascitur. qualis est cucurbita & cucumis & capparitis: omnia poma: oleas: cocleas: item q̄ cōchilia. Sed quāuis hæc ita discreta sunt: tamen etiam quæ sub eadem specie sunt: magna discrimina recipiunt: aliaq̄ res alia / uel ualentior est uel infirmior. Siquidem plus alimenti est in carne / q̄ in ullo alio. Firminus est triticum / q̄ milium: id ipsum / quam hordeum: & ex tritico firmissima siligo: deinde simila: deinde cui nihil ademptum est: quod autopyron græci uocant: infirmior est. ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus uero ualentior faba / uel lenticula / quam pisum. Ex oleribus ualentior rapa: napiq̄ & omnes bulbi: in quibus cepam quoq̄ & allium numero / quam pastinaca / uel quæ specialiter: radícula appellatur. Item firmior brassica & beta & porrum / quam lactuca / uel cucurbita / uel asparagus. At ex fructibus surculorum ualentiores uux: ficus: nuges: palmulæ: quam quæ poma proprie nominantur. Atq̄ ex his ipsis firmiora / quæ succola: q̄ quæ frigida sūt. itēq̄ ex iis auibus: quæ i media specie sunt: ualentior ea quæ pedibus / q̄ quæ uolatu magis nititur: & ex his quæ uolatu fidunt: firmiores sunt / quæ grādiores aues / q̄ quæ minutæ sunt: ut ficedula & turdus. Atq̄ ex quoq̄ / quæ i aqua degūt leuiorē cibum præstant / q̄ quæ natandi scientiā nō habēt. Inter domesticas uero quadrupedes / leuissima suilla ē: grauisima bubula. Item que ex feris quo maius quodque animal / eo robustior ex eo cibus est. Pisciumq̄ eorum / qui ex media materia sunt: quibus maxime utimur tamen: grauissimi sunt ex



quibus salsamenta quoque fieri possunt: qualis lacertus est. de  
inde qui quauis teneriores: tamen duri sunt: ut aurata: coruus:  
scarus: oculata: tum plani: post quos etiam leniores lupi: mulli  
que: & post hos omnes saxatiles. Neque uero in generibus re  
rum tantummodo discrimen est: sed etiam in ipsis. quod &  
etate fit & membro et solo et caelo et habitu. nam quadrupes  
animal omne si lactans est: minus alimenti præstat. Item quo  
tenerior pullus cohortalis est. In piscibus quoque media ætas:  
quæ non dum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eo  
dem sue ungulæ: rostrum: aures: cerebellum. ex agno/hedo ue  
cum pectiolis totum caput aliquanto quam cætera membra le  
uiora sũt: adeout in media materia poni possit. Ex auibus col  
la/alæ ue recte infirmis annumerantur. Quod ad solum uero  
pertinet: frumentum quoque ualentius est collinum / quam cam  
pestre. leuior piscis inter saxa editus/quã in harena: leuior in  
harena / quam in limo. Quo fit: ut ex stagno/uel lacu/uel flu  
mine eadem genera grauiora sint. Leuiorque qui in alto / quam  
qui in uado uixit. Omne etiam ferum animal domestico leui  
us: et quodcunque humido caelo / quam quod siccò natum est.  
Deinde eadem omnia pingua / quam macra: recentia / quam  
salsa: noua / quam uetusta plus alimenti habent. Tum res ea  
dem magis alit iurulenta / quam assa: magis assa / quam frixa.  
Ouum durum ualentissimæ materiæ est: molle uel sorbile /  
imbecillissimæ. Cum que panificia omnia firmissima sint: elo  
ta tamen quædam genera frumenti: ut alica: oriza: ptisana:  
uel ex hisdem facta sorbitio / uel pulicula. Et aqua quoque  
madens panis / imbecillissimis annumerari potest. Ex potio  
nibus uero quæcunque ex frumento facta est: item que lac:  
mulsum: defrutum: passum: uinum aut dulce / aut uehemens /  
aut mustum / aut magnæ uetustatis / ualentissimi generis est.  
At acetum: et id uinum: quod paucorum annorum / uel auste  
rum: uel lene est: in media materia est. Ideoque infirmis nun  
quã generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima  
est. firmior que ex frumento potio est / quo firmitus fuit ipsu



frumentum. firmior ex eo uino: quod bono solo / quam quod tenuit: quodq; temperato caelo / quam quod aut nimis humido / aut nimis sicco: nimium que aut frigido / aut calido natū est. Mulsum quo plus mellis habet: defrutum quo magis incoctū est: passum quo ex sicciore uua est / eo ualentius est. Aqua leuissima / pluuialis est: deinde fontana: tum ex flumine: tum ex puteo: post hæc ex nive / aut glacie. grauior his ex lacu: grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. Nam leuis / pondere apparet: & ex iis quæ pondere parescūt: eo melior quæq; ē: quo celerius & calfit & frigescit: quo quæ celerius ex ea legumina percoquantur. Fere uero sequitur: ut quo ualentior quæque materia est: eo minus facile concoquatur: sed si concocta est / plus alat. Ita que utendum est materiæ genere pro uiribus: modus que omnibus / pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus / rebus infirmis opus est. Mediocriter firmos / media materia optime sustinet. & robustis apta / ualidissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest. magis in iis / quæ ualentissima sunt / temperare sibi debet.

QVAE NATVRA ac proprietas cuiusque rei sit: quæ uescimur. CAPVT XVIII.

**N**eq; hæc sola discrimina sunt. sed etiam aliæ res boni succi: aliæ mali sunt. quas euchylos / uel cacochylos græci uocant. Aliæ lenes: aliæ acres. aliæ crassiorem pituitam in nobis faciunt: aliæ tenuiorem. aliæ idoneae sunt stomacho: aliæ alienae sunt. Item quæ aliæ inflant: aliæ ab hoc absunt. aliæ calfaciunt: aliæ refrigerant. aliæ facile in stomacho acescunt: aliæ non facile intus corrumpuntur. aliæ mouent aluum: aliæ supprimunt. aliæ citant urinam: aliæ tardant. Quædam somnum mouent: quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt: quoniam aliud aliter / uel corpori / uel ualitudini conuenit.



XX

QVAE res boni succi sint. CAPVT. XVIII.

**B**oni succi sunt: triticum: siligo: alica: oriza: amilū. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calfaciunt: tragum: ptisana: lac: caseus mollis: omnis uenatio: omnes aues: quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque ex: quas supra nominauimus. Medii inter teneros durosque pisces: ut mullus & lupus uerna: laetuca: urtica: malua: cucumis: cucurbita: ouum forbile: portulaca: cochleæ: palmulæ. ex pomis quodcunque neque acerbum neque acidum est. Vinum dulce uel lene: passum: defrutum: oleæ quæ ex his duobus inalteratio seruata sunt: uulx: rostra: trunculi. In summa omnis pinguis caro: omnis glutinosa: omne iocur.

QVAE res mali succi sint. CAPVT. XXI

**M**Ali uero succi sunt milium: panicum: hordeum: legumina: caro domestica permacra: omnisque caro salsa: omne fassamentum: garum: uetus caseus: cicer: radicia: rapa: napi: bulbi: brassica: magisque etiam cima eius: asparagus: beta: cucumis: porrum: eruca: nasturcium: thimum: nepeta: saturia: hisopum: ruta: anetum: feniculum: cuminum: anisum: lapatium: sinapi: & allium: cepa: lienes: renes: intestina: pomum quodcunque acidum uel acerbum est: acetum: omnia acria: acida: acerba: oleum: pisces quoque saxatiles omnesque qui ex tenerissimo genere sunt: aut ii qui rursus nimium duri: uirosique sunt: ut fere quos stagna: lacus: limosi uel riuus ferunt: qui uel in nimiam magnitudinem excesserunt.

QVAE res lenes: que uel acres sint. CAPVT. XXII

**L**enes autem sunt: sorbitiones: pulticula: laganum: amilum: ptisana: pinguis caro & quaecunque glutinosa est.

f.i.



Quod fere quidem in omni / quae domestica / sit : praecipue  
tamē in ungulis / trunculisq; suum : i pectiolis / capitulisq; hedo  
rum & uitorum & agnorum / onibusq; cerebellis . itē siq; pprie  
bulbi nominantur . lac : defrutum : passum : nuclei pinei . acia  
sunt onia nimis austerā : omnia acida : omnia salsa : & mel q  
dem quo melius est / eo magis . Item allium : cepa : eruca : ruta :  
nasturcium : cucumis : beta : brassica : asparagus : sinapi : radicu  
la : intubus : ocymum : lactuca : maximaq; olerum pars .

QVAE RES crassiores : quae ue tenuiorem pituitā faciunt  
CAPVT . XXIII .

**C** Rassiorem autem pituitam faciunt / oua sorbilia : alica : o  
riza : amilum : ptisana : lac : bulbi : oniaq; fere glutino  
sa . Extenuant eandem onia salsa atq; acia & acida .

Quae res stomacho idoneae sunt . CAPVT . XXIII .

**S** Tomacho autem aptissima sunt / quaecunq; austera sunt :  
etiam quae acida sunt : quaeque contacta sale modico  
sunt . Item panis sine fermento : & elota alica / uel orixa /  
uel ptisana : omnis auis : omnis uenatio : atque utraque uel  
assa uel elixa . Ex domesticis animalibus bubula . Siquid ex  
caeteris sumitur : macrum potius / quam pingue . Ex suae un  
gulae : rostra : aures : uuluae / steriles quae . Ex oleribus intu  
bus : lactuca : pastinaca : cucurbita elixa : siser . Ex pomis ce  
rasium : morum : sorbum : pirum fragile / quale crustuminum  
uel meuianum est . Item pira quae reponuntur tarentina  
atque signina . Malum orbiculatum aut scaudianum uel ame  
rinum uel cotoneum uel punicum . Vuae ex olla : molle o  
uum : palmulae : nuclei pinei : oleae albae ex dura muria : eae  
dem aceto intinctae . uel nigrae / quae in arbore bene perma  
turuerunt : uel quae in passo / defruto ue seruatae sunt . Vi  
num austerum / licet iam asperum sit : item resinaturn .



Duri ex media materia pisces: ostrea: pectines: murices: purpura: cochleæ: cibi / potionesq; uel frigidae uel feruentes: abstinthium.

QVAE res alienae stomacho sunt. CAPVT. XXIIII.

**A** Lienae uero stomacho sunt omnia tepida: omnia salsa: omnia iurulenta, prædulcia: omnia pingua: sorbitio: panis fermentatus: item que uel ex milio / uel ex hordeo: oleum: radices olerum: & quodcunq; olus ex oleo / garo ue estur: mel: mulsum: defrutū: passū: lac: omnis caseus: uua recens: ficus & uiridis & arida: legumina omnia quaeq; inflare consuerunt, item thimum: nepeta: satureia: isopū: nasturcium: lapatium: lapsanum: iuglandes. Ex his autem intelligi potest non quicquid boni succi est / protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit: protinus boni succi esse.

QVAE inflant aut inflationem leuant. CAPVT. XXVI.

**I** nflant autem omnia fere legumina: omnia pingua: omnia dulcia: omnia iurulenta: mustum: atque etiam id uinum / cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus allium: cepa: brassica: omnes que radices excepto sisere & pastinaca: bulbi: ficus etiā arida / sed magis uirides: uuae recentes: nuges omnes exceptis nucleis pineis: lac: omnis que caseus. quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione: aucupio: piscibus: pomis: oleis: conchiliis: ouis uel mollibus / uel sorbilibus: uino uetere. Finiculum uero & anetum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calfaciunt aut refrigerant. CAPVT. XXVII.

**A** t calfaciunt / piper: sal: caro omnis iurulenta: allium: cepa: ficus arida: balsamentum: uinum: & quo meracius est / eo magis. Refrigerant olera / quorum crudi caules



assumuntur: ut intubus & laetuca. Item coriandrum: cucumis: elixa cucurbita: beta: mora: cerasia: mala austera: pira fragilia: caro elixa: praecipue que acetum / siue cibus ex eo / siue portio assumitur.

QVAE RES intus facile uiciantur: uel minime corrumpuntur. CAPVT. XXVII.

**F**acile autem intus corrumpuntur / panis fermentatus & quisquis alius / quam ex tritico est: lac: mel: ideoque lactantia atq; ovis pistorium opus: teneri pisces: ostrea: olera: caseus & recens & uetus: crassa uel tenera caro: uinum dulce: mulsum: defrutum: passum: quicquid deinde uel iurulentum est / uel nimis dulce / uel nimis tenue. At minime intus uiciantur / panis sine fermento: aues / & ex potius duriores: aurati pisces: neque solum aurata pura / aut scarus: sed etiam lolligo locusta: polypus. Item bubula / omnisq; dura caro: eademque aptior est si macra / si salsa est: omnia que salsamenta: cochleae: murices: purpurae: uinum austerum / uel resinatum

QVAE RES ALVVM MOVENT. CAPVT. XXVIII.

**A**lvum mouent / panis fermentatus: magisq; si cibarius uel hordeaceus est: brassica / si subcruda est: laetuca: anethum: nasturcium: ocymum: urtica: portulaca: radícula: capparis: allium: cepa: malua: lapathiū: beta: asparagus: cucurbita: cerasia: mora: uua: omnia mitia: ficus etiam arida / sed magis uiridis: uuae recentes pingues: minutae aues: cochleae: garum: salsamenta: ostrea: pelorides: echini: muscoli: & omnes fere conchulae / maximeq; ius earum: saxatiles / & omnes teneri pisces: sepiarum atramentum: siqua caro assumitur pinguis eadem uel iurulenta uel elixa: aues quae natant: mel crudum: lac: lactantia omnia: mulsum: uinum dulce / uel salsum: aqua: tenera omnia tepida: dulcia: pingua / elixa iurulenta / sancta / diluta



QVAE res aluum astringant. CAPVT <sup>XXX</sup>XXVIII.

**C**ontra astringunt / panis ex siligine uel ex simila: magis si sine fermento est: magis etiam si uetus est. intenditur que uis eius etiam si bis coquitur. Pulticula uel ex halica / uel ex panico / uel ex milio. itemq; ex hisdem sorbitio: & magis si hæc ante fricta sunt. Lenticula / cui uel beta uel intubus uel ambubeia uel plantago adiecta est: magisq; etiam si illa ante fricta est. per se etiam intubus uel ex plantagine uel ambubeia fricta: minuta olera: brassica bis decocta: dura oua / magisq; si assa sunt: minutæ aues: merula: palumbus: magis que si in pusca decoctus est: grus: omnes aues / quæ magis currunt / q̄ uolant: lepus: caprea: iecur ex iis / quæ seuum habent / maxime q; bubulum: ac seuum ipsum: caseus / qui uehemētior uetustate fit: uel ea mutatione / quam in caseo transmarino uidemus: aut si recens est ex melle / mulso uel decoctus. Item mel coctum: pira immatura: sorba / magisq; ea / quæ torminalia uocantur. mala cydonia & punica: oleæ uel albæ uel permaturæ: myrta: palmulæ: purpuræ: murices: uinum resinatum uel asperum: itē meracum: acerum mulsum quod inferuuit. item defrutum: passū: aqua uel tepida uel præfrigida dura / idest ea quæ tarde putrescit: ideoq; pluuia potissimum. omnia dura: macra: austera: aspera: tosta: & in eadem carne / assa potius quam elixa.

## QVAE RES VRINAM mouent. CAPVT. XXXI.

**V**rinam autem mouent quæcūq; i horto nascētia boni odoris sunt: ut apiū: ruta: anetum: ocymum: mēta: hisopum: anesum: coriādrū: nasturciū: eruca: feniculū. Præter hæc asparagus: capparitis: nepeta: thimū: satireia: lapsanum: pastinaca / magisq; agrestis: radícula: siser: cepa: Ex uenatioe maxime lepus: uinum tenue: piper & rotundum & lōgum: sinapi. absinthium: nuclei pinei.

Quæ res sōnum mouēt: aut sensus excitāt. CAPVT. XXXII  
f.iii.



**S** Omno uero aptum est papauer: lactuca: maxime q̄ x̄sci  
ua: cuius cauliculus iam lacte repletus est: morum: porrū.  
Sensus excitant / nepeta: thimum: satureia: hisopum: præcipue  
que puleium: ruta & cepa .

Quæ res corpus aut erodant: aut reprimant: aut refrigerent:  
aut calfaciant: aut durent: aut emolliant. CAPVT. XXXII

**E** Vocare uero materiam multa admodum possunt. Sed ea  
quæ ex peregrinis medicamentis maxime constant: aliis  
q̄ magis / quam quibus ratione uictus succurritur: opitulatur:  
inpræsentia differam. Ponam ea uero: quæ prompta & iis mor  
bis / de quibus protinus dicturus sum / apta: corpus erodunt: &  
sic eo quod mali est: extrahunt. Habent autem hanc faculta  
tem semina erucæ: nasturcii: radiculæ: præcipue tamen ònium /  
sinapi. Salis quoq̄ & fici eadem uis est. Leniter uero simul &  
reprimunt & molliunt, lana succida uel aceto uel uino: quo ole  
um adiectum est. Contrita palmulæ: fursures in salsa aqua /  
uel aceto decoctæ. At simul reprimunt & refrigerant herba  
muralis parthenium uel perdicium appellant: serpillum: pule  
ium: ocymum: herba sanguinalis: quam græci polygonum uo  
cant: portulaca: papaueris folia: capreoliq̄ uitium: coriandri  
folia: hyoscyamū: muscus: siser: apium: solanum: quā strych  
num græci uocant: brassicæ folia: intubus: plantago: fenicu  
li semen: contrita pira uel mala / præcipueq̄ cydonia: lenticula:  
aqua frigida / maximeq̄ pluuiialis: uinum: acetum: & ex horū  
aliquo magis / madens uel panis: uel farina: uel sponsia: uel ci  
nis: uel lana succida: uel etiam linteolum: creta cimolia: gyp  
sum: melinum: myrteum: rosa: acerbum oleum: uerbenarum cō  
tusa cum teneris caulibus folia: cuius generis sunt olea: cupres  
sus: myrtus: lentiscus: tamaris: ligustrum: rosa: rubus: laurus:  
hedera: punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta  
mala cydonia: malicorium: aqua calida / in qua uerbenæ coc  
tae sunt: quas supra proposui. puluis uel ex fece uini / uel ex



myrti foliis: amaræ nuces. Calefacit uero ex qualibet farina cataplasma siue ex tritici siue ex farris siue hordei siue herui: uel lolii uel milii uel panici uel lenticulæ uel fabæ uel lupini uel lini uel foeni græci: ubi ea deferuunt: calidaq; imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, q̄ ex aqua cōcta. Præterea ciprinum: irinum: medulla: adeps ex felle iuncta oleo, magisq; si uetus est: sal nitrum: git: piper: qn quefolium: fereq; quæ uehemēter & reprimunt & refrigerant. Durant quæ calefaciunt & digerunt & emolliunt. Præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini uel foeni græci semine. His autē omnibus & simplicibus & pmixtis uarie medici utuntur: ut magis quid quisque persuasit sibi appareat: q̄ quid euidenter compererit.

CORNELII CELSI DE MEDICINA TERTIVS LIBER INCIPIT.

DE MORBORVM GENERIBVS. CAPVT. I.

**P**rouisus omnibus: quæ pertinent ad uniuersa genera morborum: ad singulorum curatio nes ueniam. Hos autem in duas species græci diuiserunt: alios que ex his acutos: alios longos esse dixerunt. Ideo que / quoniam non semper eodem modo respondebant: eosdem alii inter acutos: alii inter longos rettulerunt. Ex quo plura eorum genera esse: manifestum est. Quidam enim breues utique sunt: qui cito uel tollunt hominem: uel ipsi cito finiuntur. Quidam longi: sub quibus neque sanitas in propinquo: neque exitium est. Tertium que genus eorum est: qui modo acuti / modo longi sunt. Id que non in febribus tantummodo: in quibus frequentissimum est: sed in aliis quoque fit. Atq; etiam præter hos / quartum est: quod neque acutum dici potest: quia



non perimit: neq; uicq; longum: quia / si occurritur: facile sana-  
tur. Ego cum de singulis dicam: cuius quisq; generis sit: indi-  
cabo. Diuidam autem omnes in eos: qui in totis corporibus  
consistere uidentur: & eos / qui oriuntur in partibus. Incipiam  
a prioribus / pauca de omnibus præfatus. In nullo quidē mor-  
bo minus fortuna sibi uendicare / quam ars potest: ut pote cum  
repugnante natura / nihil medicina proficiat. Magis tamen  
ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis /  
quam in lōgis. Hic enī breue spatium est: intra quod / si quod  
auxilium non profuit: æger extinguitur. Ibi & deliberationi &  
mutationi remediorum tempus patet: adeo ut raro / si inter ini-  
tia medicus accessit / obsequens æger sine illius uitio pereat.  
Longus tamen morbus cum penitus insedit: quod ad difficul-  
tatem pertinet: acuto par est. Et acutus quidem / quo uetustior  
est: longus autem quo recentior: eo facilius curatur. Alterum  
illud ignorari non oportet: quod non omnibus ægris eadem  
auxilia conueniunt. Ex quo incidit: ut alia atque alia summi  
auctores quasi sola uendicauerint / prout cuiq; cesserāt. Opor-  
tet itaq; ubi aliquid non respondit: non tanti putare auctore /  
quanti ægrum: & experiri aliud atq; aliud. Sic tamen: ut in a-  
cutis morbis cito mutetur quod nihil prodest, in longis: quos  
tempus ut facit / sic etiam soluit: non statim condemnetur / si  
quid non statim profuit. Minus uero remoueatur siquid pau-  
lum saltem iuuat: quia profectus tempore expletur.

QVOMODO morbi cognoscantur & an increcant an confi-  
stant an minuantur: & qua ratione ab initio qui languere inci-  
pit curari debeat. CAPVT SECVNDVM

**P** Rotinus autem inter initia scire facile est. Quis acutus  
morbus: quis longus sit: non in iis solis / in quibus sem-  
per ita se habet: sed in iis quoq; in quibus uariat. Nam ubi si-  
ne intermissionibus accessiones & dolores graues urgent: acu-  
tus morbus est. Vbi lenti dolores: lentæ ue febres sunt: & spa-



cia inter accessiones porriguntur: acceduntq; ea signa: quæ in priore uolumine exposita sunt: longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum etiam est: morbus an increseat / an consistat / an minuat. quia quædam remedia incrementibus morbis: plura inclinantibus conueniunt: Ea; quæ decrecentibus apta sunt: ubi acutus increscens urget: inremissionibus potius experienda sunt. Increscit autem morbus dum grauiore dolores / accessionesq; ueniunt: hæc & ante quam proxime reuertuntur & postea desinunt. Atq; in longis quoq; morbis etiam tales notas non habentibus scire licet increcere: si sōnus icertus est: si deterior concoctio: si foediores deiectiones: si tardior sensus: si pigrior mens: si pcurrit corpus frigus / aut calor: si id magis pallet. Ea uero quæ contraria his sunt: decedentis eius notæ sunt. Præter hæc in acutis morbis serius æger alendus est: nec nisi iam inclinatis: ut primo dempta materia impetum frangat. In longis maturius: ut sustinere spatium affecturi mali possit. Ac si quaudo is nō in toto corpore / sed in parte est: magis tamen ad rem pertinet uim totius corporis molliiri / quam propriæ partes aegre sanentur. Multum etiam interest ab initio quis recte curatus sit: an per peram. quia curatio minus iis prodest: in quibus assidue frustra fuit. Siquis temere habitus adhuc integris uiribus uiuit: admota curatione momento restituitur. Sed cum ab iis coeperim: quæ notas quasdam futuræ aduersæ ualitudinis exhibent: curationum quoq; principium ab animaduersione eiusdem temporis faciā. Igitur siquid ex iis / quæ proposita sunt incidit: omnium optima sunt / quies & abstinencia. Siquid bibendum: aqua. Idq; interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent biduo: proxime que abstinētiā sumendus est cibus exiguus: bibenda aqua. postera die etiam uinum. deinde inuicem alternis diebus / modo aqua / modo uinum: donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc enim sæpe instans grauis morbus discutitur. Plurimi que falluntur dum se primo die protinus sublatus languorem aut exercitatione / aut balneo / aut coacta deiectione



tionem / aut uomitu / aut sudationibus / aut uino sperant . Non quo non interdum id incidat : aut non decipiat : sed quo saepius fallat : solaque abstinencia sine ullo periculo medeatur . Cum praesertim etiam pro modo terroris moderari liceat . & si leuiora iditua fuerunt : satis sit a uino tantum abstinere : quod subtractum plusquam si cibo aliquid dematur : adiuvat . si paulo grauiora : facile sit non aquam tantum bibere : sed etiam cibo carnem subtrahere . interdum panis quoque minus / quam pro consuetudine assumere : humidoque cibo esse contentum & oleum potissimum . Satisque sit tunc ex toto a cibo / a uino / ab omni motu corporis abstinere : cum uehementes notae terruerunt . Neque dubium est quin uix quisquam / qui non dissimulauit : sed per haec mature morbo occurrit : aegrotet .

## DE FEBRIVM GENERIBVS . CAPVT . III .

**A** Tque haec quidem sanis facienda sunt tantum causam metuentibus : sequitur uero curatio febrium . quod & in toto corpore & uulgariter maxime morbi genus est . Ex his una quotidiana : altera tertiana : altera quartana est . Interdum etiam longiore circuitu quaedam redeunt . Sed id raro euenit . In prioribus & morbi sunt & medicina . At quartanae quidem simpliciores sunt . Incipiunt fere ab horrore : deinde calor erumpit : finitaque febre biduum integrum est . ita quarto die reuertitur . Tertianarum uero duo genera sunt . Alterum eodem modo quo quartana & incipiens & desinens : illo tantum interposito discrimine : quod unum diem praestat integrum : tertio redit . Alterum longe perniciosius : quod tertio quidem die reuertitur : ex octo autem & quadraginta horis fere sex et triginta per accessionem occupat : interdum etiam uel minus uel plus . neque ex toto remissione desistit : sed tantum leuius est . Id genus plerique medici hemitritae appellunt . Quotidianae uero uariae sunt & multiplices . Aliae enim protinus a calore incipiunt : aliae a frigore : aliae ab horrore . Frigus uero ubi extremae partes mem-



brorum in algeſcunt, horrorem ubi totum corpus intremiſit. Rurſus alia ſic deſiunt: ut ex toto ſequatur integritas. alia ſic: ut aliquantum quidem minuatur ex febre: nihilominus tamen quædam reliqua remaneant / donec altera acceſſio accedat: ac ſæpe alia uix quicquam aut nihil remittant: ſed ita ut cõtinuent. Deinde alia feruorem ingentem habent: alia tolerabilem. alia quotidie pares ſunt: alia impares. atq; inuicem altero die leniores: altero uehementiores. alia tẽpore eodẽ poſtridie reuertuntur: alia uel ſerius uel celerius. alia diẽ noctem q̃ acceſſionem & deceſſionem implent: alia minus: alia plus. alia cum decedunt ſudorem mouent: alia non mouent. atque alias perſudorem ad integritatem uenit: alias corpus tantum imbecillius redditur. Acceſſiones etiam modo ſingulae ſingulis diebus fiunt: modo binæ / pluresue concurrunt. Ex quo ſæpe euenit: ut quotidie plures acceſſiones / remiſſionesq; ſint. Sic tamen ut unaquæque alicui priori reſpondeat. Interdum uero acceſſiones quoq; confunduntur ſic: ut notari neq; tempora earum / neque ſpatia poſſint. Neque uerum eſt quod dicitur a quibusdam: nullam febrem inordinatam eſſe: niſi aut ex uomica: aut ex inflammatione: aut ex ulcere. Facilior enim ſemper curatio foret / ſi hoc uerum eſſet. Sed quod euidentes cauſae faciunt: facere etiam abdita poſſunt. Neque dere: ſed de uerbo / controuerſiam mouent. Qui cum aliter / aliter que ineodem morbo febres accedant: non eaſdem inordinate redire: ſed alias / aliasque ſubinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret / etiam ſi uere diceretur. Tempora quoque remiſſionum modo liberalia / modo uix ulla ſunt.

## DE CVRAtionum diuerſis generibus. CAPVT. IIII.

**E**T febrium quidem ratio maxime talis eſt. Curationum uero diuerſa genera ſunt / p̃ ut auſtores aliquos habent. Aſclepiades officium eſſe medici dicit: ut tuto / ut celeriter /



ut iocunde curet. Id uotum est sed fere piculosa esse nimium  
& festinatio & uoluptas solet. Qua uero moderatione uten-  
dum sit: ut quantum fieri potest omnia ista contingant: pri-  
ma semper habita salute in ipsis partibus curationum conside-  
randum erit. Et ante omnia quaeritur / primis diebus aeger qua-  
ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam  
datis concoctionem moliebantur: eo quod cruditatem maxi-  
me horrebant: deinde eam materiam / quae laedere uidebatur  
ducendo / saepius aluum subtrahabant. Asclepiades medicame-  
ta sustulit: aluum non toriens: sed fere tamen in omni morbo  
subduxit. Febre uero ipsa praecipue se ad remedium uti pro-  
fessus est. Conuellendas enim vires aegri putauit luce: uigilia:  
siti ingenti sic / ut ne os quidem primis diebus elui sineret.  
Quo magis falluntur qui per omnia iocundam eius discipli-  
nam esse contendunt. Is enim ulterioribus quidem diebus cu-  
bantis etiam luxuriae subscripsit: primis uero tortoris uicem  
exhibuit. Ego autem medicamentorum dari portiones & aluum  
duci non nisi raro debere / concedo. Et id non ideo tamen age-  
dum: ut aegri vires conuellantur / existimo: quoniam ex imbecilli-  
tate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam su-  
perantem oportet: quae naturaliter detrahatur ubi nihil noui  
accedit. Itaque abstinendus a cibo primis diebus est: in luce ha-  
bendus aeger: nisi infirmus interdum est. quoniam corpus ista  
quoque digerit: isque cubare quae maximo conclui debet. Quod  
ad sitim uero somnumque pertinet: moderandum est: ut inter-  
diu uigilet: noctu / si fieri potest: conquiescat. Ac neque po-  
tet: neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest: ubi  
& siccum est & ipsi foetet. quanuis id tempus aptum potioni  
non est: Commodoque Erasistratus dixit saepe inferiore par-  
te humorem non requirente / os & fauces requirere: neque ad  
rem male haberi aegrum pertinere. Ac primo quidem sic tenen-  
dus est. Optimum uero medicamentum est: oportune cibus  
datus. qui quando primum dari debeat / quaeritur. Plerique ex  
antiquis tarde dabant: saepe quinto die: saepe sexto. & id for-



tasse uel in asia uel in egypto cæli ratio patitur. Asclepiades  
 ubi ægrum triduo per omnia fatigarat: quarto die cibo de-  
 stinabat. At Themison nuper non quando coepisset febris:  
 sed quando desisset, aut certe leuata esset: considerabat: & ab  
 illo tempore expectato die tertio: si non accesserat febris: sta-  
 tim: si accesserat: ubi ea uel desierat: uel si assidue in hærebat  
 si certe se inclinauerat: cibum dabat. Nihil autem horum uti-  
 q; perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus  
 esse: potest secundo: potest tertio: potest non nisi quarto/  
 aut quinto: potest post unam accessionem: potest post duas:  
 potest post plures. Refert enim qualis morbus sit: quale cor-  
 pus: quale cælum: quæ ætas: quod tempus anni. minimeq; in re-  
 bus multum inter se differentibus ppetuum esse præceptum tem-  
 poris potest. In morbo qui plus uirium aufert: celerius cibus  
 dandus est. itemq; eo cælo/quo magis digerit. Ob<sup>a</sup> quam cau-  
 sam in africa nullo die æger abstinere recte uidetur. Maturius  
 etiam puero/q; iuueni: æstate/q; hyeme dari debet. Vnum il-  
 lud est, semper quod ubiq; seruandum est: ut ægri uires subin-  
 de assidueus medicus inspiciat: & quandiu superunt / abstin-  
 entia pugnet si imbecillitatem uereri cepit: cibo subueniat. Id e-  
 nim eius officium est: ut ægrum neq; superuacua materia one-  
 ret: neq; imbecillitatem fame pdat. Id p apud Eralistratum  
 quoq; inuenio: q; quamuis parum docuit quando uenter / quan-  
 do corpus ipsum exinaniretur: dicendo tamen hæc esse uisen-  
 da & cum cibus dandus / cum corpori deberetur: satis osten-  
 dit dum uires suessent / dari non oportere: ut deficerent cō-  
 sulendū esse. ex his autem intelligi potest ab uno medico mul-  
 tos non posse curari: eumq; si artifex est / idoneum esse / q; nō  
 multū ab ægro recedat: sed q; quæstui seruiunt: quoniam is ma-  
 ior ex populo est: libenter amplectuntur ea præcepta / quæ se-  
 dulitatem non exigunt: ut in hac ipsa re / facile est enim dies  
 uel accessiones numerare iis quoque / ægrum raro uident. ille  
 assideat necesse est: qui / quod solum opus est, uisurus est:  
 quando nimis imbecillus futurus sit / nisi cibum acceperit.



In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio: quoniam antiqui potissimum impares sequebantur: eosque tanquam tunc de ægris iudicaretur crifimos nominabant. Hi erant dies tertius: quintus: septimus: nonus: undecimus: quartusdecimus: unus & uigesimus: ita ut summa potentia septimo: deinde quartodecimo: deinde uni & uigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant: ut dierum imparium accessiones expectaret deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus darent. adeo ut hippocrates si alio die febris desisset: recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut uanum repudiavit: neque in ullo die: quia par, impar ut esset: iis uel maius uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt: & opportunius post eorum accessiones cibis datur. Non nunquam etiam in ipso morbo: dierum ratio mutatur: fit que grauior / qui remissior esse consuevit: atque ipse quartusdecimus par est: in quo esse magnam uim antiqui fatebantur. Qui cum optatum primi naturam habere contenderent: ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet: ipsi sibi repugnabant: non octauum neque decimum neque duodecimum diem sumendum quasi potentiores. Plus enim tribuebant nono & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione / ab undecimo non ad tertium decimum: sed ad quartum decimum transibant. Est etiam apud Hippocratem: ei quem septimus dies liberaturus sit: quartum esse grauissimum. Ita illo quoque auctore indie pari & grauior febris esse potest & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quonque diem / ut in utrunque efficacissimum apprehendit: id est quartum: septimum: undecimum: quartumdecimum: decimum septimum: in quo & ab impari ad paris numeri rationem transit. & ne hoc quidem propositum conseruauit: cum a septimo die undecimus / non quartus sed quintus sit. adeo apparet quacunque ratione ad numerum respeximus / nihil rationis sub illo quidem auctore reperi. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum pythagorici



numeri fefel'erunt: cum hic quoque' medicus, non numerare di-  
es debeat: sed ipsas accessiones incueri: & exiis coniectare quā-  
do dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet sci-  
re: cum oporteat dari cum iam bene uenae conquieuerunt: aut  
etiam num manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam in-  
tegerimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades in-  
clinata quidem febre: sed adhuc tamen inhaerente. In quo ua-  
nam rationem secutus est: non quo non sit interdum maturius  
cibus dandus / si mature timeatur altera accessio: sed quo scili-  
cet quam sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur  
quod integro corpori infertur. Neque tamen uerum est quod  
Themisoni uidebatur: si duabus horis integer futurus esset  
aeger: satius esse tunc dare: ut ab integro corpore potissimū  
diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset: id esset op-  
timum. Sed cum hoc breue tempus non praeter: satius esse  
principia cibi a decedente febre / quam reliquias ab incipiente  
excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerri-  
mo dandus est: si breue / etiam antequam ex toto integer fi-  
at. Quo loco uero integritas est: eodem est remissio: quae ma-  
xime in febre continua potest esse. Atque hic quoque quaeri-  
tur: utrum tot horae expectandae sint: quot febrem habue-  
runt: an satis sit primam partem earum praeteriri: ut aegris  
iocundius insidat / quibus interdum nō uacat. Tutissimum est  
autem ante / et otius accessiois tempus praeterire. quamuis ubi  
lōga febris fuit: potest indulgeti aegro maturius: dum tamen  
ante minime pars dimidia praetereatur. Idq; non in ea sola  
febre: de qua proxime dictum est: sed in omnibus ita seruan-  
dum est.

De febrium speciebus & singularum curationibus & primo quā-  
do cibus febricitantibus dandus sit. CA. VI. V.

**H**aec magis per omnia genera febrium perptua sunt.  
nunc ad singulas earum species descendam. Igitur  
g. ii.



si semel tantum accessit: deinde desit: ea que uel ex inguine /  
 uel ex lassitudine, uel ex æstu, alia ue simili re fuit sic, ut inte-  
 rior nulla causa metum fecerit. postero die cum tempus ac-  
 cessionis ita transiit: ut nihil moueret: cibus dari potest.  
 At si ex alto calor uenit: & grauitas uel capitis / uel præcor-  
 diorum secuta est. neque apparet quid corpus confuderit:  
 quanuis unam accessionem secuta integritas est: tamen / quia  
 tertiana timeri potest: expectandus est dies tertius: & ubi ac-  
 cessionis tempus præterit: cibus dandus est: sed exiguus: qui  
 a quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum: si  
 corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero poste-  
 ro, tertio ue / aut quarto die secuta febris est: scire licet  
 morbum esse. Sed tertianarum: quartanarum que: quarum  
 & certus circuitus est & finis integer est: & quia liberaliter  
 quæta tempora sunt: expeditur ratio est. De quibus suo  
 loco dicam. Nunc uero eas explicabo. quæ quotidie negent.  
 Igitur tertio quoque die cibus aegro commodissime datur:  
 ut alter febrim minuat: alter uiribus subueniat. Sed is da-  
 ri debet / si quotidiana febris est / quæ ex toto desinat: si  
 mulat que corpus integrum factum est. si quanuis non ac-  
 cessiones, febres tamen iunguntur: & quotidie quidem incre-  
 scunt: sed sine integritate tamen remittuntur cum corpus ita  
 se habet: ut maior remissio non expectetur. Si altero die  
 grauior: altero leuior accessio est: post grauiorem. Fere  
 uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. Quo fit ut  
 grauiorem accessionem nox quoque tristior antecedit. At si  
 continuatur febris: neque leuior unquam fit: & dari cibum ne-  
 cesse est: quando dari debeat magna dissensio est. Quidam  
 quia fere remissius matutinum tempus ægris est: tunc putant  
 dandum. Quod si respondent: non qua mane est: sed qua re-  
 missior est æger. dari debet. Si uero ne tunc quidem ulla re-  
 quies ægris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua  
 natura melius esse debeat: morbi uicio non est. simulque inseq-  
 tutur tempus meridianum: a quo cum omnis æger fere peior fiat:



timere potest: ne ille magis etiam quam ex consuetudine urgeatur. Igitur alii uespere tali aegro cibū dant. Sed cū eo tēpore fere pessimi sint / qui aegrotant: uerendum est: ne siquid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob haec ad mediam noctem decurro: id est finito iam grauissimo tempore: eodem que longissime distante: secuturis uero antelucanis horis: quibus omnes fere maxime dormiunt: deinde matutino tempore: quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia uerendum est: ne cibum statim subsequantur: quandocumque quis ex accessione leuatus est: tunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet: pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sint: post eam potius accessionem cibus dari debet: quæ non inter meridiem & uesperem definit. Si impares sunt: considerandum est / quo distent. Nam si altera grauior: altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior: altera breuior: post longiorem. si altera grauior: altera longior est: considerandum est: utra magis affligat: illa ui: an hæc tempore: & post eam dandus est. Sed plane plurimum interest: quantæ / quales que inter eas remissiones sint. Nam si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore / cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est, adeo ut ubi accessiones continuantur protinus inclinata priore dandus cibus sit. Etenim perpetuum est: ad quod omne consilium dirigi potest: cibum quam maxime semper ab accessione futura reducere. & hoc saluo dare quam integerrimo corpori. Quod non inter duas tantum: sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cū sit aptissimum tertio quoque die cibum dare: tamen si corpus infirmum est: quotidie dandus est. multo que magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt: aut si duæ plures uel accessiones eodem die ueniunt. Quæ res efficit: ut & a primo die prius cibus dari quotidie debeat.



Si protinus uene conciderunt: & saepius eodem die: si iter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandum est: ut post eas febres minus cibi detur: post quas / si per corpus liceret: omnino non daretur. Cum uero febris in iter: incipiat: augeatur: consistat: decedat: deinde in decessione consultat / aut finiatur: scire licet / optimum cibo tempus esse febre finita. deinde cum decessio eius consistit. tertium si necesse est: quandocumq; decedit: caetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget: satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre: q̄ incrementum. Satius esse instante / q̄ incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit / non sit sustinendus. Neq; hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem: seu supersunt uires: seu desunt: seu quidam mali affectus interueniunt. Cum uero semper aegros securos agere conueniat: ut corpore tantum non etiam animo laborent: tum praecipue ubi cibum sumpserunt. Itaq; si qua sunt quae exasperatura eorum animos sunt: optimum est ea dum aegrotant eorum notitiae subtrahere. Si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usq; somni tempus: & cum experrecti sunt: tum exponere.

Quando poriones febricitantibus dari expediat. Caput. VI.

**S**ed de cibo facilius quidem cum aegris ratio est. quorum saepe stomachus hunc respuit: etiam si mens concupiscit. De porione uero ingens pugna est: eoq; magis / quo maior febris est. Haec enim sitim accendit: & tum maxime aquam exigit: cum illa periculosissima est. Sed docendus aeger est: ubi febris quieuerit / protinus sitim quoq; quieturam: longioremq; accessionem fore siquod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius enim desinere sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem / q̄ sitim sustinent: tanto magis aegris in porione / q̄ in cibo indulgere. Sed primo quidem die



nullus humor dari debet: nisi subito sic uenæ conciderunt: ut  
cibus quoque dari debeat. Secundo uero / cæterisque etiam quibus  
cibus non dabitur: tamen si magna sitis iurget / potio dari  
potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide tarentino dictum ra  
tione caret: ubi aut bilis ægrum / aut cruditas male habet: expe  
dire quoque per medicas porciones misceri nouam materiam cor  
ruptæ. Illud uidendum est: ut qualia tempora cibo leguntur:  
talìa porcioni quoque / ubi sine illo datur: deligantur: aut cū ægrū  
dormire cupiemus. Quod fere sitis prohibet. Satis autem con  
uenit: cum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit:  
tum præcipue esse foeminis: quæ ex partu in febres iciderunt.  
Sed cum tempora cibo porcioni que febris & remissionis ratio  
det: non est expeditissimum scire / quando æger febricitet:  
quando melior sit: quando deficiat. Sine quibus dispensari il  
la non possunt. Veniseni maxime credimus fallacissimæ rei.  
quia sæpe istæ leniores / celeriores ue sunt & ætate & sexu &  
corporum natura. Et plerumque satis sano corpore si stomachus  
infirmus est. non nunquam etiam incipiente febre subeunt & quie  
scunt: ut imbecillus is uideri possit: cui facile laturo grauis in  
stat accessio. Contra sæpe eas concitat & resoluit sol & balne  
um & exercitatio & metus & ira & quilibet alius animi affec  
tus. Adeo ut cum primum medicus uenit: sollicitudo ægri du  
bitantis quomodo ille se habere uideatur: eas moueat. ob quā  
causam periti medici est: non protinus ut uenit apprehendere  
manu brachium. Sed primum residere hilari uultu: percontari  
que quemadmodum se habeat: & si quis eius metus est: eum p  
babili sermone lenire. tum deinde eius corpori manum admo  
uere. Quas uenas autem conspectus medici mouet quam faci  
le mille res turbant. Altera res est / cui credimus: calor æque  
fallax. Nam hic quoque excitatur / æstu: labore: somno: metu:  
solicitudine. Igitur intueri quidem etiam ista oportet. Sed  
his non omnia credere: ac protinus quidem scire non febrica  
tare eum: cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt: tepor que talis  
est: qualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore mo

*et brachium pulsum  
mouendum.*



### TERTIVS

tunc febrem se se concipere: sed ita: si summa quoque arida in  
 æqualiter cutis est. si calor & in fronte est & intimis præcordi  
 is oritur, si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit. si co  
 lor / aut rubore / aut pallore nouo mutatus est. si oculi graues:  
 & aut persicci / aut sub humidi sunt. si sudor cum sit: inæqua  
 lis est. si uenæ non æquis interuallis mouentur. Ob quam cau  
 sam medicus neque in tenebris / neque a capite ægri debet reside  
 re: sed illustri loco aduersus eum: ut omnis notas ex uultu quo  
 que cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit atque decreuit: ex  
 pectari oportet. num tempora / partes uel corporis alia paulū  
 madescant: quæ sudorem uenturum esse testentur. Ac si qua  
 nota est: tunc demum dare potui calidam aquam: cuius salu  
 bris effectus est / si sudorem per omnia membra diffundit. Hu  
 ius autem rei causa continere æger sub ueste satis multa manus  
 debet: eademque crura pedesque contegere: quæ male plerique æ  
 gros in ipso impetu febris: pessime quæ ubi ardens ea est: ma  
 le habent. Si sudare corpus coepit: linteum tepescere oportet:  
 paulatim quæ singula membra detergere. At ubi sudor  
 omnis finitus est: aut si is non uenit: ubi quæ maxime potuit:  
 idoneus esse cibo æger uidetur. sub ueste leniter ungendus est:  
 tum detergendus: deinde ei cibus dandus. Cibus autem febrici  
 tantibus humidus est aptissimus: aut humori certeque proximus:  
 utique ex materia quam leuissima: maxime quæ sorbitio. ea  
 quæ / si magnæ febres fuerunt / quam tenuissima esse debet. Mel  
 quoque despumatum huic recte adicitur: quo corpus ma  
 gis nutriatur. sed id / si stomachum offendit: superuacuum est:  
 sicut ipsa quoque sorbitio. Dari uero inuicem eius potest: uel  
 intrita ex aqua calida: uel alica elota. si firmus est stomachus  
 & compressa aliust: ex aqua mulsa. si uel ille languet: uel hæc  
 profluit: ex pulsa. Et primo quidem cibo ita satis est. secundo  
 uero aliquid adiaci potest: ex eodem tamen genere materię /  
 uel olus / uel conchilium uel pomum. Et dum febres quidem  
 crescunt: hic solus idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt /  
 aut leuantur: semper quidem incipiendum est ab aliquo ex ma



43  
• TERTIVS •

etia leuissima: adiciendum uero aliquid ex media: ratione habita subinde & uirium hominis & morbi. Ponendi uero ægro uarii cibi: sicut Asclepiades præcepit: cum demum sunt ubi fastidio urgetur: neq; satis uires sufficiunt: ut paulum ex singulis degustando famem uitet: at si neq; uis neque cupiditas deest: nulla uarietate sollicitandus æger est: ne plus assumat quam concoquat. Neq; uerum est: quod ab eo dicitur: facilius concoqui cibos uarios. Eduntur enim facilius. Ad concoctionem autem materię genus modus pertinent. Neque inter magnos dolores: neq; incrementum morbo tutum est: ægrum cibo impleri: sed ubi inclinata iam in melius ualitudo est. sunt alię quoq; obseruationes in febribus necessarie. atq; id quoq; uidendum est: quod quidam solum præcipiunt: an astrictum corpus sit: an proficiat. Quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit: nam si astrictum est: ducenda aliud est: mouenda urina: eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiã misisse: concussisse uehementibus gestationibus corpus: in lumine habuisse: imperasse famem: sitim. uigiliam prodest. utile est etiam ducere in balneum prius dimittere in solium: tum ungere. item ad solium redire: multaq; aqua fouere inguina: interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere: uti cibo rarius & terius tenui. simplici molli. calido. exiguo maximeq; oleribus: qualia sunt / lapatiũ urtica. malua. uel iure etiam concharum / musculorum ue, aut locustarum: neq; danda caro nisi elixa est. at potio esse debet magis liberalis & ante cibum & post hunc et cum hoc ultra q̃ sitis coget. Poteritq; a balneo etiam pinguis aut dulcius dari uinum. poterit semel aut bis interponi græcum sal sum. Contra uero si corpus proficiat: sudor coercendus quies adhibenda erit. tenebris somnoq; quodocunq; uolet / utendum. non nisi leni gestatione corpus agitandum: & pro genere mali subueiendum. Nam si uenter fluat: aut si stomachus non continet ubi febris decreuit / liberaliter oportet aquam tepidam potui dare et uomere cogere: nisi fauces / aut præcordia /



## LIBER.

aut latus dolet/aut uetus morbus est. Si uero sudor exerceat:  
duranda cutis est uel nitro uel sale: quæ cum oleo miscentur.  
At si leuius id uicium est: oleo corpus ungendum est. si uehe-  
mentius: rosa uel melino uel myrteo: cui uinū austerum sit ad-  
iectum. Quisquis autem fluore æger est: cum uenit in balneum  
prius unendus: deinde in solium demittendus est. Si in cute  
uicium est: frigida quorū quam calida aqua melius uetur. ubi  
ad cibum uenium est: dari debet is ualens: frigidus. siccus sim-  
plex: qui quam minime corrumpi possit/panis tostus: caro as-  
seruatum asperum/uel certe subausterum: si nenter pro fluit/  
calidum: si sudores noceat: uomitusque sunt frigidum.

## Quomodo pestilentes febres curari debeant. CAPVT. VII

**D**ESiderat etiam propriam animaduersionem in febribus  
pestilentie casus. In hac minime utile est/aut fame aut  
medicamentis uti/aut ducere aluum. Si uires sinant: sangui-  
nem mittere optimum est: præcipue que/ si cum dolore febris  
est. Si id parum tutum est: ubi febris aut tenuata est/aut remi-  
ta est: uomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius/ quam in  
aliis morbis ducere in balneum opus est: uinum calidum & me-  
racius dare & omnia glutinosa. Inter quæ quoque carnem gene-  
ris eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripi-  
unt: eo maturius auxilia/ etiam cum quadam temeritate rapien-  
da sunt. Quod si puer est/ qui laborat: neque tantum robur eius  
est: ut sanguis mitti possit: sicut ei utendum est: ducenda aluus  
uel aqua/ uel ptisanæ cremore. tum demū is leuibus cibis nutri-  
endus. Et ex toto non sic pueri ut uiri curari debent. Ergo ut  
in alio quoque genere morborum: parcius in his agendum est.  
Non facile sanguinem mittere: non facile ducere aluum: non  
cruciare uigilia/ fame ue/ aut nimia siti/ non uino curare satis  
conuenit. Vomitus post febre meliendus est: deinde dandus  
cibus ex leuissimis. tum is dormiat. postero quoque die si fe-  
bris manet: abstineatur. Tercio ad similem cibum redeat.



Dandaq; opera est quantum fieri potest: ut inter opportunam abstinentiam cibosq; opportunos / obmissis cæteris nutriatur. Si uero ardens febris extorret: nulla medicamenti danda portio est. sed in ipsis accessionibus oleo & aqua refrigerandus est. quæ miscenda manu sunt donec albescant: & conclavi tenendus: quo multum & purum aerem trahere possit. neque multis uestimentis strangulandus: sed admodum leuibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia uitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia uexandus est: alendus maturius est: idest a die tertio & ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coit: inclinata iam accessione uomere cogendus est. & tunc dandum frigidum olus: aut pomum ex iis: quæ stomacho cõueniunt. Si sic cus manet stomachus: prius uel pitisanæ uel alicæ uel orizæ cremor dandus est: cum quo recens adeps cocta sit. Cum uero in summo incremento morbus est: utique non ante diem quartum magna siti antecedente frigida aqua copiose præstanda est: ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam uenter & præcordia ultra modum repleta / satiq; refrigerata sunt: uomere debet. Quidam ne uomitum quidem exigunt / sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatem data promedicamento utuntur. Vbi utrunlibet factum est: multa ueste operiendus est & collocandus ut dormiat. Fereque post longam sitim & uigiliam / post multam satietatem / post infractum calorem plenus somnus uenit per quem ingens sudor effunditur. idq; præsentissimum auxilium est. Sed in iis tamen in quibus præter ardorem / nulli dolores: nullus præcordiorum tumor: nihil prohibens uel in thorace uel in pulmone uel in faucibus: non ulcus: non defectio. non deiectio: non profluium alui fuit.

Curatio semitertianæ febris quæ hemitritæos dicitur.

## CAPVT. VIII

**A** ubi id genus tertianæ est: quod hemitritæon medici appellant: magna cura opus est: ne id fallat. Habet enim



plerumque frequentiores accessiones decessionesque: ut aliud morbi genus uideri possit: porrigiturque febris inter horas. XXIII & XXXVI. ut quod idem est. non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est: neque dari cibum/nisi in ea remissione quae uera est: & ubi ea uenit protinus dari: plurimi quique subalterutro curantis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet: inter initia sanguis mitti debet: cum dari cibus: qui neque incitet febrem: & tamen longum eius spatium sustineat.

## Curatio lentarum febrium

## CAPVT. VIII

**N**on nunquam etiam lentae febres sine ulla remissione corpus tenent: ac neque cibo/neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet: ut morbum mater. Fortasse enim curationi oportunior fiet. Saepem igitur ex aqua frigida: cui oleum sit adiectum: corpus eius pertractandum est. quoniam interdum sic euenit/ut horror oriatut: & fiat initium quoddam noui motus: ex quo cum magis corpus incaluit: sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo & sale salubris uidetur. at si diu frigus est & torpor & inactio corporis: non alienum est in ipsa febre dare, mulsi tres aut quattuor cyathos uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris: & maior ortus calor/simul & priora mala tollit: & spem remissionis in ea curatione ostendit. neque hercules ista curatio noua est: quae nunc quidam tradicos sibi aegros: qui sub caucioribus medicis trahebantur: interdum contrariis remediis sanant. Siquidem apud antiquos quoque ante Erophilum & Erasistratum/maximeque post Hippocratem fuit Petto quidam qui febricitantem hominem ubi accipat multis uestimentis operiebat: ut simul calorem ingentem sitimque excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris: aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem: explicuisse se aegrum indicabat. si non mouerat: plus etiam aquae frigidae ingerebat:



& cum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat: protinus suillam assam & uinum homini dabat. Si non liberauerat: decoquebat aquam sale adiecto: eamque bibere cogebat: ut mouendo uentrem purgaret. Et intra hæc omnis eius medicina erat. Eaque non minus grata fuit iis: quos Hippocratis successores non refecerant: quam nunc est iis: quos Erophili uel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina: quia plures si protinus a principiis excepit: interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint: fere quos ratio non restituit: temeritas adiuuat. Ideoque eiusmodi medici melius alienos ægros: quam suos nutriunt. Sed est circumspectus quoque hominis & nouare interdum & augere morbum & febres accendere: quia curationem ubi id quod est non recipit: potest recipere id quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem & præcordiorum inflammationem & ariditatem & scabritiem lingux. Caput. X].

**C**onsiderandum etiam est: febres ne solæ sint: an alia iis quoque mala accedant. idest num caput doleat: num lingua aspera: num præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt: rosā cum aceto miscere oportet: & inid ingerere: deinde habere duo pittacia: quæ latitudinem frontis longitudinemque aequent. Ex his inuicem alterum in aceto & rosa habere: alterum in fronte: aut intinctam hisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit: pura rosa utendum est. Si rosa ipsa laedit: oleo acerbo. si ista parum iuuant: teri potest uel iris arida: uel nuces amarae: uel quaelibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum dolorem minuit. sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus: uel cum rosa: cerussa: spuma ue argenti. Olfacere quoque uel serpillum uel anetum non alienum est. At si in præcordiis inflammatio & dolor

.h.i.



est: primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia: ne si calidiora fuerint plus eo materię concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit: tunc demum ad calida & humida ueniendum est: ut ea quę remanserint: discutiant. Notę uero inflammationis sunt quattuor: rubor & tumor cū calore & dolore. Quo magis errauit Erasistratus: qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est: nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neq; inflammatio / neque febris: sed tantum præcordiorū dolor est: protinus calidis & siccis fomentis uti licet. Si uero lingua sicca est et scabra: detergenda primum penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mixtis inter se rosa & melle. Mel purgat. rosa reprimat: simul que siccescere non sinit. At si scabra non est sed arida: ubi penicillo detergenda est: ungi rosa debet: cui cęrae sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus / quod febrem præcedit CAPVT. XI

**S**olet etiam ante febres esse frigus: idq; uel molestissimū morbi genus est. Vbi id expectatur: omni porione prohibendus æger est. Hęc enim paulo ante data multum malo adiicit. Item maturius ueste multa tegendus est. admouenda partibus iis: pro quibus metuimus / sicca & calida fomenta sic ne statim uehementissimi calores incipiant: sed paulatim icrescant. Perfricandę quoq; ex partes manibus unctis ex uetere oleo sunt: eiq; adiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidam una frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus nō nulli tres aut quattuor sorbitionis cyathos etiam num manente febre dant. Deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido & leni. Ego tum hoc puto tentandum: cum parum cibus semel & post febrem datus prodest. Sed curiose perspiciendum est: ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere ualitudinis iam minui febris uidetur & rursus intenditur.



Itaq; ei remissioni credendum est: quæ etiam immoratur & in  
stationem foetoremq; quendâ oris: quem ozen græci uocant:  
minuit. Illud satis cõuenit: si quotidie pares accessiones sũt:  
quotidie paruum cibum dandum. si impares: post grauiorem/  
cibum: post leuiorem / aquam mulsam.

## Curatio horroris in febris. CAPVT. XII.

**H**Orror autem eas fere febres antecedit: quæ certũ habent  
circuitum & ex toto remittuntur. Ideoq; tutissimæ sunt  
maxime: quæ curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora  
sunt: neq; alui ductio: neq; balneum: neq; uinum: neque medica  
mentũ aliud recte datur. incertum est enim quando febris uen  
tura sit. ita fieri poterit / ut si subito uenerit: summa in eo pri  
us sit: quod auxilii causa sit inuentum. Nihilque aliud fieri  
potest / q̃ ut primis diebus bene abstinenceatur æger. deinde suc  
cessu febris eius: quæ grauissima ẽ / cibum sumat. at ubi certus  
circuitus est: facilius omnia illa tentantur: quia facilius pro  
ponere nobis & accessionum & decessionum uices possumus.  
In his autem cum ueterauerunt / utilis famis non ẽ. Primis tan  
tũmodo diebus ea pugnandum est: deinde diuidenda curatio  
est: & ante horror: tum febris discutienda. Igitur cum  
primum aliquis inhorruit & ex horrore incaluit: dare ei oportet  
potui tepidã aquam subsalsam & uomere eum cogere. nam  
fere talis horror ab iis oritur: quæ biliosa in stomacho resede  
runt. idem faciendum est si pximo quoq; circuitu æque cessit.  
sæpe .n. sic discuitur. iãq; / quod genus febris sit: scire licet.  
itaq; sub expectatione pximæ accessionis: quæ instare tertia  
potest: deducendus in balneum est: dandaq; opa est: ut p tem  
pus horroris isolio sit. Si ibi quoq; senserit: nihilo minus idẽ  
sub expectatione accessionis quartæ faciat. siquidẽ eo quoq;  
modo sæpe id discuitur. si nec balneum quidẽ pfuit: ante ac  
cessionem alliũ edat: aut bibat calidam aquam cum pipe. siqui  
dem ea quoq; assumpta calorẽ mouent: q̃ horrore nõ admittit.  
h. ii.



### TERTIVS

Deinde eo modo quo in frigore praeceptum est: anteq̃ in hoc  
rescere possit: operiatur. Fomentisq; protinus ualidioribus  
totum corpus circumdare conuenit: maximeq; inuolutis extinc  
tis testis & titionibus. Si nihilo minus horror perripuerit: mul  
to oleo calfacto inter ipsa uestimenta perfundatur: cui & que  
ex calfacientibus aliquid sit adiectum. adhibeaturq; frictio /  
quantam is sustinere poterit: maximeq; in manibus & pedibus  
& spiritum ipse contineat. neq; desistendum est etiam si hor  
ror est. Saepe enim pertinacia iuuantis, malum corporis uicir.  
Siquid euomit: danda aqua tepida: iterumque uomere cogen  
dus est. utendumq; eisdem est donec horror finiatur. Sed prae  
ter haec / ducenda alius est / si tardius horror quiescet. si qui  
dem id quoq; exonerato corpori prodest. Ultima quoq; post  
haec auxilia sunt gestatio & frictio. Cibus autem in eiusmodi  
morbis maxime dandus est: qui mollem aluum praestet. Caro  
glutinosa. uinum / cum dabitur / austerum.

#### Curatio quotidianae febris .CAPVT. XIII.

**H**Aec ad omnes circuitus febrium ptinent. discernenda ta  
men singulae sunt / sicut rationem habent dissimilem. si  
quotidiana est: triduo primo magnopere abstinere oportet.  
tum cibus altero quoque die uti. Si res inueterauerit: post fe  
brem experiri balneum & uinum: magisq; si horrore sublato  
haec superest.

#### CVRATIO tertianae febris. CAPVT. XIII.

**S**I tertiana uero / quae ex toto intermittit / aut quartana est:  
mediis diebus & abulationibus uti oportet: aliisq; exerci  
tationibus & unctionibus. qdā ex antiquioribus medicis Cle  
ophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem ca  
put aegri multa calida aqua perfundebat: deinde uinum dabat.  
Quod: quanuis pleraque eius uiri praecepta secutus est A  
sclepiades: recte tamen praeteriit. Est enim anceps:



Ipse / si tertiana febris est: tertio die post accessionem dicit alium duci oportere. quinto post horrorem / uomitum elicere. deinde post febrem / sicuti illi mos erat / adhuc calidis dare cibum & uinum. Sexto die in lectulo detineri. sic enim fore / ne septimo die febris accedat. Id saepe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est: ut hoc ipso ordine utamur. Tria remedia: uomitus: alui ductionis: uini potus per triduum: id est die tertio & quinto & septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est: inciditque in uetustatem: quo die febris expectabitur: in lectulo se contineat: post febrem perfricetur: tum cibo assumpto bibat aquam. postero die / quo cibo uacat & ab excitatione unctioque: aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit: & post febrem uinum: & medio die paulum cibi debebit assumere.

Curatio quartanæ febris.

CAPVT. XV.

**E** Adem in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde ad modum finiatur: nisi primis diebus discussa est: diligentius ab initio præcipiendum est: quid in ea debeat fieri. Igitur sicuti cum horrore febris accessit: eaque desit: eodem die & postero tertioque continere se debet & aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere: bi duo proximo quantum fieri potest ne hanc quidem. si quarto die cum horrore febris reuertitur: uomere sicut ante præceptum est. deinde post febrem modicum cibum sumere: uini quadrantem. Postero tertioque die abstinere: aqua tantummodo calida: si sitiet / assumpta. septimo die balneo frigus præuenire: abstinere: continere se debet: si febris redierit: ducere aluum. ubi ex eo corpus conquieuerit in unctioe uehementer perfricari: eodem modo sumere cibum & uinum: bi duo proximo se abstinere: frictione seruata. decimo die rursus balneum expiri: & si postea febris accessit: æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est. quæ tot dierum. ut abstinencia cum

b. iii.



cum cæteris quæ præcipiuntur / febrem tollant. Si uero nihilominus remanet: aliud ex toto sequendum est curationis genus: idque agendum: ut quod diu sustinendum est / corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis tarentini debet. qui primis diebus ducendam aluum: deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit: tamen etiam febre liberatus uix refectioi ualebit. Adeo si febris sæpius accesserit: concidet. Igitur si tertio decimo die morbus manebit: balneum neque ante febrem / neque post eam tentandum erit: nisi interdum iam horrore discussio. Horror ipse per eadem quæ supra præscripta sunt expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi & uehementer perfricari: cibum & ualidum & fortiter assumere. uino uti quantum libebit. postero die cum satis quieuerit: ambulare: exerceri: ungi: perfricari fortiter: cibum accipere sine uino. Tertio die abstinere. Quo die uero febrem expectabit: ante surgere & exerceri: dareque operam non oportet: ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. Sic enim sæpe illa discutitur. At si in opere occupauit: tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt / oleum: frictio: exercitatio: cibus: uinum. Si uenter astrictus est soluedus est. Sed hæc facile ualidiores faciunt. si ibecillitas occupauit: per exercitatioem gestatio est. Si ne hæc quidem sustinet: adhibenda tamen frictio est. si hæc quoque uehemens onerat: intra quietem & unctionem & cibum sistendum est: dandaque opera est: nequa cruditas in quotidianam id malum uertat. Nam quartana neminem iugulat. sed si ex ea facta quotidiana est: in malis æger est. Quod tamen nisi culpa uel ægri uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. CAPVT. XVI.

**A**t si duæ quartanæ sunt: neque hæc / quas proposui / exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est: leuiter ambulare: considerare diligenter in



molitis pedibus & capite. Quotiens febris accessit & defuit: cibum modicum sumere & uinum. reliquo tempore nisi imbecillitas urget: abstinere. Aut si duæ febres pene iunguntur: post utranq; cibum sumere. Deinde uacuo tempore & moueri aliqd: & post unctionem cibo uti. Cum uero uetus quartana raro / nisi uere soluatur: utiq; eo tempore attendendum est: nequid fiat quod ualitudinem impediât. Prodestq; in uetere quartana mutare subinde uictus genus: a uino ad aquam: ab aqua ad uinum: a lenibus cibus ad acres: ab acris ad lenes transire: esse radicem: deinde uomere: iure ue pulli gallinacei uentrem resolvere: oleum ad frictiones ad iicere: calefacientia ante accessionem sorbere: uel aceti cyathos duos: uel unum sinapis cum tribus græci uini falsi: uel mixta paribus portionibus & in aqua diluta / piper: castoreum: laser: myrram. Per hæc enim similiaq; corpus agitandum est: ut moueatur ex eo statu / quo detinetur. Si febris quieuit diu meminisse eius diei conuenit: eoq; uitare frigus: calorem: cruditatem: lassitudinem. Facile enim reuertitur / nisi a sano quoque aliquandiu timetur.

Curatio quotidianæ febris. quæ ex quartana facta sit.

## CAPVT. XVII

**A**t si ex quartana quotidiana facta est: cum id uitio inciderit: per biduum abstinere oportet: frictione uti: aqua tantum modo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris accedat. sed siue fuit / siue non fuit: cibus post accessionis tempus est dandus. at si manet: per biduum abstinentia: quanta maxime imperari corpori potest: fricatione quotidie: utendum est.

De tribus infantiæ generibus & primo de eius curatione: quæ a græcis phrenesis dicitur. CAPVT. XVIII.

**E**t febrium quidem ratio exposita est. Super sunt uero alii corporis affectus: qui huic superueniunt: ex quibus eos /



## TERTIVS

qui certis partibus assignari non possunt / protinus iungam .  
 Incipiam ab isania : primamq; huius ipsius partem aggrediar :  
 quæ & acuta & in febre est : græci phrenesin appellant . Illud an  
 te omnia scire oportet : interdum in accessione ægros desipere  
 & loqui aliena . Quod non quidem leue est : neq; incidere po  
 test / nisi in febre uehementi . non tamen æque pestiferum est .  
 Nam plerumq; breue esse consuevit : leuato que accessione im  
 petu protinus mens redit . Neque id genus morbi remedium a  
 liud desiderat : quam quod incuranda febre præceptum est .  
 Phrenesis uero tum demum est : cum continua dementia esse  
 incipit . aut cum æger quanuis adhuc sapiat : tamen quasdã ua  
 nas imagines accipit . perfecta est ubi mens illis imaginibus  
 addicta est . Eius autem plura genera sunt . siquidem ex phre  
 neticis alii hilares : alii tristes sunt . alii facilius continentur &  
 intra uerba desipiunt . alii cõsurgunt & uiolenter quædam ma  
 nu faciunt . atq; ex his ipsis alii nihil nisi impetu peccant . alii  
 etiam artes adhibent : summam que speciem sanitatis incap  
 tandis maiorum operum occasionibus præbent : sed exitu de  
 prehendantur . Ex his autem eos qui intra uerba desipiunt : aut  
 leuiter etiam manu peccant : onerare asperioribus coercitioni  
 bus superuacuum est . Eos uero qui uiolentius se gerunt uinci  
 re conuenit : ne uel alteri uel sibi noceant . Neque credendum  
 est si uinctus aliquis dum leuari uinculis cupit : sanum iam se  
 fingat : quanuis prudenter & miserabiliter loquatur : quoniã  
 is dolus insanientis est . Fere uero antiqui tales ægros in tene  
 bris habebant : eo quod eis contrarium esset exterreri : & ad  
 quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant .  
 At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus in lumine  
 habendos esse dixit . neutrum tamen perpetuum est . alium enĩ  
 lux . alium tenebræ magis turbant . reperiunturq; in quibus nul  
 lum discrimen deprehendi uel hoc uel illo modo possit . opti  
 mum itaq; est utrumq; experiri : & habere eum / qui tenebras  
 horret / in luce : eum / qui lucem / in tenebris . At ubi nullum tale  
 discrimen est : æger si uires habet / loco lucido : si non habet /



obscurus continendus est. Remedia uero adhibere ubi maxime furor urget / supernacuum est. simul enim febris quoque increscit. Itaque tum nihil nisi continendus æger est. Vbi uero res patitur / festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti ac si trucidentur: rationem hanc secutus: quod neque insania esset nisi febre intenta: neque sanguis nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit: cum & intentio febris somnum impediatur: & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaque hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt alias omittenda. Et continuata quoque febris habet tempora: quibus & si non remittit: non tamen crescit. Est quod hoc ut non optimum: sic tamen secundum remedii tempus. Quod si uires ægri patiuntur: sanguis quoque mitti debet. Nec minus deliberari potest / an alius ducenda sit. tum interposito die conuenit caput adcutem tondere: deinde aqua fouere in qua uerbenæ aliquæ decoctæ sint uel ex reprimentibus: aut prius fouere deinde tondere & iterum fouere: ac nouissime rosa caput naresque implere: offerre etiam naribus rutam: ex aceto contritam: mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen faciendæ sunt in iis / quibus uires non desunt. Si uero imbecillitas est: rosa tantum caput adiecto serpillio / similique aliquo made faciendum est. Vtiles etiam in quibuscunque uiribus herbarum dux sunt: solanum & muralis. simul ex utraque succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit frictione utendum est. parcius tamen in iis qui nimis hilares / quam in iis qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim uani metus leuandi sunt: sicut in homine prædiuite famem timente incidit: cui subinde falsæ hereditates nuntiabantur. quorundam audacia coercenda est: sicut in iis fit: in quibus contumacis plagæ quoque adhibentur. quorundam etiam intempestius risus & obiurgatione & minis prohibendus est. quo



rundam discutiendæ tristes cogitationes. Ad quod symphoniæ & cymbala / strepitusq; proficiunt. Sæpius tamen assentientum / quam repugnandum est. paulatimq; & non euidenter ab iis / quæ stulte dicuntur ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio: ut fit in hominibus studiosis litterarum: quibus liber legitur: aut recte / si delectantur: aut per peram / si id ipsum eos offendit. Emendando enim conuertere animum incipiunt. Quin etiam recitare si qua meminerunt / cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxerunt ii / qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus uero sic affectis somnus & difficilis & præcipue necessarius est. Sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id atq; etiam ad mentem ipsam componendam crocinum uinguentum cum irino in caput datum. Si nihilo minus uigilant ii: quidam somnum moluntur potui dando aquam: in qua papauer / aut hyoscyamos decocta sit. alii mandragoræ mala putuino subiiciunt. alii uel amomum: uel sicamini lacrimam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum greci morum sicamynon appellant: mori nulla lacrima est. sic uero significatur lacrima arboris in ægypto nascentis: quam ibi morosicon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus: ex ea aqua subinde spongia os & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit: quoniam in lethargum sæpe conuerteret. Præcipit autem ut primo die a cibo: potione: somno abstinere tur: uespere ei daretur potui aqua: tunc frictio admoueretur lenis ita ut ne manum quidem qui fricaret: uehementer imprimeret: postero deinde die hisdem omnibus factis uespere ei daretur sorbitio & aqua: rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos: ut somnus accedat. Id interdum fit & quidem adeo: ut illo confitente nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit: tum demum illis medicamentis accersendus est: habita scilicet eadem moderatione: quæ hic quoq; necessaria est: ne quem ob dormire uolumus / excitare postea non possimus. Confert et:



am aliquid ad sonum filanus iuxta cadens: uel gestatio post cibum & noctu: maximeq; suspensi lecti motus. Neque alienū est: si neque sanguis ante missus est: neque mens constat: neque somnus accedit: occipitio inciso cucurbitulam ad mouere. Quae quia leuat morbum: potest etiā somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda est. Nam neque implendus aeger est: ne infaniet. neque ieiunio utique uexandus est: ne imbecillitate in car diacum incidat. Opus est autem cibo infirmo: maxime que sorbitione: potionem aquae mulsae. cuius ternos cyathos bis hyeme / quater aestate dedisse satis est. Alterum genus insaniae est: quod spatium longius recipit: quia fere sine febre incipit: leues deinde febriculas excitat & conficit in tristitia: quam uidetur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Siquid hanc prohibet: prima est abstinentia: secunda per album ueratrum / uomitum que purgatio. post utrunlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis ualeat: frequens etiam exercitatio. In ieiunio uomitus: cibus sine uino dandus ex media materia est. Quam quotiens posuero: scire licet etiam ex infirmissima dari posse: dum ne ea sola quis utatur: ualentissima tantummodo esse remouenda. praeter haec seruanda aliud est q̄ tenerrima. remouendi terrores: & potius bona spes afferenda. querenda delectatio ex fabulis ludisq; quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera & ante oculos eius ponenda. Leuiter ob iurganda uana tristitia. Subinde admonendus iis ipsis rebus: quae sollicitant: cur non potius letitiae / q̄ sollicitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit: sicut aliae febres curanda est. Tertium insaniae genus est ex his longissimum adeo ut uitam ipsam non impediat. quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duae sunt. Nam quidam imaginibus / non mente falluntur. qualem insanientem Aiacem uel Orestem poetarum fabulae ferunt. quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt: ante omnia uidendum est / tristes: an hilares sint. In tristitia nigrum ueratrum deiectionis causa: in hilaritate



album aduomitum excitandum dari debet. Idem si in potionem non accepit. pani adiciendum est / quo facilius fallat. Nam si bene se purgauerit: ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum ueratrum parum profecerit: interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet. leuiorem esse morbum cum risu / quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis: ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est: uentrem eius ante soluendum esse: ubi a superiore: comprimendum. Si uero consilium insanientem fallit: tormentis quibusdam optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit aut fecit: fame: uinculis: plagis coercendus est. Cogendus est & attendere & ediscere aliquid & meminisse. Sic enim fiet ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subito etiam terri & expauescere in hoc morbo prodest. Et fere quicquid animi uehementer perturbat. Potest enim quaedam fieri mutatio: cum ab eo statu mens in quo fuerat / abducta est. Interest etiam si ipse sine causa subinde rideat / an mestus dimissusque sit. nam demens hilaritas terroribus suis / de quibus supra dixi / melius curatur. Si nimia tristitia est: prodest lenis sed multa bis die frictio. Item per caput aqua frigida infusa: demissumque corpus in aquam & oleum. Illa communia sunt: insanientes uehementer exerceri debere. multa frictione uti. neque pinguem carnem: neque uinum assumere. cibis uti post purgationem ex media materia quam leuissimis. non oportere esse uel solos uel inter ignotos: uel inter eos quos / aut contemnant / aut neglegant. mutare debere regiones: & si mens redit / annua peregrinatione esse iactandos. Raro / sed aliquando tamen / ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie simili que uictus genere curandum est: praeterquam quod in hoc insanientium genere solo / recte uinum datur.

## CARDIACI MORBI CVRATIO. CAPVT. XIX.

**H**ic morbo praecipue contrarium est id genus: quod car



## TERTIVS

paulum sanguinis mittere: occipitium incidere & cucurbitulas admoovere: ferro candente in occipitio quoque & infra qua summa uertebra cum capite committitur adurere duobus locis: ut per ea perniciosus humor euadat. Quibus si finitum malum non fuerit: prope est/ut perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo utendum erit exercitatione multa frictione: cibisque his/qui supra comprehensi sunt. praecipueque uitanda omnia: quae ne fierent: excepimus.

DE regii morbi curatione.

### CAPVT XXIII

**A**EQ notus est morbus: quem interdum arquatum: interdum regium nominant. Quem Hippocrates ait: si post septimum diem febricitante aegro superuenit: tutum esse/mollibus tantummodo praecordiis substantibus. Diocles ex toto si post febrem oritur etiam prodesse. si post hunc febris/occidere. Color autem eum morbum detegit maxime oculorum: in quibus quod album esse debet fit luteum. Soletque accedere & sitis & dolor capitis & frequens singultus & praecordiorum dextra parte durities: & ubi corporis uehemens motus est spiritus difficultas/membrorumque resolutio. atque ubi diutius manet morbus/ totum corpus cum pallore quodam insalubescit. Primo die abstinere aegrum oportet: secundo ducere aluum: tum si febris est/eam uictus genere discutere. Si non est/scamoneam potui dare: uel cum aqua betam albam contritam: uel cum aqua mulsam nucas amaras: absinthium: anesum/ sic ut pars huius minima sit. Aesclepiades aquam quoque salcam & quidem per biduum purgationis causa bibere cogebat/ iis quae urinam mouent/reiectis. Quidam superioribus omissis: per haec & per eos cibos/ qui extenuant: idem se consequi dicunt. Ego ubique si satis uirium est/ ualidiora: si parum/ imbecilliora auxilia praefero. Si purgatio fuit: post eam triduo: primo modice cibum oportere assumere ex media materia & uinum bibere graecum salsum: ut resolutio uentris maneat. tum altero triduo ualidiores cibos & carnis quoque aliquid esse: itra aquam manere.

l.i.



deinde ad superius genus uictus reuerti: cum eo ut magis satietur omisso græco uino bibere integrum austerum. atq; ita per hæc uariare: ut interdum acres quoq; cibos interponat: interdum ad salsum uinum redeat. Per omne uero tempus utendum est exercitatione: frictione: si hyems est. balneo: si æstas: frigidis natationibus: lecto etiam & conclauis cultiore clauso loco uti ludis/lasciuiis: per quae mens exilaretur. Ob quae regius morbus dictus uidetur. Malagma quoq; quod digerat super præcordia datum pdest: uel arida ibi ficus iposita: si iecur aut lienis affectus est.

DE Elephantia. curatione

CAPVT. XXV

*plinius lib. xxvi Cap. primo  
de nouis morbis et maximis  
morbis: qm morbu gallicu mo  
por qst arbirare: et ubi loq  
d licet.*

**I**gnotus autem pene in italia / frequentissimus i quibusdā regionibus is morbus est: quem elephantiam græci uocāt. isq; longis annumeratur. Totum corpus afficitur ita ut ossa quoq; uitiari dicantur. Summa pars corporis crebas maculas / crebosq; tumores habet. Rubor harū paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæqualiter crassa: tenuis: dura: mollisq; quasi squamis quibusdam exasperatur: corpus emacrescit: os: suræ: pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est: digiti in manibus pedibusq; sub tumore conduntur: febricula oritur: quae facile tot malis obrutum hominem consumit. proptinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet: aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tum quanta sustineri potest inedia est. paulum deinde uires reficiendæ: & ducenda aluus. post hæc / ubi corpus leuatum est: utendum est exercitatione / præcipueq; cursu. sudor primum labore ipsius corporis: deinde etiam siccis sudationibus euocandus. frictio adhibenda. moderandumq; inter hæc / ut uires conseruentur. balneum rarum esse debet. Cibus sine pinguibus / sine glutinosis / sine inflantibus. Vinum / præterq; primis diebus: recte datur. Corpus contrita plantago & illita optime tueri uidetur.

DE attonitis & eorum curatione. CAPVT. XXVI.



**A** Ttonitos quoque raro uidemus. quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis: interdum morbo. apoplexian hunc graeci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo/uel alui ductione utendum. Tum adhibenda frictions: & ex media materia minime pingues cibi. quidam etiam acres: & a uino abstinendum.

DE RESOLVTIONE neruorum: quae apoplefia uel paralysis dicitur. CAPVT. XXVII.

**A** Resolutio neruorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora: interdum partes infestat. Veteres auctores illud apoplexian: hoc paralyfin nominauerunt. Nunc utrunque paralyfin appellari uideo. Solent autem qui per omnia membra uehementer resoluti sunt celeriter rapi. ac si correcti non sunt: diutius quidem uiuunt: sed raro tamen ad sanitatem perueniunt: & plerumque miserum spiritum trahunt / memoria quoque amissa. In partibus uero nunquam acutus: saepe longus / fere sanabilis morbus est. Si omnia membra uehementer resoluta sunt: sanguinis detractio uel occidit / uel liberat. Aliud curationis genus uix unquam sanitatem restituit: saepe mortem tantum differt: uitam interim infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus & mens: nihil spei superest. Si rediit: sanitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta est: prouidet malo corporis / uel sanguis missus / uel alius ducta. Caetera eadem in utroque casu facienda sunt. Siquidem uitare praecipue conuenit frigus: paulatim que ad exercitationes reuertendum est: sic ut ingrediatur ipse protinus / si potest. Si id erurum imbecillitas prohibet: uel gestetur / uel motu lecti concutiatur. cum id membrum quod deficiet si potest / per se: si minus / per alium moueatur: & ui quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse / uel urticis caesam / uel imposito sinapi: sic ut ubi rubere coepit corpus / haec remoueat. Scylla quoque contrita



bulbiq; contriti cum ture recte imponuntur. Neq; alienum est resina cutem tertio quoq; die diutius uellere. pluribus etiam locis aliquando sine ferro cucurbitulas admouere. Vnctioni uero aptissimum est uetus oleum / uel nitrum aceto & oleo mixtum. Quin etiam fouere aqua calida marina. uel si ea nō est tamen falsa / magnopere necessarium est. At si quo loco uel naturales uel etiam manu facte tales natationes sunt: iis potissimum utendum est: præcipue quæ in iis agitanda membra / quæ maxime deficiunt. Si id non est: balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia: maxime q̄ ex uenatione. portio sine uino aquæ calidæ. Si tamen uetus morbus est: interponi quarto uel quinto die purgationis causa uinum græcum salsum prodest. Post coenā utilis uomitus ē. Interdū uero etiam neruorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet uomere: non medicamentis urinam mouere: non sine exercitatione sudores: ut quidam præcipiunt: expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est. Deinde retento spiritu ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ. balneo raro utendum. mutandum subinde peregrinationibus exilum. Si dolor est: ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est: deinde inuoluenda / & subiicienda pruna lenis & sulphur. atq; ita id suffumigandum: idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiuno cum bene iam cōcoxerit cucurbitulæ quoq; sæpe dolenti parti admouendæ sunt: pulsandus q̄ leuiter inflatis uescis bubulis is locus est. Vtile est etiam seuum miscere cum hyoscyami & urticæ contritis seminibus. sic ut omnium par modus sit: idq; imponere: fouere aqua / in qua sulphur decoctum sit. Vtricoli quoq; recte imponuntur aqua calida repleti: aut bitumem cum hordeacea farina mixtum. atque in ipso potissimum dolore utendum gestatione uehementi est. Quod in aliis doloribus pessimum est. Tremor autem neruorum aequè uomitu medicamentis quæ urinam mouentibus intenditur. Inimica etiam habet balnea: assas quæ sudationes. bibenda aqua est. acti ambulatione utendum.



item unctionibus / frictionibusque maxime per se ipsum. pila /  
similibus que superiores partes dimouendae. cibo quolibet ut  
rendum dummodo concoctioni utique studeatur. Secundum  
cibum curis abstinendum. Rarissima uenere utendum est. Si  
quando quis in eam prolapsus est: tum oleo leuiter diu que in  
lectulo perfricari manibus puerilibus potius quam uirilibus  
debet. Suppurationes autem quae in aliqua interiori parte ori  
untur: ubi notae fuerint: primum id agere oportet per ea cata  
plasmata quae reprimunt: ne coitus inutilis materiae fiat. De  
inde si haec uicta sunt: per ea malagmata quae digerunt: dissi  
pentur. Quod si consecuti non sumus: sequitur / ut euocetur:  
deinde ut maturescat: omnis tunc uomicae finis est / ut rumpatur.  
Inditium quae est: pus uel aluo uel ore redditum. sed ni  
hil facere oportet quo minus quicquid est puris excedat. Ut  
dum maxime sorbitionibus est & aqua calida. Vbi pus ferri  
desiit: transendum ad faciles quidem: sed tamen ualidiores  
& frigidos cibos: frigidam quae aquam / sic ut ab egelidis ta  
men initium fiat. primoque cum melle quaedam edenda: ut nuclei  
pinei uel graecae nuges / uel auellanae. Postea submouendum id  
ipsum / quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum  
eo tempore ulceri est / succus assumptus uel porri uel marrubii  
& omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti  
in iis partibus quae non afficientur / frictionibus: item ambu  
lationibus lenibus. Vitandum quae erit ne uel luctando uel cur  
rendo uel alia ratione sanescientia ulcera exasperentur. In hoc  
enim morbo perniciosus: ideo quae omnimodo cauendus san  
guinis uomitus est.

.l.iii.



CORNELII CELSI QVARTVS DE MEDICI-  
NA LIBER INCIPIT.DE HVMANI CORPORIS INTERIORIBVS  
SEDIBVS . CAPVT . PRIMVM .

**H**actenus reperiuntur ea genera morborum :  
quæ in totis corporibus ita sunt : ut iis certæ  
sedes assignari non possint . Nunc de iis di-  
cam : quæ sunt in partibus . Facilius autem  
omnium interiorum morbi curationes que  
in notitiam uenient : si prius eorū sedes bre-  
uiter ostendero . Caput igitur / ea quæ : quæ in ore sunt : non lin-  
gua tantummodo palatoque terminantur : sed etiam quatenus o-  
culis nostris exposita sunt . In dextra sinistraque circa guttur  
uenæ grandes : quæ sphragitides nominantur : itemque arteriæ :  
quas parotidas uocant : sursum procedentes ultra aures ferun-  
tur . Atque in ipsis cervicibus glandulæ positæ sunt : quæ inter-  
dum cum dolore intumescunt . Deinde duo itinera incipiunt .  
Alterum asperam arteriam nominant . alterum stomachum .  
Arteria exterior ad pulmonem . Stomachus interior ad uentri-  
culum fertur . Illa spiritum . hic cibum recipit . quibus cum di-  
uersæ uia sint : qua coeunt exigua in arteria sub ipsis fauci-  
bus lingua est : quæ cum spiramus : atcollitur : cum cibum potio-  
nem que assumimus : arteriam claudit . Ipsa autem arteria dura  
& cartilaginosa in gutture assurgit : cæteris partibus residet .  
Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem ea-  
rum uertebraarum : quæ in spina sunt . Ita tamen ut ex parte ex-  
teriore aspera ex interiore stomachi modo leuis sit . ea que  
descendens ad præcordia cum pulmone committitur . Is spon-  
giosus : ideo que spiritus capax & a tergo spinæ ipsi iunctus  
in duas fibras ungulæ bubulæ modo diuiditur . Huic cor a ne-  
xum est natura musculosum in pectore sub sinisteriore mam-



ma ficum . duos que quasi uentriculos habet. ac sub corde ac  
que pulmone transuersum ex ualida membrana septum est :  
quod a præcordiis uterum diducit æque neruosum . Multis eti  
am uenis per id discurrentibus a superiore parte non solum  
intestina : sed iecur quoque lienem que discernit. Haec uiscera  
proxima : sed infra tamen posita dextra sinistra que sunt. Ie  
cur a dextra parte sub præcordiis ab ipso septo ortum intrin  
secus cauum : extrinsecus gibbum. quod prominens leuiter ue  
triculo insidet & in quattuor fibras diuiditur . Ex inferiore  
uero parte fel inhaeret. ac lienis sinistra non eidem septo : sed  
intestino innexus est : natura mollis & rarus longitudinis cras  
situdinis que modicae : is que paulum a costarum regione in u  
terum excedens ex maxima parte sub his conditur. atque hæc  
quidem iuncta sunt . Renes uero diuersi : qui lumbis sub  
imis / coxis inhaerent a parte earum resimi : ab altera rotun  
di. qui & uenosi sunt : & uentriculos habent : & tunicis super  
conteguntur. ac uiscerum quidem hæc sedes sunt . Stomachus  
uero qui intestinorum principium est neruosus a septimæ spi  
næ uertebra incipit : ac circa præcordia cum uentriculo com  
mittitur . Venterculus autem qui receptaculum cibi est : con  
stat ex duobus tergoribus. is que inter lienem & iecur positus  
est : utroque ex his paulum super eum ingrediente. Suntq; eti  
am membranulæ tenues / per quas inter se tria ista connectun  
tur : iunguntur que ei septo : quod transuersum esse supraposui .  
Inde ima uentriculi pars paulum in dexterio rem partem con  
uersa in summum intestinum coartatur. Hanc iuncturam py  
luron græci uocant. quoniam portæ modo in inferiores par  
tes ea quæ excreturi sumus : emittit. Ab ea ieunum intestinum  
incipit non ita implicitum. cui tale uocabulum est : quia nunq̃  
quod accipit continet : sed protinus in inferiores partes trans  
mittit. Inde tenuius intestinum est in sinus uehementer impli  
citum . Orbis uero eius per membranulas singuli cum inferio  
ribus connectuntur. qui in dexterio rem partem conuersi & e  
regione dexterio ris coxæ finiti : superiores tamen partes ma



gis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero trās  
uerso committitur. quod a dextra parte incipiens/insinisterio  
rem peruium & longum est: indexterio rem non est. ideoq; cae  
cum nominatur. At id quod peruium est late fusum atq; sinua  
tum: minusq; quam superiora intestina neruosum: ab utraque  
parte huc atq; illuc uolutum: magis tamen sinisteriores/ infe  
rioresq; partes tenens/contingit iecur atq; uentriculum. De in  
de cum quibusdam membranulis a sinistro rene uenientibus  
iungitur. atque hinc dextra recuruatum in imo derigitur qua  
externit. ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur. Conte  
git uero uniuersa haec omentum ex interiore parte laeue &  
strictum: ex superiore mollius. Cui adeps quoq; innascitur:  
quae sensu sicut cerebrum quoq; & medulla caret. At a reni  
bus singulae uenae colore albae ad uesicam feruntur: ureteras  
græci uocant: quod per eas inde descendente urinam in uesi  
cam destillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu neruosa  
& duplex ceruice plena atq; carnosae iungitur per uenas cum  
intestino/ eo que osse: quod pubi subest. Ipsa soluta atque li  
berior est aliter in uiris atq; in foeminis posita. Nam in ui  
ris iuxta rectum intestinum est potius in sinistram partem  
inclinata. In foeminis super genitale earum posita est: supra  
que elapsa ab ipsa uulua sustinetur. Tum in masculis iter uri  
nae spaciosus & compressius a ceruice huius descendit ad colē.  
In foeminis breuius & plenius super uuluae ceruicem se osten  
dit. Vulua autem ī uirginibus quidem admodum exigua est.  
In mulieribus uero nisi ubi grauidae sunt non multo maior, q̄  
ut manu cōprehendatur. Ea recta continuataq; ceruice: quem  
canalem uocant: contra mediam aluum orsa: inde paulum ad  
dexterio rem coxam conuertitur: deinde super rectum intesti  
num progressa iliis femine latera sua innectit. Ipsa autem  
ilia inter coxas & pubem imo uentre posita sunt. a quibus ac  
pube abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit: abexter  
iore parte euidenti cute: ab interiori laeui membrana inclusum/  
quae omento iungitur. Peritonos autem a græcis nominatur.



DE curationibus morborum qui nascuntur a capite: & primo de eius dolore: deinde de morbo qui circa faciem nascitur: tum de linguae resolutione. postremo de destillatione ac grauedine.

CAPVT. SECVNDVM.

**H**is ueluti in conspectum quendam quatenus scire curanti necessarium est adductis: remedia singularum laborantium partium exequar: orsus a capite. Sub quo nomine nunc significo eam partem / quæ capillo tegitur. Nam oculorum: aurium: dentium dolor: & si quis similis est: alias erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est: quem cephalean græci uocant. Cuius notæ sunt: horior calidus: neruorum resolutio: oculorum caligo: mentis alienatio: uomitus / sic ut uox supprimatur: uel sanguinis ex naribus cursus / sic ut corpus frigescat: anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maxime circa tempora uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas: sed neq; grauis neq; periculosa / p hominis ætatem est. Interdum grauior dolor sed breuis neq; tamen mortiferus: qui uel uino uel cruditate uel frigore uel igne aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores modo in febre: modo sine hac sunt: modo in toto capite: modo in parte. interdum sic ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc etiam inuenitur genus quod potest longum esse. ubi humor cutem inflat eaq; intumescit & prementi digito cedit. hydrocephalon græci appellant. Ex his id quod secundo loco positum est: dum læue est: qua sit ratione curandum dixi / cum persequeretur ea quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ uero auxilia sūt capitis / ubi cum febre dolor est: eo loco explicitum est: quo febrium curatio exposita est. Nunc de cæteris dicendum est. Ex quibus id quod acutum est: & id quod supra consuetudinem intenditur idq; quod ex subita causa / & si non pestiferum tamen uehemens est: primam curationem habet: qua sanguis mittatur. Sed id / nisi intolerabilis est dolor / superuacuum est. Satiuscq;



est astringere a cibo: si fieri potest etiam a potione. Si non potest/aquam bibere. Si postremo die dolor remanet: aluum ducere: sternutamenta euocare: nihil assumere/nisi aquam. saepe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit utique si ex vino uel cruditate origo est. si uero in his auxilii parum est: tonderi oportet ad cutem. deinde considerandum est quae causa dolorem excitarit. si calor: aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongiam concavam imponere subinde in aqua frigida expressam: ungere rosa & aceto: uel potius his tinctam lanam lucidam imponere: alia quae refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit: caput oportet perfundere aqua calida marina: uel certe salsa: aut in qua laurus decocta sit tum caput uehementer perfricare: deinde calido oleo implere/ueste uelare. Quidam etiam id deuinciunt. Alii cervicalibus uestimentisq; onerant: & sic leuantur. alios calida cataplasmata adiungunt. Ergo etiam ubi causa incognita est: uidere oportet refrigerantia magis an calefacientia leniant: & iis uti/quae experimentum approbarit. At si parum causa discernitur: perfundere caput / primum aqua calida sicut supra praeceptum est uel salsa uel ex lauro decocta. tum frigida pusca. Illa in omni uetusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare: inferiores partes uehementer perfricare: gargarizare iis quae saliuam mouent: cucurbitulas temporibus & occipitio ad mouere: sanguinem ex naribus detrahare: resina subinde tempora peruellere: & imposito sinapi exulcerare ea quae male habent ante linteolo subiecto/ne uehementer arroat: candentibus ferramentis ubi dolor est ulcera excitare: cibum per modicum cum aqua sumere: ubi leuatus est dolor in balneum ire: ibi multa aqua prius calida / deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est etiam ad uinum reuerti: sed postea semper anteq̃ quicq̃ aliud aquam bibere. Dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est. Deinde imponere sinapi sic ut exulceret. Si id parum proficit: scalpello utendum ē.



Illa cum hydropicis communia sunt: ut exerceatur: insudet: uehementer perfricetur: cibus potionibus que utatur uinam præcipue mouentibus.

DE MORBO qui circa faciem nascitur quem græci cynicum spasmus uocant.

**C**irca faciem uero morbus innascitur: quem græci cynicos spasmos nominant. Is cum acuta fere febre oritur. Os cū motu quodam peruertitur. ideoque nihil aliud est quā distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio. Somnus in promptu est. In hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est: ducere aluum. si ne sic quidem discussum est: albo ueratro uomitum mouere. præter hæc necessarium est uirare solem: lassitudinem: uinum. si discussū id non est: utendum est cursu: frictione in eo quod læsum est leui & multa in reliquis partibus breuiore: sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta: caput radere: idque perfundere aqua calida uel marina uel certe salsa: sic ut ei quoque sulphur adiiciatur. post perfusionem: iterum perfricari: sinapi manducare: eodem que tempore affectis oris partibus caeratum: integris idem sinapi donec arroat imponere. Cibus apertissimus ex media materia est.

DE RESOLUTIONE LINGVAE.

**A**t si lingua resoluta est: quod interdum per se: interdum ex morbo aliquo fit sic ut sermo hominis non explicetur oportet gargarizare ex aqua: in qua uel thimum uel hyssopum uel nepeta decocta sit: aquam bibere: caput & os & ea quæ sub mento sunt & ceruicem uehementer perfricare: lasere linguam ipsam linire: manducare quæ sunt acerrima: idest sinapi. alli um cepam: magna ui. luctari ut uerba exprimantur: exerceri retento spiritu: caput sæpe aqua frigida perfundere: non nun



quam multam esse radiculam; deinde uomere.

DE DESTILLATIONE AC GRAVEDINE.

**D**estillat autem humor ex capite interdum in nares: quod  
lene est. interdum in fauces: quod peius est. interdum  
etiam in pulmonem quod pessimum est. Si in nares destillat:  
tenuis per has pituita profluit: caput leniter dolet: grauitas e  
ius sentitur: frequentia sternotamenta sunt. Si in fauces: has  
exasperat: tussiculam mouet. si in pulmonem: præter sternuta  
menta & tussim: est etiam capitis grauitas: lassitudo: sitis: æ  
stus: biliosa urina. Aliud autem quamuis non multum distans  
malum grauedo est. Hæc nares claudit: uocem obtundit: tuf  
sim siccam mouet. sub eadem falsa est saliuæ: sonant aures:  
uenæ mouentur in capite: turbida urina est. Hæc omnia cory  
zas Hippocrates nominat. Nunc uideo apud græcos in graue  
dine hoc nomen seruari: destillationem catastagnos appella  
ri. Hæc autem & breuia: & si neglecta sunt / longa esse consue  
runt. Nihil pestiferum est / nisi quod pulmonem exulcerauit.  
Vbi aliquid eiusmodi sensimus: protinus abstinere a sole: bal  
neo, uino: uenere debemus. Inter quæ unctio & assuetio ci  
bo nihilominus uti licet. ambulatione tantum acri: sed recta u  
tendum est: & post eam caput atq; os supra quinquagies per  
fricandum. Raro que fit: ut si biduo / uel certe triduo nobis tē  
perauimus: id uitium non leuetur. Quo leuato: si in desti  
llatione / crassa facta pituita est: uel ingrauedine nares ma  
gis patent: balneo utendum est: multa que aqua prius calida:  
post egelida fouendum os / caputq; deinde cum cibo pleniore  
uinum bibendum. at si æque tenuis die quarto pituita est: uel  
nares æque clausæ uidentur: assumendum est uinum amineum  
austerrum: deinde rursus biduo aqua. post quæ ad balneum &  
ad consuetudinem reuertendum est. Neq; tamen illis ipsis die  
bus: quibus aliqua omittenda sunt: expedit tanquam ægros a  
gere. sed caetera omnia quasi sanis facienda sunt: præter q̄ si



diacum a græcis nominatur: quibus sæpe ad eum phrenetici tran-  
seunt. Siquidem mens in illis labat: in hoc constat. Id autem  
nihil aliud est quàm nimia imbecillitas corporis. quod stomacho  
languente immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire  
id esse: ubi uenarum exigui/imbecillique pulsus sunt. Sudor au-  
tem supra consuetudinem & modo & tempore ex toto thorace  
& ceruicibus atque etiam capite prorumpit: pedibus tantummo-  
do & cruribus siccioribus atque frigentibus. At ubi id morbi ge-  
nus est: curatio prima est: supra præcordia imponere quae re-  
primant cataplasmata. secunda, sudorem prohibere. Id præ-  
stat acerbum oleum uel rosa uel melinum aut myrteum. Quo-  
rum aliquo corpus leniter perungendum: caeratum quæ ex ali-  
quo horum tum imponendum est. Si sudor uincit: delinen-  
dus homo est uel gypso uel argenti spuma/uel cimolia creta:  
uel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat  
pulis ex contritis aridi myrti uel rubi foliis: aut ex aulteri &  
boni uini arida fece. Pluraque similia sunt: quæ si desunt, satis  
utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Super hæc uero quo-  
minus corpus insudet, leui ueste debet esse contextus loco non  
calido, fenestris patentibus sic/ut per flatus quoque aliquis acce-  
dat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis uino ciboque  
succurrere. Cibus non multus. quidem: sed sæpe tamen nocte  
ac die dandus est: ut nutriet neque oneret. Is esse debet ex infir-  
missima materia & stomacho aptus. Nisi autem necesse est:  
ad uinum festinare non oportet. Si uerendum est/ ne deficiat:  
tum & intrita ex hoc: ethoc ipsum austerum quidem sed tamen  
tenue meracum. Egelidum subinde & liberaliter dandum est ad-  
iecta polenta: si modo is æger parum cibi assumit. Idque uinum  
esse debet neque nullarum uirium/ neque ingentium. recte quæ tota  
die ac nocte uel tres heminas æger bibet. Si uastius corpus est:  
plus etiam. Si cibum non accipit: perunctum ante perfundere  
aqua frigida conuenit: & tum dare. Quod si stomachus  
resolutus parum continet: & ante cibum & post eum / sponte  
uomere oportet: rursus quæ post uomitum / cibum sumere.



Si ne id quidem manserit : sorbere uini cyathum : interposita  
 que hora sumere alterum . Si id quoque stomachus reddiderit :  
 totum corpus bulbis contritis super illinendum est . Qui ubi  
 inaruerunt : efficiunt : ut uinum in stomacho contineatur : ex quo  
 eo toti corpori calor : uenis quoque uis redeat . Vltimum auxilium  
 est : in aluum purgantem uel alicuius cremorem ex inferioribus par  
 tibus indere siquidem id quoque uires tuetur . Neque alienum est :  
 naribus quoque aestuantis ad mouere quod reficiat : id est rosam  
 & uinum . Et si qua in extremis partibus frigent : unctis & cali  
 dis manibus fouere . Per quae si consequi potuimus : ut & sudo  
 ris impetus minuatur & uita prorogetur : incipit iam tempus ip  
 sum esse praesidio . Vbi in tuto esse uidetur : uerendum tamen  
 est : ne ad eandem imbecillitatem cito recidat . Itaque uino tan  
 tum remoto / quotidie ualidiorem cibum debet assumere : do  
 nec satis uirium corpori redeat .

De lethargo & eius curatione .

CAPVT . XX .

**A**lter quoque morbus est aliter phrenetico contrarius . In  
 illo difficilis somnus : propterea ad omnem audaciam mens  
 est . At in hoc marcor & inexpugnabilis pene dormiendi ne  
 cessitas : lethargum graeci nominant . atque id quoque genus acu  
 tum est : & nisi succurritur celeriter iugulat . Hos aegros qui  
 dam subinde excitare nituntur ad motus iis / quae per iternua  
 menta euocantur : et iis / quae odore foedo mouent . qualis est  
 pix cruda : lana sucida : piper : ueratrum : castoreum : acetum :  
 allium : cepa : iuxta etiam galbanum incendunt : aut pilos .  
 aut cornu ceruinum . Si non est : quodlibet aliud . Haec enim  
 cum comburuntur : odorem foedum mouent . Tharrias uero  
 quidam accessionis esse id malum dixit : leuari que cum ea de  
 cessit . Itaque eos qui subinde excitant sine usu male habe  
 re . Interest autem in decessione expergiscatur aeger : an  
 cum febris non leuetur : aut leuata quoque ea somnus urgeat .  
 Nam si expergiscitur : adhibere ei ut sopito superuacuum est .



Neque enim uigilando melior fit, sed per se / si melior est: uigilat. Si uero continens ei somnus est: utique excitandus est. sed iis temporibus quibus febris leuissima est: ut & excernat aliquid & sumat. Excitat autem ualidissime / repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaque perunctum oleo multo corpus tribus aut quattuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur: si æqualis ægro spiritus erit: si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt: ea potiora / quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet: commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum: deinde postea fouendum est aqua: in qua laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum: aut ruta ex aceto contrita: aut lauri baccæ: aut hedera cum rosa & aceto. Præcipue que proficit & ad excitandum hominem naribus ad motum & ad morbum ipsum depellendum capiti fronti ue impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest: maximeque oportune cibus datus idest in remissione quanta maxime inueniri poterit. Aprissima autem sorbitio est donec morbus decrescere incipiat: sic ut si quotidie grauis accessio est: hæc quotidie detur. Si alternis: post grauiorem / sorbitio: post leuiorem / mulsa aqua. Vinum quoque cum tempestiuo cibo datum non mediocriter adiuuat. Quod si post longas febres eiusmodi corpori corpori accessit: caetera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem tribus / quattuor ue horis castoreum: si uenter astrictus est / mixtum cum scamonea. si non est / per se ipsum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt: cibus utendum est plenioribus. Si dura: in hisdem sorbitionibus subsistendum. imponendumque est præcordiis quod simul & reprimat & emolliat.

DE aqua inrer cutem hoc est hydropico morbo. Caput. XXI.

**S**ed hic quidem acutus est morbus. Locus uero fieri potest eorum: quos aqua iter cutem male habet: nisi primis diebus  
i. ii.



discussus est: hydropa graeci uocant. Atque eius tres species sunt. Nam modo uentre uehementer intento creber intus ex motu spiritus sonus est. Modo corpus inaequale est / tumoribus aliter: per quod per totum id orientibus. Modo intus in unum aqua contrahitur: & moto corpore ita mouetur ut impetus eius conspici possit. Primum tympanitem: secundum leucophlegmatian uel hypofarca: Tertium asciten graeci nominant. Communis tamen est humoris nimia abundantia. ob quam ne uulera quidem in his aegris facile sanescunt. Saepe uero hoc malum per se incipit. Saepe alteri uetusto morbo. maximeque quartanae superuenit. Facilius in seruis / quam in liberis tollitur. quia cum desideret famem: sitim: mille alia tedia: longamque patientiam / promptius iis succurritur / qui facile coguntur: quam quibus inutilis libertas est. Sed ne ii quidem qui sub alio sunt: si extoto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus Chryssippi discipulus apud Antigonom regem amicum quendam eius notae interpretantis mediocriter eo morbo implicitum negauit posse sanari. Cumque alter medicus epirotes philippus se sanaturum polliceretur: respondit illum ad morbum aegri respicere: se ad animum. Neque cum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo: sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata sua deuorando / bibendo que suam urinam in exitum se praecipitauit. Inter initia tamen non difficillima curatio est: si imperata sunt corpori: quies: sitis: inedia. At si malum inueterauerit: non sine magna molestia discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt cum hoc morbo tentaretur: neque aequo animo ferret necessariam sitim: ubi diu abstinerat / bibere solitum: deinde euomere. Quod si redditur quicquid receptum est: multum tedio demit. si a stomacho retentum est: morbum auget. Ideoque in quo libet tentandum non est. Sed si febris quoque est: haec in primis submouenda est per eas rationes: per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre aeger est: tum demum ad ea ueniendum est:



quæ ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque quæcunque species est: si non dum nimis occupauit: hisdem auxiliis opus est. Multum ambulandum, currendum aliquid est. superiores maxime partes sic perfricandæ: ut spiritum ipse contineat. euocandus est sudor non exercitatione tantummodo: sed etiam in harena calida / uel laconico / uel clibano / similibusque aliis: maximeque utiles naturales & siccæ sudationes sunt: quales super baias habemus in myrtetis. balneum atque omnis humor alienus est. Ieiuno recte cataputia dantur facta ex absinthii duabus: myrræ tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia: sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est / quæ ut uitam sustineat. optimaque est / quæ urinam mouet. Sed id ipsum tamen molliori cibo / quæ medicamento melius est. Si tamen res coget ex iis aliquid quæ id præstent: erit decoquendum: eaque aqua potui danda. Videtur autem hanc facultatem habere / iris: nardum: crocum: cinnamum: amomum: casia: myrra: balsamum: galbanum: ladanum: oenante: panace: cardamomum: hebenus: cupressi semen. uua timinia: quam staphidagrian græci nominant: abrotanum: rosæ folia: acorum: amaræ nuces: tragoriganum: storax: costum: iunci quadrati & rotundi semen. illud cypyron. ecia non hoc græci uocant. Quæ quotiens posuero: non quæ hic nascuntur: sed quæ inter aromata afferuntur: significabo. Primo tamen quæ leuissima ex his sunt: id est rosæ folia / uel nardi spica tentanda sunt. Vinum quoque utile est & austerum: sed quam te nuissimum. Commodum est etiam lino quotidie uentrem metiri: & qua comprehendit aluum / notam imponere. postero die uidere si plenius corpus sit: an extenuetur. Id enim / quod tenuatur / medicinam sentit. Neque alienum est metiri & portionem eius & urinam. Nam si plus humoris excernitur / quæ assumitur: ita demum secundæ ualitudinis spes est. Asclepiades in eo qui ex quartana in hydropa deciderat: se abstinentia bidui & frictione usum. tertio die iam & febre & aqua liberato cibum & uinum dedisse / memorie præstat. Hactenus communiter de omni specie dici potest.



Si uehementius malum est: diducenda ratio curandi est. Ergo si inflatio & ex ea dolor creber est: utilis quotidianus; aut alterno quoque die post cibum uomitus est. Fomentis siccis; calidis que utendum est. Si per hæc dolor non finitur: necessariae sunt sine ferro cucurbitulae. Si ne per has quidem tormentum tollitur: incidenda cutis est: & cum his utendum. Vltimum auxilium est: si cucurbitulae nihil profuerunt: per alium infundere copiose aquam calidam: eamque recipere. Quin etiam quotidie ter quater ne opus est uti frictione uehementi cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione a uentre abstinendum est. Imponendum uero in eum crebrius; sinapi donec cutem erodat: ferramentisque candentibus pluribus locis uenter exulcerandus est: & seruanda ulcera diutius. Vtiliter etiam scylla cocta delinitur cutis: sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus inflantibus. At si id uitium est: cui leucophlegmatia nomen est: eas partes quae tument: subiicere soli oportet: sed non nimium: ne febricula incidat. si is uehementior est: caput uelandum est: utendumque frictione madefactis: tantum manibus aqua: cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum sic: ut aut pueriles aut muliebres manus adhibeantur: quo mollior earum tactus sit. Idque si uires patiuntur ante meridiem tota hora: post meridiem semi hora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata quae reprimunt: maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quatuor fere digitis ex parte interiore: qua per aliquot dies frequens humor feratur. atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque ubi inductae uulneribus cicatrices sunt: adiiciendum & exercitationibus est & cibis donec corpus ad pristinum habitum reuertatur. Cibus ualens esse debet & glutinosus: maximeque caro. Vinum; si per stomachum licet: dulcius. Sed ita ut inuicem bi duo; triduo uel: modo aqua: modo id bibatur. Prodest etiam lactuca marinae: quae grandis iuxta mare nascitur: semem cum aqua potui datum. Si ualens est qui id accipit: ei scylla cocta



sicut supra dixi: delinitur. Auctoresq; multi sunt / inflatis uescicis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est: quo in uterum multa aqua contrahitur: ambulare / sed magis modice oportet. malagma quod digerat impositum habere: idq; ipsum super imposito triplici panno fascia non nimium tamen uehementer altringere. Quod a Tharria profectum / seruatum esse a pluribus uideo. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est: ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia uenter non siccatur: sed humor nihilo minus abundat: celeriore uia succurrere: ut is per uentrem ipsum emittatur. Neq; ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi uiam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoq; ita illum esse sanandum: frustra q; aquam emitti: quae uitiato illo subinde nascatur. Sed primum non huius uisceris unius hoc uitium est. Nam splene affecto & in totius corporis malo habitu fit: deinde ut inde caeperit: tamen aqua nisi emittitur quae contra naturam ibi subsistit: & iocineri & ceteris inferioribus partibus nocet. Cōuenitq; corpus nihilo minus esse curandū. Neq; enim sanat emissus humor: sed medicinae locum facit: quam intrus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controuersiam uenit: quin non omnes in hoc morbo sic curari possint: sed iuuenes robusti: qui uel ex toto carent febre: uel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est: qui uel ex atra bile huc deciderunt: qui quae malum corporis habitum habent: idonei huic curationi nō sunt. Cibus autem quo die primum humor emissus est: superuacuus est: nisi si uires defunt. Insequentibus diebus & his uinum meracius quidem: sed non ita multum / dari debet: paulatimq; euocandus aeger est ad exercitationes: frictiones: solem: sudationes: navigationes & idoneos cibos donec ex toto conualescat. Balneum rarum res amat: frequentiore in ieiunio uomitum. Si aestas est: in mare natare commodum est. Vbi conualuit aliquis / diu tamen alienus ei ueneris usus est.



## DE tabe &amp; eius speciebus &amp; curationibus . CAPVT . XXII .

**D**utius sæpe & periculosius tabes eos male habet: quos inuasit. Atq; huius quoq; plures species sunt. Vna est qua corpus non alitur: & naturaliter semper aliquibus decedētibus: nullis uero in eorum locum subeuntibus / iumma macies oritur: & nisi occurratur: tollit. Acrophyan hanc græci uocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit. Aut enim nimio timere aliquis minus: aut auaritia nimia plusq; debet: assumit. ita uel quod deest: infirmat. uel quod superat: corrumpitur. Altera species est: quam græci cacexian appellant: ubi malus corporis habitus est. ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. Quod fere fit / cum longo morbo uitiata corpora / etiam si illo uacāt: refectiōem tamen non accipiunt. aut cum malis medicamentis corpus affectum ē. aut cum diu necessaria defuerunt. aut cum in uisatos & inutiles cibos aliquis assumpsit: aliq̄due simile incidit. Huic præter tabē illud quoq; nō nunq̄ accidere solet: ut per assiduas pustulas aut ulcera summa cutis exasperetur: uel aliquæ corporis partes itumescant. Tertia est / longeq; periculosissima species / quam græci phthisin nominauerunt. Oritur fere a capite. inde in pulmonem destillat. huic exulceratio accedit. ex hac febricula leuis fit: quæ etiam cum quieuit tamen & repetit. Frequens tussis est. pus excreatur. interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est: si in ignē impositum est: mali odoris est. Itaq; qui de morbo dubitat: hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint. animaduertere primum oportet: quid sit in quo laboratur. Deinde si tantūmodo non ali corpus apparet: causam eius attendere: & si cibi minus aliquis q̄ debet / assumit: adiciere / sed paulatim: ne si corpus insuetum subita multitudine onerauerit: concoctionem impediat. Si uero plus iusto quis assumere solitus est: abstinere uno die: deinde ab exiguo cibo incipere. quotidie adiciere donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis q̄ minime frigidis sole uitato. per manus quoque



exerceri. Si infirmior est gestari: ungi: p̄fricari si potest maxime per se ipsum sæpius eodem die & ante cibum & post eum sic: ut interdum oleo quædam adiciantur calfacientia donec insudet. Prodestq; ieiuno prætere per multas partes cutem & attrahere ut relaxetur: aut imposita resina & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum: sed post cibum exiguum. Atq; in ipso solio recte tibi aliquid assumitur: aut si sine hoc frictio fuit: post eam p̄tinus. Cibi uero esse debent ex iis: qui facile concoquuntur: qui maxime alunt. Ergo uini quoq; sed austeri necessarius usus est: mouenda urina. at si malus corporis habitus est: primum abstinendum est: deinde aliud ducenda. tum paulatim cibi dandi adiectis exercitationibus: unctionibus: frictionibus. Vtilius his frequens balneum est: sed ieiunis etiam usq; sudorem. Cibus uero opus est copiosis: uariis: boni succi: qui que etiam minus facile corrumpatur. uino austero. Si nihil reliqua proficiunt: sanguis mittendus est: sed paulatim: quotidieque pluribus diebus: cum eo ut cætera quoq; eodem modo seruentur. Quod si mali plus est: & uera phthisis est: inter initia protinus occurrere necessarium est. Neque enim facile is morbus cum inueterauerit: euincitur. Opus est si uires patiuntur longa nauigatione: cæli mutatione sic: ut densius / quam id est: ex quo discedit æger: petatur. Ideoq; aptissime Alexandriam ex italia itur. Fere que id posse inter principia corpus pati debet: cum hic morbus ætate firmissima maxime oriatur: idest ab anno duodecimo ad annum quintum & trigessimum: Si id imbecillitas non finit: nauem tamen non longe gestari commodissimum est. Si nauigationem aliqua res phibet: lectica uel alio modo corpus dimouendum est. Tum a negociis abstinendum est: omnibusq; rebus / quæ sollicitare animum possunt. somno indulgendum. cauenda destillationes: ne siquid cura leuaret: exasperent. & ob id uitanda cruditas: simul que sol & frigus. Os obtegendum: fauces uelandæ. tussicula suis remediis finienda. & quandiu quidem febricula incurSAT: huic interdum abstinencia: interdum



etiam tepestiuis cibis medendum: Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoq; quod in capitis doloribus & in acutis febribus: & per eas facta nimia siti: siue præcordia tument: siue biliosa uina est: siue sanguis fluxit pro ueneno est: in phthisi tamen sicut in omnibus longis difficilibus que febriculis recte dari potest. Quod si febris aut non dum incurfat aut iam remisit decurrendum est ad modicas exercitationes: maxime que ambulationes: item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer: ut allium: porrum: id que ipsum ex aceto. uel ex eodem intubus: ocymum: lactuca. Dein lenis: ut sorbitio ex pitana uel ex alica uel ex amilo / lacte adiecto. Idem oriza quoque / & si nihil aliud est / far præstat. Tum inuicem modo his cibis: modo illis utendum est. Adicienda que quædam ex media materia: præcipue que uel ex apruna: cerebellum: uel pisciculus: & his similia. Farina etiã cum seuo ouillo / caprino uel mixta / deinde incotta pro medicamento est. uinum assumi debet leue austerum. Hactenus non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est: ac neque febricula: neque tussis quiescit: tenuari que corpus apparet / ualidioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti uno loco submento: altero in gutture: duobus ad mammam utranque. item sub imis ossibus scapularum: quas omotidas græci uocant: sic ne sanescere ulcera sinamus: nisi tussi finita. Cui per se quoq; medendum esse / manifestum est. Tunc ter quater que die uehementer extremæ partes perfricandæ. thorax leui manu pertractandus. post cibum intermittenda hora. & perfricanda crura / brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est æger in solium: in quo sit aqua calida & oleum. caeteris diebus bibenda aqua. tum & uinum / si tussis non est / potui frigidum dandum. si æstas est / egelidum. Utile est etiam cibos in remissionibus quotidie dari. frictiones gestationesq; similiter adhiberi. eadem acria quarto aut quinto die sumere. interdum herbam sanguinalem ex aceto uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est uel plantaginis succus per se: uel marrubium ex



melle concoctum: ita ut illius cyathus sorbeatur huius cochleare plenum paulatim delingatur. uel inter se mixta & incocta resinae terebinthinae pars dimidia: butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt uictus: uehiculum & nauis et sorbitio. Alius cita utiq; uitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est: perniciosus est: maximeq; sanguinis. Qui meliusculus esse coepit: adiicere debet exercitationes. frictiones. cibos. deinde ipse se suppresso spiritu perfricare: diu abstinere a uino. balneo: uenere.

De comitialis morbi curationibus

## CAPVT XXIII

**I**Nter notissimos morbos: est etiam is/ qui comitialis uel maior nominatur. Homo subito concidit. ex ore spumæ mouentur: deinde interposito tempore ad se redit & per se ipsum consurgit. Id genus sæpius uiros quam foeminas occupat: ac solet quidem etiam longum esse usq; ad mortis diem & uitæ non periculosum. Interdum tamen cum recens est hominem consumit: & sæpe eum si remedia nō sustulerunt: in pueris uenerit: in puellis menstruorum initium tollit. modo cum distentione membrorum aut neruorum prolabitur aliquis: modo sine illa quidem. Hos quoq; iisdem quibus lethargicos excitare conantur. quod admodum super uacuum est: & quia ne lethargicus quidem iis sanatur: & quia cum possit ille nunq; expergisci atq; ita fame interire: hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis: si nulla neruorum distentio accessit: utique sanguis mitti debet. Si accessit non utiq; mittendus est: nisi alia quoq; hortantur. necessarium autē est ducere aluum/ uel nigro ueratro purgare: uel utrunque facere si uires patiuntur. tunc caput tōdere: oleoq; & aceto perungere. cibum post diem tertium simul cum transit hora qua concidit/ dare. Neq; sorbitiones autem his: alii que molles & faciles cibi: neque caro/ minimeq; suilla conuenit: sed mediæ materiae. Nam & uiribus opus est: et cruditates cauendæ sunt: cum quibus fugere



oportet solem: balne. m. ignem: omnia q̄ calfacientia. item  
 frigus: uinum: uenerem: loci præcipitis conspectum / omnium  
 q̄ terrentium: uomitum: lassitudinem: sollicitudines: negocia  
 omnia. Vbi tertio die cibus datus est: intermittere quartum:  
 & inuicem alterum queng: eadem hora cibi seruata donec qua-  
 tuordecim dies transeāt. Quos ubi morbus excessit: acuti uim  
 deposuit. At si manet: curandus iam ut longus est. Quod si  
 non quo die primum id incidit medicus accessit. Sed is qui ca-  
 dere consuevit ei traditus est: protinus eo genere uitæ habi-  
 to / qui supra comprehensus est: expectandus est dies / quo pro-  
 labatur. utendumque tum uel sanguinis missione: uel ductione  
 alui: uel nigro ueratro: sicut præceptum est. Insequentibus de-  
 inde diebus per eos cibos quos proposui / uitatis omnibus quæ  
 cauenda dixi: nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fue-  
 rit: confugiendum erit ad album ueratrum: ac ter quoque aut  
 quater eo utendum / non ita multis interpositis diebus: sic ta-  
 men ne iterum unq̄ sumat / nisi conciderit. Mediis autem die-  
 bus uires eius erunt nutriendæ / q̄busdā præter ea quæ scripta  
 sunt adiectis. Vbi mane experrectus est: corpus eius leuiter ex  
 oleo uetere cum capite excepto uentre pmulceatur. tum ambu-  
 latione quam maxime lōga & recta utatur. post ambulationē  
 loco tepido uehementer & diu ac non minus ducenties / nisi in-  
 firmus erit: perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida  
 perfundatur. paulum cibi assumat: conquiescat: rursus ante  
 noctem ambulatione utatur: iterum uehementer perfricetur.  
 sic ut neq̄ uenter / neq̄ caput contingatur: post hæc coenet:  
 interpositis q̄ tribus aut quattuor diebus / uno aut altero acri-  
 a assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus: caput ra-  
 dat: ungatur oleo uetere / adiecto aceto & nitro: perfundatur a  
 qua salsa: bibat ieiunus ex aqua castoreum: nulla aqua nisi de  
 costâ potionis causa utatur. Quidā iugulati gladiatoris cali-  
 do sanguine epoto tali morbo se liberarunt. Apud quos mise-  
 rum auxilium tolerabile / miserius malum fecit. Quod ad me-  
 dicum uero pertinet: ultimum est iuxta talum exuroq̄ cruce



diutius aliquem & nehemētius ista sollicitare consuerunt Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic si in nares uel in fauces destillauit: præter ea quæ supra rectu li: protinus primis diebus multum ambulandum est: perfricandæ uehementer inferiores partes: leuior frictio adhibenda tho raci erit: leuior capiti. demenda assueto cibo pars dimidia: su menda oua: amilum: similiaq; quæ pituitam faciunt crassio rem. Siti quanta maxime sustineri potest / pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus: eoq; usus est: ad iiciendus est cibo pisciculus / aut caro. sic tamen ne protinus insens modus cibi sumatur. Vino meraco copiosius utendum est. At si impulmonem quoque destillat: multoq; magis & am bulatione & frictione opus est. eademq; adhibita ratione in cibis: si non satis illi proficiunt / acrioribus utendum est. ma gis somno indulgendum: abstinendum q; a negociis omnibus aliquādo sed seriùs tentandum. Ingrauedine autem primo di e quiescere: neque esse: neque bibere: caput uelate: fauces lana circundare. postero die surgere: diu abstinere a potione: aut / si res coegerit: non ultra heminam aquæ assumere. Tertio die panis non tam multum ex parte interiore cum pisciculo uel le ni carne sumere: aquam bibere. Siquis sibi temperare non po tuerit quo minus pleniorie uictu utatur: uomere. Vbi in balne um uentum est multa aqua calida caput & os fouere usque ad sudorem. tum ad uirum redire. Post quæ uix fieri potest: ut i dem incommodum maneat. Sed si manserit: utendum erit ci bis frigidis: aridis. leuibus. humore q̄ minimo / seruatis fric tionibus / exercitationibus que: quæ in omni tali genere ualitu dinis necessarie sunt.

DE cervicis morbis curationibusq; .

CAPVT. III

**A** Capite transitus ad cervicem est: quæ .grauius ad mo dum morbis obnoxia est. neque tamen aliis importuni or acutior que morbus est / quam is qui quædam rigore  
m i



neruorum / modo caput scapulis: modo mentum pectori annexit: modo rectam & immobilem cervicem intendit. Priorem graeci opischoronon: insequentem emprosthoronon: ultimum tetanon appellant: quanuis minus subtiliter quidam in discretis his nominibus utuntur. Ea saepe intra quartum diem tollunt. Si hunc euaserunt: sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur: id quae conuenit. Sed Asclepiades utique mittendum sanguinem credidit. Quod quidam uitandum esse dixerunt: eo quod maxime tum corpus calore egeret: si quod esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neque enim natura sanguinis est: ut utique caleat: sed ex iis / quae in homine sunt: hic celerrime uel calefcit / uel refrigescit. Mitti uero nec ne debeat / ex iis intelligi potest: quae de sanguinis missione praecepta sunt. Utique autem recte datur castoreum: & cum hoc piper uel laser. Deinde opus est fomento humido & calido. Ita quae plerique aqua calida multa ceruices subinde perfundunt. Id in praesentia leuat. Sed oportunos neruos frigori reddit. Quod utique uitandum est. Utilius igitur est caerato liquido primum cervicem perungere: deinde ad mouere uescicas bubulas: uel utriculos / oleo calido repletos: uel ex farina calidum cataplasma: uel piper rotundum cum fico contusum. Utilissimum tamen est humido sale fouere. Quod quomodo fieret iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est: ad mouere ad ignem: uel si aestas est: in sole / aegrum oportet: maxime quae oleo uetere: si id non est / syriaco: si ne id quidem est / adipe quam uetustissima ceruicem & scapulas & spinas perfricare. Frictio cum omnibus in homine uertebis utilis sit: tum iis praecipue quae in collo sunt. Ergo die nocte quae interpositis tamen quibusdam temporibus hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur: imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendum uero praecipue frigus. Ideoque in eo conclui / quo cubabit aeger / ignis continuus esse debet: maximeque tempore antelucano. quo praecipue frigus intenditur.



Neq; inutile erit caput attonsum habere : id que irino uel cyprino calido madefacere: & super imposito pilleo uelare: nō nunquam etiam in calidum oleum totum descendere / uel in a quam calidam; in qua foenum græcum decoctum sit & adiecta olei pars tertia. Alius quoque ducta sæpe superiores partes resoluit. Si uero etiam uehementius dolor creuit: adinouendæ ceruicibus cucurbitulae sunt sic / ut cutis incidatur: eadem aut ferramentis / aut sinapi adurendae . Vbi leuatus est dolor : moueri que ceruix coepit: scire licet cedere remediis morbum. Sed diu uitandus cibus / quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum: item que ouis forbilibus : aut a pullis mollibus ius aliquod assumendum. At si bene processerit: iamque extoto recte se habere ceruices uidebuntur: incipiendum erit a pulricula / uel intrita bene madida . Celerius tamen etiam panis mandendus / quam uinum gustandum . siquidem huius usus præcipue periculosus: ideoque in longum tempus differendus est .

DE FAUCIVM MORBIS . ac curationibus . & primum de angina . deinde de difficultate spirandi . Ultimo de tussi. CAPVT. IIII

**V**T hoc autem morbi genus circa totam ceruicem: sic alterum æque pestiferum acutum que in faucibus esse consueuit. nostri anginam uocant. apud græcos nomen put species est. Interdum enim neque rubor neque tumor ullus apparet: sed corpus aridum est: uix spiritus trahitur: membra soluantur. Id synanchen uocant. Interdum lingua fauces que cum rubore intumescunt. uox nihil significat. oculi uertuntur. facies pallet. singultus que est: uti synanche uocatur. Illa communia sunt. aeger non cibum deuorare: non potio nem potest: spiritus eius includitur. Lenius est ubi tumor tantummodo & rubor est: cætera non sequuntur. id parasynanchen appellant . Quidquid est: si uires patiuntur: sanguis mittendus est . si non abundat: secundum est: ducere aluum . Cucurbitula  
 m. ii.



quoque recte sub mento & circa fauces admonetur : ut id quod  
 intrangulat : euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam  
 sicca spiritum elidunt. Ergo ad mouere spongias oportet :  
 quæ melius in calidum oleum / quam in calidam aquam subin-  
 de demittuntur. Efficacissimus que est hic quoque salis calidi  
 succus. Tum commodum est hyssopum uel nepeta uel thimum  
 uel absinthium uel etiam fursures aut ficus aridas aut mulsam  
 aquam decoquere : ea que gargarizare. post hæc palatum un-  
 gere uel felle taurino / uel eo medicamento : quod ex moris ē.  
 polline etiam piperis id recte respergitur. Si per hæc parum  
 proficitur : ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis ma-  
 xillis supra collum : & in palato circa uiam uel eas uenas /  
 quæ sub lingua sunt : ut per ea uulnera morbus erumpat. Qui-  
 bus si non fuerit æger adiutus : scire licet / malo uictum esse.  
 Si uero his morbus leuatus est : iam que fauces & cibum & spiri-  
 tum capiunt : facilis ad bonam ualitudinem recursus est. Atque  
 interdum natura quoque adiuuat : si ex angustiore sede uiti-  
 um transit in latiore. Ita que rubore & tumore in præcordiis  
 orto / scire licet fauces liberari. Quicquid autem eas leuauit :  
 incipiendum est ab humidis / maxime que aqua mulsæ decocta  
 deinde assumendi molles & non acres cibi sunt : donec fau-  
 ces ad pristinum habitum reuertantur. Vulgo audio si quis  
 pullum hirundinis ederit : angina toto anno non periclitari.  
 seruatum que eum ex sale : cum is morbus urget : comburi : car-  
 bonem que eius contritum in aquam mulsam / quæ potui da-  
 tur : infricari : & prodesse. Id cum idoneos auctores ex po-  
 pulo habeat : neque habere quicquam periculi possit : quanuis  
 in monumentis medicorum non legerim : tamen inserendum  
 huic opeti meo credidi.

#### DE DIFFICULTATE SPIRANDI.

**E**st etiā circa fauces malum : quod apud græcos aliud atque  
 aliud nomen habet / p ut se intendit. Omne id difficultate



spirandi consistit. Sed hæc dum modica est: neq; extoto strā  
gulat dyspnoea appellatur. Cum uehementior est: ut spirare æ  
ger sine sono & anelatione non possit aschma. Cum accessit  
id quoq; ne nisi recta ceruice spiritus trahatur ortopnoea. Ex  
quibus id / quod primum est: potest diutius trahi. Duo inse  
quentia / acuta esse consuerunt. His communia sunt. quod pp  
ter angustias / per quas spiritus euadit: sibilum elidit: dolor  
im pectore præcordiis que est: interdum etiam scapulis. isque  
modo decedit: modo reuertitur. ad hæc tussicula accedit. Au  
xilium est / nisi aliquid prohibet / in sanguinis detractioe.  
Neque id satis est: sed lacte quoque uenter soluendus est.  
Liquanda aluus: interdum etiam ducenda. quibus extenua  
tum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput au  
tem etiam in lecto sublime habendum est. thorax fomentis /  
cataplasmatibus que calidis aut siccis aut etiam humidis adiu  
uandus est. & postea uel malagma super imponendum: uel cer  
te caeratum ex cyprino / uel irino unguento. Sumenda de  
inde ieiuno potui mulla aqua: cum qua uel hyssopus cocta /  
uel cōtrita capparis radix sit. Datur etiam utiliter aut nitrū  
aut nasturcium album fridum: deinde cōtritum & cum melle mi  
xtum: simulq; coquantur mel: galbanum: resina terebīthina.  
& ubi coierunt: ex his quod fabæ magnitudinem hēt quotidie  
sub lingua liquatur. aut su phuris ignem non expti. P.X. &  
quadrans: abrotani. P.X. iuuii cyatho teruntur: idq; tepesac  
tum sorbetur. Est etiā nō uana opinio uulpium iecur / ubi siccū  
& aridum factum est: contundi oportere: polentāq; ex eo po  
tioni aspgi: uel eiusdem pulmonem q̄ recentissimum assū: sed  
sine ferro coctum / edendum esse. Præter hæc sorbitionibus &  
lenibus cibis utendum est. interdum uino tenui austero. nō nun  
q̄ uomitu. Prosunt etiam quæcunq; urinam augent. sed nihil  
magis quam ambulatio lenta pene usq; ad lassitudinem: fricti  
o multa præcipue inferiorum partium uel in sole uel ad ignem  
& p se ipsum & p alios usq; ad sudorem. In iteriore uero fau  
cium parte interdum exulceratio esse cōsuevit. In hac pleriq;  
m. iii.



extrinsecus cataplasmatibus calidis fomentis que humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi: per quae molliores alii partes eas fieri dicunt / oportuniore quoque uitio iam haerenti. Sed si bene sic uitari morbus potest: tuta illa praesidia. Si metus eius est: superuacua sunt. Vtique autem perfricare fauces periculosum est. exulcerat enim. neque utilia sunt: quae urinae mouendae sunt apta: quia possunt dum transeunt ibi quoque pituitam extenuare: quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum: quas ipsi quoque secuti sumus: auctor bonus: acetum ait quam acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimere sanguinem potest: ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est. Quod idem quoque aequae probat: uel porri / uel marrubii succus uel nuges graecae cum trachanto contritae & cum passo mixtae: uel lini semen contritum & cum dulci uino mixtum. exercitatio quoque ambulandi currendi que necessaria est. Frictio a pectore uehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neque nimium acres: neque asperi: mel: lenticula: tragum: lac: prisana: pinguis caro: praecipue que porrum & quicquid cum hoc mixtum est. Portionis quam minimum esse conuenit. Aqua dari potest / uel pura: uel in qua malum cydoneum / palmulae uel decoctae sunt. Gargarizationes quoque lenes. si haec parum proficiunt: reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est & potest esse non longum. curationem tamen maturam: ne uehementer & diu laedat: desiderat.

## DE TVSSI.

**T**ussis uero fere propter faucium exulcerationem molesta est. quae multis modis contrahitur. Itaque illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere: & uix cum uetus facta est: eliditur. ac modo arida est: modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoque die bibere. spiritu retento currere: sed minime in puluere. ac lectione uti



## .QVARTVS

uehementi: quæ primo impeditur a tussi: post eam uincit. tum  
 ambulare. deinde per manus quoque exerceri: & pectus diu p  
 fricare. Post hæc q̄ pinguiſſimæ ficus uncias tres supra pri  
 nas incoctas eſſe. Præter hæc ſi humida eſt: profunt frictio  
 nes ualidæ cum quibuſdam caſſacientibus ſic ut caput quoque  
 ſiccum uehementer perfricetur. Item cucurbitulæ pectori ad  
 motæ. ſinapi ex parte exteriori faucibus impoſitum donec le  
 uiter exulceret. potio ex menta nucibuſque græcis & amilo:  
 primo que aſſumptus panis aridus: deinde aliquis cibus lenis.  
 At ſi ſicca tuſſis eſt: cum ea uehementiſſime urget: adiunat ui  
 ni auſteri cyathus aſſumptus: dum ne amplius id interpoſito  
 tempore aliquo / quam ter aut quater fiat. Item laſeris quam  
 optimi paulum deuorare opus eſt: porri uel marrubii ſuccum  
 aſſumere: ſcyllam delingere: acetū ex ea uel certe acre ſor  
 bere: aut cum ſpica allii contriti duos uini cyathos. Ut ſilis eti  
 am in omni tuſſi eſt peregrinatio: nauigatio longa: loca mari  
 tima: natationes. Cibus interdum mollis / ut malua ut urtica. in  
 terdum acer / ut lac cum allio coctum: ſorbitiones quibus laſer  
 ſit adiectum: aut in quibus porrum incoctum tabuerit. ouum  
 ſorbile: ſulphure adiecto potui primum aqua calida: deinde  
 inuicem aliis diebus hæc: aliis uinum. Magis terreri poteſt ali  
 quis cum ſanguinem expuit. Sed id modo minus / modo plus  
 periculi habet. Exit enim modo ex gingiuis modo ex ore. &  
 quidem ex hoc interdum etiam copioſe: ſed ſine tuſſi ſine ul  
 cere ſine gingiuarum ullo uitio: ita ut nihil excreetur. Verum  
 ut ex naribus / ſic ex ore aliquando prorumpit. Atque inter  
 dum ſanguis profluit: interdum ſimile aquæ quiddam in qua  
 caro recens lota eſt. Non nunq̄ autem iſ a ſummis faucibus  
 fertur: modo exulcerata ea parte: modo non exulcerata: ſed a  
 ut ore uenæ alicuius ad aperto: aut turbeculis quibuſdam na  
 tis / ex his ſanguine erumpente. Quod ubi incidit: neque læ  
 dit potio aut cibus: neque quicquam ut ex ulcere excreatur.  
 aliquando gutture & arteriis exulceratis frequens tuſſis ſāgui  
 nem quoque extundit. Interdum etiam fieri ſolet: ut aut ex



pulmone. aut ex pectore aut ex latere aut ex iocinere feratur. Sæpe feminæ quibus sanguis per menstrua non responder: hunc expuant: auctoresq; medici sunt: uel ex ea parte aliqua sanguinem exire: uel rupta: uel ore alicuius uenæ patefacto. Primam diabrosin secundam rhésinochasium Tertiam manan gomosin appellant. Ultima minime nocet. prima grauissime. Ac sæpe quidem euenit: uti sanguinem pus sequatur. Interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit: satis adualitudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt: si pus: si tussis est: p ut sedes ipsa est: ita uaria & piculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit: expeditius & remedium & finis est. Neq; ignorari oportet eis / quibus fluere sanguis solet. aut quibus spina dolet cõxæ ue aut post cursum uehementem uel ambulationem: dum febris absit: nō esse inutile sanguinis mediocri profuiuum. idq; per urinam redditum ipsam quoq; lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse / qui ex superiore loco decidit. Si tamen in eius urina nihil nouabit. Neq; uomitum huius asserre periculum etiam cum repetit: si ante confirmare & implere corpus licuit. & extoto nullum nocere: qui in corpore robusto neq; nimius est neque tussim aut calorem mouet. Hæc pertinet ad uniuersum. Nunc ad ea loca quæ proposui ueniam. Si ex gingiuis exit: potulacam manducasse satis est. si ex ore: continuisse eo merum uinum. si parum id proficit: acetum. si inter hæc quoque grauiter erumpit: quia consumere hominem potest: commodissimum est impetum eius admota occipitio cucurbitula sic ut cutis quoque icidatur: auertere. Si id mulieri cui menstrua non feruntur: euenit: eandem cucurbitulam incisis inguinibus eius admouere. At si ex faucibus / interioribus ue partibus processit: & metus maior è & cura maior adhibenda. sanguis mittendus est: & si nihilo minus ex ore processit: iterum tertio que & quotidie paulum aliquid. protinus autem debet sorbere uel acetum uel etiam cū thure plantaginis aut porri succum. imponendaq; extrinsecus supra id quod dolet lana succida ex aceto est: & id spongia



subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque & femora brachia que pluribus locis deligabat. Id Asclepiades a deo non prodesse: ut etiam inimicum esset: proposuit. Sed id sæpe commodè respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est. sed sat est infra inguina & super talos summos que humeros / etiam brachia. Tum si febris urget: danda est sorbitio & potui aqua: in qua aliquid ex iis quæ aliud astringunt: decoctum sit. at si abest febris / uel elota alica: uel panis ex aqua frigida & molle quoque ouum dari potest potui: uel idem quod supra scriptum est: uel uinum dulce uel aqua frigida. sed sic bibendum erit: ut sciamus huic morbo situm prodesse. præter hæc necessaria sunt quies: securitas: silentium. Caput huius quoque cubantis sublime esse debet: recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fouenda est. At inimica sunt uinum: balneum: uenus. in cibo oleum: acris omnia. item calida fomenta. conclaue calidum & inclusum. multa uestimenta corpori iniecta. etiam frictiones ubi bene etiam sanguis conquieuit. Tum uero incipiendum est a brachijs cruribusque: a thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis: per æstatem mediterraneis opus est.

DE Stomachi morbis et curationibus.

CAPVT.V

**F**aucibus subest stomachus: in quo plura longa uitia incidere consueverunt. Nam modo ingens calor: modo inflatio hunc: modo inflammatio: modo exulceratio afficit. Interdum pituita. Interdum bilis oritur. frequentissimumque est eius malum quo resoluitur: neque ulla re magis aut afficitur aut corpus afficit. Vt diuersa autem uitia eius sic etiam remedia sunt. Vbi exæstuat: aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est. imponendusque pulvis cum oleo & ea cataplasmata: quæ simul et reprimunt et molliunt. Potui / nisi quid obstat / gelida aqua præstanda. Si inflatio est: prosunt admodum cucurbitulae: neque incidere cutem necesse est. prosunt sicca & calida



fomenta: sed nō uehementissima. Interponēda abstinētia ē. Vtilis in ieiuno potio est absinthii aut hyssopi aut rutæ. Exercitatio primo lenis: deinde maior adhibenda est: maxime que quæ superiores partes moueat. Quod genus in omnibus stomachi uitiis aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione frictione: balneo quoque nonnunquam sed rarius: interdum alui ductione. Cibus deinde calidis neque infantibus. eodemque modo calidis potionibus: primo aquæ: post ubi resedit inflatio uini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi uitiis præcipiendum est: ut quo modo se quisque æger refecerit: eo ut sanus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua: nisi hisdem defenditur bona ualitudo: quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est: quam fere tumor & dolor sequitur: prima sunt quies & abstinētia: lana sulphurata circumdata: in ieiuno absinthium. Si ardor stomachum urget: aceto cum rosa subinde fouendus est: deinde cibus quidem utendum est modicis. Imponenda uero extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt. deinde his detractis utendum calidis ex farina cataplasmatibus: quæ reliquas digerant. Interdum alui ducenda. Adhibenda exercitatio: & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat: eadem fere facienda sunt: quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio: frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi lenes & glutinosi cibi: sed citra satietatem. Omnia acris atque acida remouenda. Vino si febris non est: dulci: aut si id inflat: certe leni utendum: sed neque præfrigido: neque nimis calido. Si uero pituita stomachus impletur: necessarius modo in ieiunio: modo post cibum uomitus est. Vtilis exercitatio: gestatio: nauigatio: frictio. Nihil edendum: bibendum que nisi calidum: uitatis tantum iis, quæ pituitam contrahere consuerunt. Molestius est: si stomachus bile uiciosus est. Solent autem ii qui sic tenentur interpositis quibusdam diebus hanc: & quidem quod pessimum est: atram mouere. Iis recte alui ducitur: potiones absinthio dantur. necessaria gestatio nauigatio est: si fieri potest ex nausea uomitus: uitanda erit



ditas: sumendi cibi faciles & stomacho non alieni: uinum au-  
sterum. Vulgatissimum uero pessimumq; stomachi uicium  
est resolutio: id est cum cibi non tenax est: solet q; desinere  
ali corpus: ac si tace consumi. Huic generi inutilissimum bal-  
neum est. Lectiones exercitationesq; superioris partis necessa-  
riae. Item unctiones frictionesq; iis perfundi frigida atq; in  
eadem natate: canalibus eiusdem subicere etiam stomachum  
ipsum: & magis etiam a scapulis id quod contra stomachum  
est. Consistere in frigidis / medii capitisq; fontibus quales cu-  
tiliarum sumbruinarumq; sunt: salutare est. Cibi quoque assu-  
mendi sunt frigidi: qui potius difficulter coquuntur / quam fa-  
cile uiciantur. Ergo plerique qui nihil aliud coneoquere pos-  
sunt / bubulam coquunt. Ex quo colligi potest / neq; auem / neq;  
uenationem / neque piscem dari debere: nisi generis durioris.  
Potui quidem aptissimum est uinum frigidum uel certe bene-  
calidum meracum / potissimum rheticum uel allobrogicum: a-  
liud uer: quod & ausceru & resina conditum est. Si id non est:  
quam asperissimum / maximeq; signinum. Si cibus non contine-  
tur: danda aqua & eliciendus plenior uomitus est: iterum que-  
dandus cibus: & cum admouendae duobus intra stomachum  
digitis cucurbitulae: ibiq; duabus aut tribus horis continendae  
sunt. Si simul & uomitus & dolor est: imponenda supra sto-  
machum est lana sucida: uel spongia ex aceto: uel cataplasma  
quod refrigeret. Per fricanda uero non diu sed uehementer bra-  
chia & crura: & calfacienda. Si plus doloris est: infra praeco-  
rdia quattuor digitis cucurbitula utendum est: protinus datus  
panis ex pulca frigida. Si non continuit: post uomitum sene  
aliquid ex iis: quae non aliena stomacho sint. Si ne id quidem  
tenuit: singuli cyathi uini singulis interpositis horis donec  
stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicu-  
lae succus: ualentius acidi punici mali compari modo succi: qui  
ex dulci punico malo est: adiecto etiam intubi succo & men-  
ta: sed huius minima parte: quibus tantundem quantum i his  
omnibus est aquae frigidae quam optime miscetur. Id enim



plus quam uinum ad comprimendum stomachum potest. suppressendus autem uomitus est: qui se uenit: sic si nausea est. Sed si coacuit intus cibus aut computruit: quorum utrumlibet ructus ostendit: eiciendus est: protinusque cibus assumptis hisdem: quos proxime posui / stomachus restituendus. Vbi sublati sunt praesens metus: ad ea redeundum est: quae supra praecpta sunt.

DE LATERVM DOLORIBVS.

CAPVT. VI

**S**tomachus lateribus cingitur: atque in his quoque uehementiores dolores esse consueverunt. & initium uel ex frigore uel ex aestu uel ex nimio cursu uel ex morbo est. Sed interdum ne malum inera dolorem est. is que modo tarde / modo celeriter soluitur. interdum ad perniciem quoque procedit. oriturque acutus morbus: qui pleureticus a graecis nominatur. Huic dolori lateris febris & tussis accedit. & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est: pituita. si grauis: sanguis. Interdum etiam sicca tussis est: quae nihil emollicuit. idque primo uitio grauius: secundo tolerabilius est. Remedium uero est magni & recentis doloris sanguis missus. At siue leuior / siue uetustior casus est: uel supernacuum / uel serum id auxilium est. confugiendumque ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur / donec ulcera pustulasque excitet: & tum medicamentum / quod humorem illuc citet. Praeter haec circumdare primum oportet latus abso lanae sulphuratae. deinde cum paulum inflammatio se remiserit / siccis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet: nouissime resina imposta discutitur. Vitandum cibus / potionibusque calidis. uitandum frigus. Inter haec tamen non alienum & extremas partes oleo & sulphure perfricare. Si leuata tussis est: leni lectione uti. iamque & acres cibos & uinum meracius assumere. Quae a medicis praecipiantur: ut tamen sine his rusticos & ostros epota



ex aqua herba trixaquo satis adiunget. Hæc in omni lateris dolore communia sunt. plus negotii est: si acutus quoque morbus is factus est. In hoc præter ea quæ supra posita sunt: hæc animaduertenda sunt. ut cibus sit quam maxime tenuis & lenis: præcipue quæ sorbitio: eaque ex prisana potissimum. aut ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Id quæ non nisi tertio quoque die detur: si tamen per vires licebit. potio uero aqua mulsa, in qua hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ quibus temporibus danda sint: ex ratione uel adiectæ uel leuatae febris apparebit: sic, ut in remissione quam maxima dent: cū eo tamen, ut sciamus non esse eius generis tussis aridas fauces committendæ. Sæpe enim ubi nihil est quod excreetur: continuatur et strangulat. Ob quam causam dixi etiam peius id genus esse tussis: quod nihil, quam quod pituita moueret. Sed hic uinum sorbere: ut supra præcepimus: morbus ipse non patitur. in uicem eius cremor prisanae sumendus est. Ut his autem in ipso morbi feruore sustinendus aeger est: sic nobis paulum is se remisit: alimenta pleniora et uini quoque aliquid dari potest. dum nihil decur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectioe quoque manserit tussis: intermittere oportebit uno die: postero quæ cum cibo uini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussis: tum non erit alienum: ut supra quoque positum est: uini cyathos sorbere. Sed in hoc genere ualitudinis dulce uel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico uictu corpus firmadum est.

DE uiscerum morbis et primo de pulmone: deinde de iocine re: tum de liene: postremo de renibus. CAPVT. VII.

**A** Compagine uero corporis ad uiscera transeundum est: et in primis ad pulmonem ueniendum. ex quo uehemens et acutus morbus oritur: quem peripneumaticon graeci uocant. Eius hæc conditio est. Pulmo totus afficitur. Hunc casum eius subsequitur tussis, bile uel pus trahens præcordiorum totiusque



pectoris grauitas: spiritus difficultas: magnae febres: cōtinua  
 uigilia: cibi fastidium: tabes. Id genus morbi plus periculi  
 quam doloris habet. Oportet si satis ualidae uires sunt / san-  
 guinem mittere: si minores / cucurbitulas sine ferro praeordi-  
 is ad mouere. Tum si satis ualet / gestando ægrum digerere:  
 si parum / intra domum tamen dimouere. Potionem autem hy-  
 sopi dare: cui ficus arida sit incocta: aut aquam mulsam: in  
 qua uel hyssopum uel ruta decocta sit. Frictione uti diutissi-  
 me in scapulis: proxime abhis in brachiis & pedibus & cruri-  
 bus: leuiter contra pulmonem: id q̃ bis quotidie facere. quod  
 ad cibum uero pertinet: huic nec salis opus est: neq̃ acris: neq̃  
 amaris: neq̃ alium astringentibus: sed paulo lenioribus.  
 Ergo primis diebus danda est sorbitio pitisanæ uel alicæ uel o-  
 rizæ: cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac sorbile ouum:  
 nuclei pinei ex melle. panis uel elota alica ex aqua mulsâ. potui  
 deinde non solum pura aqua: sed etiam mulsâ egelida: aut si  
 æstas est / etiam frigida: nisi quid obstat. Hæc autem altero  
 quoq̃ die crescente morbo dare satis est. Vbi incremento  
 constitit: quantum res patitur ab omnibus abstinendum est,  
 præter quam aqua egelida. Si uires desunt: adiuuandæ sunt a  
 qua mulsâ. profunt que aduersus dolores imposita calida fo-  
 menta: uel ea quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest im-  
 positus super pectus sal bene contritus cum carato mixtus:  
 quia leuiter cutem erodit: eoque impetum materiæ: quo pulmo  
 uexatur: euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex iis quæ  
 materiam trahunt. Neq̃ alienum est dum premit morbus / cla-  
 uis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus est: ter  
 aut quater die fenestris aliquanto apertis paruum aerem reci-  
 pere. Deinde in refectione pluribus diebus a uino abstinere:  
 gestatione: frictione uti: sorbitionibus: & prioribus cibis ad-  
 iicere ex oleribus porrum: ex carne ungulas & summa trunculo-  
 rum atq̃ pisciculos sic ut diu nihil molle & lene sumatur.

DE Iocineris morbo & curatione.

CAPVT. VIII



**A**lterius quoque uisceris morbus id est iocineris æque modo longus modo acutus esse consuevit. hepaticum greci uocant. Dextra parte sub præcordiis uehemens dolor est. Idemque ad latus dextrum & ad iugulum humerumque partis eiusdem puenit. non nunquam manus quoque dextra torquetur. horror calidus est. Vbi male est bilis euomitur: interdum singultus prope strangulat. Et hæc quidem acuti morbi sunt: longioris uero ubi suppuratio in iocinere est: dolorque modo finitur: modo intenditur: dextra parte præcordia dura sunt & tument. post cibum maior difficultas est. accedit maxillarum quædam resolutio. ubi inueterauit malum uenter & crura pedesque intumescunt. pectus atque humeri/circaque iugulum utrunque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est: cum uenter solvendus est. si non potest aliter per nigrum ueratrum. imponenda extrinsecus cataplasmata/primum quæ reprimant: deinde calida quæ deducant. quibus recte iris uel absinthium adiiçitur post hæc malagma. dandæ uero sorbitiones sunt: omnisque cibi & calidi & qui non multum alant: & fere qui pulmonis quoque dolori conueniunt. præterque eos qui urinam mouent: potionesque ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thimum: saturia: hyssopum: nepeta: amilum: sisanium: lauri bacce: pini flos: herba sanguinalis: menta: ex malo coroneo medium: columbæ iecur recens & crudum. Ex quibus quædam perse esse: quædam adiiçere uel sorbitioni uel potioni licet: sic tamen ut parce assumantur. Neque alienum est absinthium contritum ex melle & pipe eiusque cataportium, quotidie deuorare. abstinendum utique est ab omnibus frigidis. neque enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus: uitandus omnis labor: omnis uehementior motus: ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira. trepidatio. pondus. ictus: cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est: calida: si æstas: tepida: Item liberalis unctio: et in balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat: eadem faciendæ sunt: quæ in cæteris interioribus suppurationibus.



Quidam etiam contra id scalpello aperiunt : & ipsam uomicam adurunt .

De lienis morbo & curatione.

CAPVT. VIII

**A**T lienis ubi affectus est. intumescit : simul que cum eo pars sinistra : ea que dura est, & prementi renititur : uenter intentus est. aliquis etiam cruribus tumor est. Ulcera aut omnino non sanescunt : aut certe cicatricem uix recipiunt. In intenta ambulatione cursu que dolor & quaedam difficultas est. Hoc uitium quies auger. Itaque exercitatione et labore opus est : habita tamen ratione / ne febre mixta si nimium processerit : excitetur. Vastiones frictiones, q; & sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt. item lac & caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acerum acie per se sorbere : & magis etiam quod scylla conditum est : expedit. Edenda sunt fassamenta : uel olex ex muria dura tincta in aceto lactucae / intubiq; & betæ ex eodem. ex sinapi asparagi : armoracia : pastinaca : unguæ : rostra : aues macre : eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiuno dari debet. absinthium incoctum. at post cibum aqua a ferratio fabro : in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hec enim uel præcipue lienem coarctet quod animaduersum est in iis animalibus : quæ apud hos fabros educata exiguos lienes habent. potest enim dari uinum tenue austerum : omnia que in cibis & potionibus / quæ utinam mouendæ sunt : præcipue que ad id ualeat uel tr. folii semen : uel cuminum uel apium : uel serpillum : uel citisus : uel portulaca : uel nepeta : uel thimum : uel hysopum : uel satureia. Hæc enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur : præcipue que ciura & nasturcium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt que leuent. Fit ex unguento & palmulis : quod myrobola non graeci uocant. Fit ex lini & nasturcii semine quo uinum & oleum adiicitur. Fit ex capresso uiride & arida ficu.



## QUARTVS.

Fic ex sinapi cui seui hircini a renibus quarta pars ponderis adiicitur: teriturque insale & protinus imponitur. Multisq; modis huic rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere: & muriam eius cum aceto sorbere / commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam / uel corticem eius cum furfuribus: aut ipsum capparum cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

DE renum morbis & curationibus.

CAPVT. X.

**A**T renes ubi affecti sunt: diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere: cubare molliter: soluere aluum. si aliter non respondet etiam ducere: saepe desidere in aqua calida. neque cibum neque potionem frigidam assumere: abstinere ab omnibus salis acris acidis pomis: bibere liberaliter: adiacere modo cibo modo potioni pipet. porrum. ferulam. album papauer. Quae maxime inde urinam mouere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt: si adhuc ulcera purganda sunt: cucumeris semina detractis corticibus sexaginta: nuclei ex pinu siluestri duodecim: anisi quod tribus digitis sumi possit: croci paulum: contrita & in duas mulsi portiones diuisa. Si uero dolor tantum leuandus est: eiusdem cucumeris semina triginta: iidem nuclei uiginti: nuges graecae quinque: croci paululum: contrita & cum lacte potui data. At super quoque recte quaedam malagmata iniiciuntur: maximeque ea quae humori extrahendo sunt.

DE INTESTINORVM MORBIS ET PRIMO DE CHOLERA.

CAPVT. XI.

**A**Visceribus ad intestina ueniendum est: quae sunt & acutis & longis morbis obnoxia. Primo & que facienda mentio est

n. iii.



cholera: quia commune id stomachi atq; intestinorum vitium uideri potest. Nam simul & deiectio & uomitus est: præterq; hæc inflatio est: intestina torquentur: bilis supra infra que erumpit: primum aquæ similis: deinde ut in ea recens caro lora esse uideatur: interdum alba: non nunquam nigra uel uaria. Ergo eo nomine morbi hunc cholera græci nominarunt. præter ea uero quæ supra comprehensa sunt (sæpe etiam crura manus que contrahuntur: urget sitis: anima deficit. quibus concurrentibus non mirum est si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo ubi ista coeperunt aquæ tepidæ quam plurimum bibere oportet & uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur. sed etiam si non incidit: miscuisse tamen nouam materiam corruptæ prodest: pars que sanitatis est uomitus esse suppressum. si id incidit: protinus ab omni porione abstinendum est. Si uero tormina sunt: oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fouere: uel si uenter dolet hisdem egelidis: sic ut uenter ipse mediocriter calentibus iuuetur. Quod si uehementer & uomitus & deiectio & sitis uexant: & adhuc suberuda sunt quæ uomuntur: non dum uino maturum tempus est. Aqua neq; ea ipsa frigida: sed potius egelida danda est. admouendum que naribus est puleium ex aceto: uel polenta uino aspersa: uel menta secundum naturam est. At cum discussa cruditas est: tum magis uetendum est: ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad uinum. Id esse oportet tenue / odoratum: cum aqua frigida mixtum: uel polenta adiecta: uel melle quoque assumere expedit: quotiens que aliquid aut stomachus aut uenter effudit: totiens per hæc uires restituere. Erasistratus primo tribus uini guttis aut quinque aspergendam potionem esse dixit: deinde paulatim merum adiciendum. Is si & ab initio uinum dedit & metum cruditatis secutus est: non sine causa fecit. Si uehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putauit: errauit. At si inanis est homo: & crura eius contrahuntur: interponenda potio absinthii est. Si extremæ partes corporis fri-



gent: ungendæ sunt calido oleo: cui cæx paulum sit adiectus: calidis que fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est: extrinsecus contra uentriculum ipsum cucurbitula admouenda est: aut sinap. super imponendum. Vbi is constitit: dormire oportet. postero die utiq; a potione abstinere. die tertio in balneum ire. paulatim se cibo reficere: somno quisque facile acquiescit. Item que lassitudine & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet: aluum duci necessarium est. tum cibus uinoq; utendum est. sed hic quidem morbus & acutus est et inter intestina stomachum que uersatur sicut cuius potissimum partis sit / nō facile dici possit.

DE Coeliaco uentriculi morbo. CAPVT. XII.

**I**N ipsius uero uentriculi porta consistit is qui & longus esse consuevit: coeliacus a græcis nominatur. Sub hoc uenter indurescit: dolor que eius est. Aluus nihil reddit: ac ne spiritum quidem transmittit. Extremæ partes frigescunt. Difficiliter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toto uentri imponere: ut dolorem leniāt. post cibum uomere: atq; ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro uentri & coxis admouere. Ventrem ipsum liquare dato lacte & uino salso frigido. Si tempus anni patitur / etiam uiridibus ficis: sic tamen neq; aut cibus aut humor uniuersus decur: sed paulatim. Ergo per interualla temporis sat est cyathos binos ternos ue sumere & cibum pro portione huius: commodeq; facit cyatho lactis / cyathus aquæ mixtus & sic datus. Cibi que infantes & acres utiliores sunt: adeo ut lacti quoque recte contritum allium adiiciatur. procedente uero tempore opus est gestari: maxime que nauigare: perfricari ter aut quater die / sic ut nitrum oleo misceatur. perfundi aqua calida post cibum. deinde sinapi imponere per omnia membra excepto capite: donec arrodatur & rubeat: maxime que si corpus durum & uirile est. paulatim deinde fa



ciendus est transitus ad ea quae uentrem comprimunt. Affa-  
caro danda / ualens & quae non facile corrumpatur. potui uero  
pluuialis aqua decoct: a: ed quae per binos ternos ue cyathos  
bibatur. Si uetus uitium est: oportet laser quam optimum ad  
piperis magnitudinem deuorare. altero quoque die uinum uel  
aquam bibere: interdum interposito cibo singulos uini cyathos  
sorbere: ex inferiori parte infundere pluuialem egelidam aqua  
maximeq: si dolor in imis partibus remanet.

DE tenuioris intestini morbo.

CAPVT. XIII.

**I**Nter ipsa uero intestina consistunt duo morbi: quorum  
alter in tenuiore: alter in pleniore est. Prior acutus est.  
Insequens esse longus potest. Diocles carystius tenuioris inte-  
stini morbum chordapson: plenioris ileon nominauit. A ple-  
nisq: uideo nunc illum priorem ileon: hunc chordion nomina-  
ri. Sed prior modo supra umbilicum: modo sub umbilico do-  
lorem mouet. Fit ex alterutro loco inflammatio: nec aluus nec  
spiritus infra trāsmittitur. si superior pars affecta est: cibus.  
si inferior: stercus per os redditur. si utrunlibet uetus est: adi-  
citur periculo uomitus biliosus mali odoris aut uarius aut ni-  
ger. Remedium est sanguinem mittere: uel cucurbitulas pluri-  
bus locis admouere: non ubiq: cute incisa. Id enim duobus aut  
tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare abunde est.  
Tum animaduertere oportet: quo loco malum sit. Solet enim  
contra id timere. Et si supra umbilicum est: alui ductio utilis  
non est. Si infra est: aluum ducere / ut Erasistrato placuit: op-  
timum est. & saepe id auxilii satis est. Ducitur autem percola-  
to ptisanæ cremore cum oleo & melle: Sic ut præter ea nihil  
adiiciatur. Si nihil timet duas manus imponere oportet supra  
summum uentrem: paulatim quæ deducere. Inuenietur enim ma-  
li locus: qui necesse est: renitatur: et ex eodem deliberari po-  
terit: ducenda nec ne aluus sit. Illa communia sunt: calida ca-  
taplasmata admouere: ea q: imponere a mammis usq: ad ingui



na & spina: ac sæpe mutare: brachia crura que perfricare: de mittere totum hominem in calido oleo. Si dolor non quiescit: etiam in alium ex parte inferiore tres aut quattuor cyathos calidi olei dare. Vbi hæc consecuti sumus: ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur: offerre potui multum tepidum non multum. Nam ante magna cura vitandum est: ne quid bibat. Si id commodè cessit: adicere sorbitionem. Vbi dolor & febricula quierunt: tum demum uti cibo plenior: sed neque inflante / neque duro / neque ualido: ne intestina adhuc imbecilla lædantur. Poni uero nihil præterq̃ puram aquam. siue quid uinolentum / siue acidum est: id huic morbo alienum est. Ac postea quoq̃ uitare oportet balneum: ambulationem: gestationem: cæterosq̃ corporis motus: nam facile id malum redire consuevit: & siue cum frigus subit: siue aliqua iactatio: nisi bene iam confirmatis intestinis reuertitur.

De morbo intestini plenioris.

CAPVT. XIII.

**I**S autem morbus: qui intestino plenior est: in ea maxime parte est: quam certam esse proposui. Vehemens sic inflatio: uehementis dolores dextra magis parte: intestinum quod uerti uidetur prope spiritum elidit. In plerisq̃ post frigora cruditate: que oritur: deinde quiescit. & per ætatem sæpe repetens sic cruciat: ut uitæ spatium nihil demat. Vbi is dolor coepit: ad mouere sicut & calida fomenta oportet: sed primo lenta: deinde ual diora: simulq̃ frictiones: ad extremas partes idest crura brachia que materiam reuocare. Si discussum non est: qua dolet cucurbitula sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causæ comparatum: quod colicon nominatur. Id se repperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum. sed impositum quoque extrinsecus digerendo spiritum dolorem leuat. Nisi finit uero tormento: recte neque cibus neq̃ potio assumitur. Quo uictu sic utendum qui hoc genere tentantur: iam mihi dictum est. Cōfectio me



dicamenti: quod colicon nominatur: ex his constat. Costi a  
nesi: castorei singulorum. P. VIII. petroselini. P. denatio  
rum. III. piperis longi et rotundi singulorum. P. XII. papa  
ueris lacrimae: iunci rotundi: myrrae: nardi singulorum. P.  
XVI. Quae melle excipiuntur: id autem & deuorari potest:  
& ex aqua calida sumi.

De torminibus idest dysenteria.

CAPVT. XV.

*emina Dysenteria*  
**P**roxima his inter intestinorum mala tormina esse cōsu  
euerunt dysenterion graece uocatur, intus intestina exul  
cerantur. Ex his cruor manat. Isque modo cum stercore ali  
quo semper liquido, modo cum quibusdam quasimuccosis ex  
cernitur. Interdum simul quaedam ca nosa descendunt. Fre  
quens deiiciendi cupiditas: do'orque in ano est. Cum eodem  
dolore exiguum aliquid emititur. Atque eo quoque tormentum  
intenditur. Id quae post tempus aliquod leuatur, exiguaque re  
quies est: somnus interpellatur: fibracula oritur, longoque tem  
pore id malum cum inueterauerit, aut tollit hominem, aut eti  
am si finitur: excruciat. Oportet in primis conquiescere. Si  
quidem omnis agitatio exulcerat: deinde ieiunium sorbere ui  
ni cyathum: cui contrita radix quinquifolii sit adiecta, impo  
nere cataplasmata super uentrem: quae reprimunt. quod in su  
perioribus uentris morbis non expedit. quotiensque desidit:  
subiuere aqua calida: in qua decoctae uerbenae sint: portula  
cam uel coctam uel ex dura muria edisse. cibos potionesque eas  
quae astringunt alui: si uetustior morbus est: ex inferioribus  
partibus modicum infundere uel praeanae cremorem: uel lac:  
uel adipem liquatam: uel medullam ceruinam: uel oleum: uel  
cum rosa butyrum: uel cum eadem album crudum ex ouis: uel  
aquam: in qua lini semen decoctum sit: uel si sonus non accedit, ui  
tellos cum aqua in qua rosae floris folia cocta sint. Leuant, n.  
dolorem haec & mitiora ulcera efficiunt: maximeque utilia sunt  
si cibi quoque secutum fastidium est. Themiso i muria dura



74  
 QVARTVS

quam asperim: sic utendum memorie prodidit. Cibi uero esse debent qui leniter uentrem destingant & ea quæ urinam mouent. Si ea consecuta sunt: in aliam partem humorem auertendo prosunt. si non sunt consecuta: noxam augent. Itaque nisi in quibus prompte id facere consuerunt / non sunt adhibenda. Potui si febricula est: aqua pura calida uel ea, quæ ipsa quoque astringat: dari debet. si non est: uinum lene austerum. Si pluribus diebus nihil remedia alia inuenerunt: uetusque iam uicium est: aquæ bene frigida potio assumpta ulcera astringit: & initium secundæ ualitudinis facit. Sed ubi uenter suppressus est: protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies / pessimiq; odoris descendere. solet purus sanguis profluere. si superius uicium est: aluus aqua mulsæ duci debet. tunc deinde eadem infundi / quæ supra comprehensa sunt. Valens quæ est etiam aduersus ulcera intestinorum minii gleba cum salis hemina contrita. Si minus: mixta his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluat: cibi portionesque esse debent: quæ astringant.

DE leuitate intestinorum.

CAPVT. XVI.

**E**Xtortimibus interdum intestinorum leuitas oritur: quæ continere nihil possunt: & quicquid assumptum est / imperfectum protinus reddunt. Id interdum ægros trahit: interdum præcipitat. In hoc utique adhibere oportet comprimantia: quo facilius tenendi aliquid intestinis uis sit. Ergo & super pectus ponetur sinapi: exulcerataque cute / malagma: quod humorem euocet: & ex uerbena decoctis aqua desidat: & cibos portiones quæ assumat: quæ aluum astringunt. & frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere: ne simul his omnibus admotis uicium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debebunt aliquibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore uentris: tum in hoc præcipue necessarium est: non quotiens libet desiderare: sed quo



tiens necesse est: ut hæc ipsa mora inconsuperudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque quod æque ad omnes similes affectus pertinet; in hoc maxime seruandum est: ut cum pleraque utilia insuauia sint: qualis est plantago & rubi & quicquid mali corio mixtum est: ea potissimum in his dentur quæ maxime æger uolet. Deinde si omnia ista fastidiet: ad excitandam cibi cupiditatem interponatur aliquid minus utile: sed magis gratum. Exercitationes: frictiones huic quoque morbo necessariae sunt: & cum his sol: ignis: balneum: uomitus: ut Hippocrati uisum est etiam albo ueratro: si cætera parum proficient euocatus.

## DE lumbricis aluum occupantibus. CAPVT. XVII.

**N**on nunquam autem lumbrici quoque occupant aluum: hi quoque modo ex inferioribus partibus: modo foedus ore redduntur. Atque interdum latos eos: qui peiores sunt: interdum teretes uidemus. si lati sunt: aqua potui dari debet: in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit: aut cui adiectum sit contritum uel hyssopum uel piperis acetabulum: scimonæ paulum. Vel etiam pridie cum multum allium ediderit: uomat. Postero quoque die mali punici tenues radículas colligat quantum manu comprehendet: eas que contusas in aquæ tribus sextariis decoquat: donec tertia pars supersit. Huc adiciat nitri paulum & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis duas portiones sumat aut aquæ uel muræ duræ sic adiectæ. tum desidat subiecta calida aqua in pelue. si uero teretes sunt: qui pueros maxime exercent: & eadem dati possunt & quædam leuiores: ut contritum semen urticæ: aut brassicæ: aut cumini cum aqua: uel menta: uel absinthium decoctum: uel hyssopum ex aqua mulsæ: uel nasturcii semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum & allium prodest: uel malux oleum subter dedisse.

## DE tenesoo intestinarum morbo. CAPVT. XVIII.



## QUARTVS.

**E**st autem aliud leuius omnibus proximis: de quibus supra dictum est: quod tenasmon graeci uocant. id neque acutis neque longis morbis annumerari debet: cum & facile tollatur: neque unquam per se iugulet. in hoc aequae atque torminibus frequens desidendi cupiditas est: aequae dolor ubi aliquid excernitur. descendunt autem pituitae muccis quae similia: interdum etiam leniter subcruenta. sed his interponuntur non nunquam ex cibo quoque recte coacta. desiderare oportet in aqua calida: saepiusque ipsum manum nutrire. cui plura medicamenta idonea sunt. butyrum cum rosa. agacia ex aceto liquata. emplastrum id quod tetrapharmacō graeci uocant/rosa liquatum. alumen lana circumdatum & ita appositum. eademque ex inferiore parte indita: quae torminum auxilia sunt. eadem uerbenae decoctae: ut inferiores partes foueantur. alternis uero diebus aqua: alternis leue & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida. pro prior ratio uictus talis / qualem in tormina supra praecipimus.

DE uentris fluxu & curatione

CAPVT: XX

**L**euior etiam dum recens deiectio est: ubi & liquida aluus & saepius quam ex consuetudine fertur. atque interdum tolerabilis dolor est: interdum grauissimus. idque peius est. sed uno die fluere aluum saepe pualitudine est: atque etiam plurius: dum febris absit: & intra septimum diem id conquiescat. purgatur enim corpus: & quod intus laesurum erat / utiliter effunditur. uerum spatium piculosum est. Interdum enim tormina ac febriculas excitat: uiresque consumit. primo die quiescere satis est: neque impetum uentris prohibere. si per se desit: balneo uti: paulum cibi capere. si mansit: abstinere non solum a cibo: sed etiam a portione. Postero die si nihilo minus liquida aluus est: aequae conquiescere: paulum astringentis cibi sumere: tertio die in balneum ire: uehementer omnia praeter uentrem perfricare: ad ignem lumbos scapulasque ad mouere: cibis uti / sed uentrem contrahentibus: uino non multum mero co. Si postero quoque die fluat: plus edisse: sed uomere etiam

O. I.



extoto / donec cōquiescat . Cōtra siti: fame: uomitu uiri . Vix enim fieri potest / ut post hanc animaduersionem alius nō cōtrahatur . Alia uia est ubi uelis supprimere . Cēnare: deinde uomere: postero die in lecto conuiescere . uespere ungi . sed leniter . deinde panis circa selibram ex uino amineo mero sumere . tum assum aliquid: maximeq; auem: & postea uinum idem bibere aqua pluuiali mixtum: idq; usq; quintum diem facere: iterum que uomere . Frigidam autem assidue potionem esse debere contra priores auctores Asclepiadas affirmant & quidem q̄ frigidissimam . Ego experimentis quēq; in se credere debere existimo calida potius an frigida utatur . Interdum autem euenit: ut id pluribus diebus neglectum / curari difficilius possit . a uomitu oportet incipere: deinde postero die uespere / tepido loco ungi: cibum modicum assumere: uinum meracum q̄ asperrimum: imposita in super uentrem habere cum caera toruram . In hoc autem affectu corporis neque ambulatione: neque frictione opus ē . uehiculo sedisse uel magis etiā equo prodest . Neq; enim ulla res magis intestina confirmat . Si uero etiam medicamentis utendum est: aptissimum est id: quod ex pomis fit . Vindemiæ tempore in grande uas concicienda sunt pira atq; mala siluestria . si ea non sunt: pira tarentina uiridia: uel signina mala scandiana uel amerina: myrapia: hisq; adicienda sunt cotonea: & cum ipsis cort: cibis suis punica: sorba: & quibus magis utimur etiam torminalia: sic ut hæc tertiam ollæ partem teneant . tum deinde ea musto implenda est: coquendumq; id donec omnia quæ indita sunt / liquata in unitatem quandam coeant . Id gustui non insuaue ē & quādoq; opus est assumptum leuiter sine ulla stomachi noxa uentrem tenet . duo aut tria cochlearia uno die sūpsisse satis ē . Alterū ualentius genus myrti baccas legere: ex his uinum exprimere: id decoquere ut decima pars remaneat: eiusq; cyathum sorbere . tertium quod quādoq; fieri potest: malum punicū excuare: exēptisq; ōnibus seminibus: mēbranas quæ iter ea fuerūt . iterū cōiacere tū īfundere cruda oua: tudiculaq; miscere . dei malū ip



76  
 . QVARTVS.

sum super prunam imponere. quod dum humor intus est non  
 adunatur. Vbi siccum esse coepit: remouere oportet: extrac-  
 tum: que cochleari quod intus est: edisse. Aliquibus adiectis  
 ma us mome. tum habet. Itaq; etiam piperatum conficitur: mi-  
 scetur: cum sale & pipe. est quid ex his edendum. est pulicu-  
 la etiam: cum qua paulum ex fauo uetere coctum sit: & lenticu-  
 la cum mali corio cocti: rubi que cacumina in aqua decocta  
 & ex oleo atq; aceto assumpta: efficacia sunt. atq; ea aqua: in  
 qua uel palmulae / uel malum coroneum / uel arida sorba / uel  
 rubi decocti sunt. potata. Quod genus significo quotiens  
 portionem dandam esse dico / quae astringat. Triticum quoq; he-  
 mina in uino amineo austero decoquitur: id que triticum ieru-  
 so acitienti datur. superq; id / uinum id sorbetur. quod iure  
 ualent. Simis medicamentis annumarari potest. atq; etiam po-  
 tui datur uinum signinum: uel resinatum austerum: uel quodli-  
 bet austerum. Contunditurq; cum corticibus seminibusque suis  
 punicum malum: u no tali miscetur. id q; uel merum sorbet  
 aliquis: uel b. bit mixtum. sed medicamentis uti nisi in uehe-  
 mentibus malis superuacuum est.

De uuluz morbo & curationibus CAPVT. XX.

**E**X uulua quoq; foeminis uehemens malum nascitur: proxi-  
 meq; a stomacho uel afficitur hanc uel corpus afficit. In-  
 terdum etiam sic exanimat: ut tanq; comitiali morbo proster-  
 nat. Distat tamen hic casus: eo quod neq; oculi uertuntur: nec  
 spumae profluunt: nec nervi distenduntur. sopor tantum est.  
 idque quibusdam foeminis crebro reuertens perpetuum est.  
 Vbi incidit si satis uirium est: sanguis missus adiuuat. Si pa-  
 rum est: cucurbitulae tamen defigendae sunt in inguinibus. Si  
 diutius aut iacet aut alioqui iacere consuevit: ad mouere opor-  
 tet natis extinctum ex lucerna linamentum: uel aliud ex iis  
 quae foedioris esse odoris rettuli: quod mulierem excitet. Idem  
 que aquae frigidae perfusio efficit. adiuuat quoque ruta contrita  
 cum melle: uel excyprino caeratum: uel quodlibet callidum &  
 humidum cataplasma naturalibus pube tenus impositum inter



haec etiam p̄ficare coxas & poplites oportet. Deinde ubi ad se redit: circumcidendum uinum est in totum annum. etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie utendum totius: quidem corporis / praecipue uero uentris & poplitum. Cibus ex media materia dandus. Sinapi super inum uentrem tertio quoque aut quarto die imponendum donec corpus rubeat. Si durities manet: mollire commodè uidetur solanum in lac demissum deinde coneritum: & caera alba atque medulla ceruina cum iuxino: aut seuum taurinum uel caprinum cum rosa mixtum. Dandum potui etiam uel castoreum est: uel git: uel anetum. Si parum pura est: purgatur iunco quadrato. si uero uulua exulcerata est: ceratum ex rosa fiet: & recens suilla a deps & ex ouis album misceatur: idq; apponatur: uel album ex ouo cum rosa mixtum: adiecto quo facilius consistat contritae rose puluere. Dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet: remedio sunt cucurbitulae: cute incisa inguinibus uel etiam sub maxillis admotae. si maligna purgatio est: subiicienda sunt coeuntia. Id faciunt etiam albae oliuae & nigrum papauer cum melle assumptum & gummi cum trito semine apii liquatum & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus uesciæ doloribus idoneæ potiones sunt: quæ ex odoribus fiunt: idest spica nardi: croco cinnamo: casia / similibusq;. Idemq; etiã decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est & sanguis profluit: etiam sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admotæ cucurbitulae cute incisa. At cum urina sup̄ potionum modum etiam sine dolore profluens maciem & periculum facit: tenuis est: opus est exercitatione & frictione maximeq; in sole uel ad ignem. Balneum ratum esse debet: neq; longa in eo moratibus comprimens. Vinum austerum meracum / præstatem frigidum: per hyemem egelidum: sed tantum quantum minimum sit. In finita aluus quoque uel ducenda uel lacte purganda est. Si crassa urina est: uehementior esse debet & exercitatio & frictio: longior in balneo mora: cibus opus



77  
 .QVARTVS.

est teneris. uinum idem. In utroque morbo uitanda omnia sunt:  
 quæ urinam mouere consueverunt.

DE nimia profusione seminis ex naturalibus. CAPVT. XXI

**E**st etiam circa naturalia uitium: nimia profusio seminis.  
 quod sine uenere / sine nocturnis imaginibus sic fertur: ut  
 interpolito spatio tæbe hominem consumat. In hoc affectu sa-  
 lutares sunt uehementes frictiones: perfusiones: natationes q̃  
 quam frigidissimæ. neq̃ cibi: nec potio nisi frigida assumpta.  
 Vitare autē oportet cruditates: omnia infantia. nihil ex iis  
 assumere: quæ contrahere semen uidentur: qualia sunt / siligo:  
 simila: oua: alica: amyllum: omnis caro glutinosa: piper: eru-  
 ca: bulbi: nuclei pinei. Neq̃ alienum est fouere inferiores par-  
 tes aqua decocta ex uerbenis comprimantibus. ex iisdem ali-  
 qua cataplasmata imo uentri / inguinibus que circumdare: præ-  
 cipueq̃ ex aceto rutam uitare: & ne supinus obdormiat.

DE coxarum morbis & curationibus. CAPVT. XXII.

**S**uperest ut ad extremas partes corporis ueniam: quæ arti-  
 culis inter se conferuntur. initium a coxis faci am. Hæc  
 ingens dolor esse consueuit. Is que hominem sæpe debilitat:  
 & quosdam non dimittit. Eoq̃ id genus difficillime curatur:  
 quod fere post longos morbos uis pestifera huc se inclinat.  
 quæ ut illas partes liberat: sic hanc ipsam quoq̃ affectam præ-  
 hendit. Fouendum primum aqua calida est. deinde utendū cali-  
 dis cataplasmatibus. Maxime pdesse uidetur aut cum hordeacea  
 farina / aut cū ficu ex aqua decocta mixtus / capparis cortex cō-  
 cisus: uel lolii farina ex uino diluto cocta & mixta cū acida fe-  
 ce. quæ qua refrigerant: iponere noctu malagmata cōmodius  
 ē. Inulæ quoq̃ radix contusa & ex uino austero postea cocta  
 & latte sup coxā imposita inter ualentissima auxilia ē. si ista  
 non soluerunt: sale calido & humido utendum est. Si ne sic



quidem finitus dolor est: aut tumor ei accedit: incisa cute ad mouenda sunt cucurbitulae: mouenda urina. Alius si compressa est: ducenda. Vltimum est & in uteribus quoque morbis efficacissimum: tribus aut quattuor locis super coxam cutem candentibus ferramentis exulcerare. Sed frictione quoque utendum est / maxime in sole: & eodem die saepius: quo facilius ea quae coeundo nocuerunt: dirigantur. Eaque si nulla exulceratio est etiam ipsis coxis sicut & ceteris partibus adhibenda est. Cum uero saepe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit: ut materia inutilis euocetur: illud perpetuum est: non ut primum fieri potest huius generis ulcera sanare: sed ea trahere / donec id uitium: cui per haec opitulamur: conquiescat.

DE genuum doloribus & cura.

CAPVT. XXIII.

**C**oxis proxima genua sunt. in quibus ipsis non nunquam dolor esse consuevit. In hisdem autem cataplasmatibus cucurbitulisque praesidium est: sicut etiam cum in humeris aliis uel commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei cui genua dolent: inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores ubi inueterauerunt / uix citra uestionem finiuntur.

DE Articulorum doloribus in manibus pedibusque

CAPVT. XXIII.

**I**n manibus pedibusque articulorum uitia frequentiora longioraque sunt. quae in podagris chiragris uel esse consue runt. Ea raro uel castratos uel pueros ante feminae coitum: uel mulieres / nisi quibus menstrua suppressa sunt: tentant. Vbi sentiri ceperunt: sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum saepe annuam: non nunquam perpetuam ualitudinem praestat. Quidam etiam cum asinino lacte: poro se eluissent: in perpetuum hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno a uino mulso: uenere / sibi temperassent: securitatem totius uitae consecuti sunt. Id quae utique post primum dolo



rem seruandum est etiam si quieuit. Quod si iam consueto eius facti est: potest quidem aliquis esse securior iis temporibus. quibus dolor se remisit. Maiorem uero curam adhibere debent iis: quibus id reuertitur. Quod fere uere autumno ue fieri solet. Cum uero dolor urget: manu gestari debet: deinde fieri. in ambulatione leui se dimouere. & si podagra est: interpositis temporibus exiguis inuicem modo sedere / modo ingredi. tum antequam cibum capiat sine balneo loco calido leuiter perfricari: sudare: perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia interpositis rebus urinam mouentibus: quotiensque plenior est: euomere. Vbi dolor uehemens urget: interest sine tumore is sit: an tumor cum calore: an tumor iā etiam ob caluerit. Nam si tumor nullus est: calidis fomentis opus est. Aquam marinam uel muriam durā feruefacere oportet: deinde in peluem conicere: & cum iam homo pati potest: pedes demittere: superq; / pallam dare & uestimento tegere: paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadem aqua leuiter infundere: ne calor intus destituat: ac deinde noctu cataplasma ta calfacientia imponere: maxime que ibisci radicem ex uino coctam. sin uero tumor / calorq; est: utiliora sunt refrigerantia: recte que in aqua quam frigidissima articuli continentur. sed neq; quotidie / neq; diu fit: ne nerui indurescant. Imponendum uero est cataplasma: quod refrigeret. Neq; tamen in hoc ipso diu permanendum: sed ad ea transeundum: quae sic reprimunt / ut emolliant. Si maior est dolor: papaueris cortices in uino coquendi / miscendiq; cum cærato sunt: quod ex rosa factum sit. Vel cærae & adipis suillae tantundem una liquā dum: deinde his uinum miscendum: atq; ubi quod ex eo impositum est: incaluit: detrahendum & subinde imponendum aliud est. Si uero tumores etiam obcaluerunt & dolent: leuat spōgia quae imposita subinde ex oleo uel aceto uel aqua frīgida exprimitur: aut pari portione inter se mixta / pix: caera: alumen. Sunt etiam plura idonea manibus pedibusque malagma ta. Quod si nihil super imponi dolor patitur: id quod sine



tumore est: fouere oportet spongia: quæ in aquam calidam de  
mittatur: in qua uel papaueris cortex / uel cucumeris siluestris  
radix decocta sit. tum inducere articulis crocum cum succo  
papaueris & ouillo lacte. at si tumor est: foueri quidem debet  
aqua egelida: in qua lentiscus / alia uel uerbena ex reprimenti  
bus decocta sit. induci uero medicamentum ex nucibus amaris  
cum aceto tritis: aut ex cerussa: cui contritæ herbæ muralis  
succus sit adiectus. Lapis etiam qui carnem exedit: quem sar  
cophagon graeci uocant: excisus sic ut pedes capiat: demissos  
eos cum dolent: retentosq; ibi / leuare consueuit. Ex quo in asi  
a lapidi tasio gratia est. Vbi dolor & inflammatio se remise  
runt. quod intra dies quadraginta fit: nisi uitium hominis ac  
cessit: modicis exercitationibus: abstinentia: unctiōibus leni  
bus utendum est / sic ut etiam acopo uel liquido cærato cypri  
no articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum  
est. Quibus uero articulorum dolor certis temporibus reuertri  
tur: hos ante & curioso uictu cauere oportet / ne inutilis mate  
ria corpori supersit & crebriore uomitu. & si quis ex corpore  
metus est: uel alui ductione uti / uel lacte purgari. Quod Era  
sistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus  
cursus pedes replet: cum euident sit omni purgatione non su  
periora tantummodo: sed etiam inferiora exinaniri. Ex quo  
cunq; autem morbo quis inualescit: si tarde confirmatur: uigi  
lare prima luce debet: nihilominus in lecto conquiescere. cir  
ca tertiam horam leuiter unctis manibus corpus permulcere.  
Deinde delectationis causa quantum iuuat ambulare circunci  
sa omni negotiosa cogitatione uel actione. tum gestari diu:  
multa fricatione uti: loca: cælum: cibos sæpe mutare. Vbi tri  
duo / quatrduo uel uinum bibit: uno aut etiam altero die inter  
ponere aquam. Per hæc enim fiet: ne in uitia tabem inferentia  
incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero co  
ualuerit: periculose uitæ genus subito mutabit & inordinate a  
get. Paulatim ergo debet omnis his legibus eo transire: ut  
arbitrio suo uiuat.



## CORNELII CELSI DE MEDICINA LIBER

## QVINTVS INCIPIT.

**D**Ixi de iis malis corporis: quibus uictus ratio maxime subuenit. Nunc transeundum est ad eam medicinæ partem: quæ magis medicæ mentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt & Erasistratus & ii qui se empiricos nominauerunt: præcipue tamen Erophilus. deduxitque ab illo uiri: adeout nullum morbi genus his curarent. Multaque etiam de facultatibus medicamentorum memoriæ perdiderunt. qualia sunt uel Zenonis uel adriæ uel apollonii. qui Mys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit. & cum omnia fere medicamenta stomachum laedant malique succi sit. ad ipsius uictus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verum ut in plerisque morbis utilius est. sic multa ad modum corporibus nostris incidere consuerunt: quæ sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit: quod omnes medicinæ partes ita iunctæ sunt: ut ex toto separari non possint: sed ab eo nomen trahant: a quo plurimum petunt. ergo ut illa quæ uictu curat aliquando medicamentum adhibet: et illa quæ præcipue medicæ mentis pugnat adhibere etiam rationem uictus debet. quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant: ac sæpe simplicia opulentur: sæpe mixta: non alienum uidetur proponere & nomina & uires & mixturas eorum: [quo minor ipsius curationis ex sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum ex quibus medicamenta fiunt: & primo de iis: quæ sanguinem



Supprimunt.

CAPVT. I.

**S**anguinem supprimunt atramentum sutorium quod graeci calcanton appellant. chalcitis. acacia & ex aqua licium tus. aloë. gummi. plumbum combustum. porrum. herba sanguinalis. creta uel cimolia uel figularis. mysi. frigida aqua. uinum. acetum. alumen. melinum. squama & ferri & aris. atque huius quoque duae species sunt: alia tantum aris: alia rubri aris.

Quae uulnus glutināt. CAPVT. II

**G**lutinant uulnus. myrra: tus: gummi: praecipueque acanthinum: psylleum: tragacantha: cardamomum: bulbi: lini semen: nasturcium: oui album: gluten: styocolla: uitis alba: contusa cum testis suis cochlex: mel coctum: spongia: uel ex aqua frigida: uel ex uino: uel ex aceto expressa: ex hildem lana sucida: si leuis plaga est: etiam aranea: alumen & scissile: quod sciston uocatur: & liquidum: melinum: auripigmentum arugo: chalcitis: atramentum sutorium.

Quae concoquunt et mouent pus. CAPVT. III

**C**oncoquunt & mouent pus. nardum. myrra. costus. balsamum. galbanum. propolis. styrax. turis & fuligo & co rex. bitumen. pix. sulphur. resina. seuum. adeps: oleum.

Quae aperiunt uulnera. CAPVT. IIII.

**V**ulnera aperiunt tanquam ora in corporibus: quod sto ma graeci dicunt: cynamomum. balsamum: panacis: iuncus quadratus: puleium: flos albae uiole: bdellia: galbanum resina terebinthina & pinea: propolis: oleum uetust: pip: pyretum: chamepitis: uua timinia: sulphur: alumen: rutae semen:



## .QVINTVS

80

Quae purgant .

### CAPVT . V .

**P**urgant ærugo: auripigmentum: quod arsenicon a græcis nominatur. Huic autem & sandaracæ in omnia eadem vis: sed ualidior est squama æris: pumex: iris: balsamum: styrax: turis cortex: resina & pinea & terebinthina liquida: cenanthe: lacerti stercus. sanguis columbæ & palumbi & hirundinis: ammoniacum: bdellium: quod in omnia idem quod ammoniacum potest: sed ualentius est: abrotanum. ficus arida: coccum: gnidium: scobis eboris: omphacium: radícula: coagulum: sed maxime leporinum: cui eadem quae caeteris coagulis facultas. sed ubique ualidior est: fel: uicellus crudus: cornu ceruinum: gluten taurinum: mel crudum: mistios: chalcitis: crocum: uua timinia: abrotanum: spuma argenti: galla: squama æris: lapis haematites: minium: costum: sulphur: pix cruda: seuum: adeps: oleum: ruta: porrum: lenticula: eruum:

Quae rodunt.

### CAPVT . VI

**R**odunt aumen liquidum: sed magis rotundum. aerugo. chalcitis. myli. squama æris: sed magis rubri: æs combustum. sandaraca. minium synopicum. galla. balsamum. myrra. turis cortex. galbanum. resina terebinthina humida. piper utrunque: sed rotundum magis. cardamomum. auripigmentum. calx. nitrum. & spuma eius. apii semen. narcissi radix. omphacyum. alcyonium. oleum ex amaris nucibus. allium. mel crudum. uinum. lentiscus. squama ferri. fel taurinum. scamonea. uua timinia. cynamomum. styrax. cicuræ semen. resina. narcissi semen. fel. nucs amarae. oleumque earum. atramentum sutorium. chrysocola. ueratrum. cinis.

Quae exedunt corpus .

### CAPVT . VII .

**E**xedunt corpus acaciæ succus: hebenus: ærugo: squama æ



ris: chrysocola: cinis: cyprius: nitrum: cadmia: spuma argenti: hypocystis: diphryges: sal: auripigmentum: sulphur: cicuta: sandaraca: salamandra: alcyonium: aeris flos: chalcitis: atramentum sutorium: ochra: calx: acetum: galla: alumen: lac caprifici / uel lactuæ marinæ: quæ tichymallos a græcis nominatur: alcyonium: fel: turis fuligo: spodium: lenticula: mel: oleæ folia: marrubium: lapis haematites & phrygius & tasius & scissilis: mysi: uinum: acetum.

Quæ adurunt.

CAPVT. VIII.

**A** Durunt auripigmentum: atramentum sutorium: chalcitis: mysi: ærugo: calx: carta combusta: sal: squama æris: fex combusta: myrra: stercus & lacerti & columbæ & palumbi & hirundinis: piper: coccum gnidini: allium: diphryges: iac utrunque: quod proximo capite supra comprehensum est: uerum & album & nigrum: cantharides: corallium: pyretrum: tus: salamandra: eruca: sandaraca: uua timinia: chrysocola: ochra: alumen scissile: ouillum stercus: oenanthe.

Quæ crustas ulceribus inducunt.

CAPVT. VIII.

**E** Adem fere crustas ulceribus tanquam igne adustis inducunt: sed præcipue chalcitis utique si cocta est: flos æris: ærugo: auripigmentum: mysi & id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resoluunt:

CAPVT. X.

**C** Rustas uero has resoluit farina triticea cum ruta uel porro aut lenticula: cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiant ea: quæ in aliqua parte corporis coierunt.

CAPVT. XI.

**A** D discutienda uero ea: quæ in corporis parte aliqua co



81  
QVINTVS.

erunt: maxime possunt: abrotanum: helenium: amaracus: alba  
niola: mel: liliū: sampucus: cyprius: lac: fertula campana:  
serpillum: cupressus: cedrus: iris: uiola purpurea: narcissus:  
rosa: crocum: passum: iuncus quadratus: wardū: cynamomū:  
casia: ammoniacum: cæra: resina: uua timinia: spuma argenti:  
styrax: ficus arida: tragoriganus: lini & narcissi semen: bitu  
men: sordes ex gymnasio: pyrites lapis aut molaris: crudus ui  
tellus: amaræ nuges: sulphur.

Quae euocant & educunt

CAPVT. XII.

**E** Vocat & educit: ladanum: alumen rotundum: hebenus: li  
ni semen: omphacium: fel: chalcitis: bdellium: resina tere  
binthina & pinea: p ropolis: ficus arida decocta: stercus colū  
bae: pumex: farina lolii: grossi in aqua cocti: elaterium: lauri  
baccae: nitrū: sal.

Quae exasperata leuent.

CAPVT. XIII.

**L** Euat id quod exasperatum est: spodium: hebenus: gum  
mi: oui album: lac: tragacanthum.

Quae carnem nutriunt & ulcus implent. CAPVT. XIII.

**C** Arnem alit & ulcus implet: resina pinea: ochra ætice:  
uel asterace: caera: butyrum.

Quae molliunt.

CAPVT. XV.

**M** Olliunt æs combustum: terra erythra: nitrū. papau  
ris lacrima: ammoniacum: bdellium: caera: seuum: adeps: o  
leum: ficus arida: sesamum: fertula campana: narcissi & ra  
dix & semen: rosæ folia: coagulum: uitellus crudus: amaræ nu  
ces: medulla omnis: stibis: pix: cochlea cocta: cicutæ semen:  
plumbi recrementum: scorian molybdi græci uocant: panacis:  
cardamomum: galbanum: resina: uua timinia: styrax: iris: bal  
samum: sordes ex gymnasio: sulphur: butyrum: ruta.

p. i.



Quae cutem purgant.

CAPVT. XVI.

**C**utem purgat mel: sed magis: si est cum galla: uel eruo:  
uel lenticula: uel marrubio: uel iride: uel rutar: uel nitro:  
uel æruginē.

DE mixturis simplicium rerum & de ratione ponderum & quid  
malagma & emplastrum & pastillus inter se differant

CAPVT. XVII.

**E**xpositis simplicibus facultatibus dicendum est quemad-  
modum misceantur: quae ex his fiant. Miscentur autem  
uariae: neque huius ullus modus est: cum ex simplicibus alia de-  
mantur: alia adiiciantur: iisdemque seruatis / ponderum ratio  
mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit: in-  
numerabilia mixturarum genera sunt. quae comprehendere si pos-  
sent: tamen esset superuacuum. Nam & idem effectus intra pau-  
cas compositiones sunt: & mutare eas cuilibet cognitis facul-  
tatibus facile est. Itaque contentus iis ero quas accepi uelut no-  
bilissimas. In hoc autem uolumine eas explicabo: quae uel desi-  
derari in prioribus potuerunt: uel ad eas curationes pertinent:  
quas protinus hic comprehendam: sic / ut tamen quae magis  
communia sunt / simul iungam. Siqua singulis uel etiam paruis  
accommodata sunt: in ipsorum locum differam. Sed & antea  
sciri uolo: in uncia pondus denariorum septem esse. Vnius de-  
inde denarii pondus diuidi a me in sex partes idest sex unci-  
as: ut idem in uncia denarii habeam quod graeci habent in eo:  
quem obolon appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo  
plus dimidio scripulo facit. Malagmata uero atque emplastra  
pastilli: quos trochiscos graeci uocant cum plurima eadem  
habeant: differunt eo quod malagmata maxime ex odoribus  
eorumque etiam sarculis. Emplastra pastilli: magis ex quibusdam me-  
tallcis fiunt. deinde malagmata cōtusa abunde mollescunt: nā  
super integrā cutē iniiciuntur. Laboriose uero cōteruntur ea ex  
quibus emplastra pastilli: fiunt: ne laedat uulnera cū imposita sunt.

Vincit  
Denarius

Obolon  
Scripulus



82.  
 .QVINTVS.

Inter emplastrum aut & pastillum hoc interest. quod emplastrum utique liquati aliquid accipit. in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum aut siquis alius non pinguis humor accessurus est. & ea rursus ex eo teruntur. Ea uero quae liquari possunt ad ignem simul liquantur: & siquid olei misceri debet: tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt quae separatim fieri debuerunt: in unum omnia miscentur. At pastilli haec ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui aut uino uel aceto coquantur: & rursus cocta inarescunt. Atque ubi utendum est eiusdem generis humore diluuntur. tum emplastrum imponitur. pastillus illinitur aut alicui molliori: aut cerato miscetur.

DE MALAGMATIS. CAPVT. XVIII.

Malagma aduersum calidas podagras:

**H**is cognitis primum malagmata subiiciam: quae fere non sunt refrigerandi: sed calfaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit ad calidas podagras aptum. Habet gallae & immaturae & alterius: coriandri seminis: cicutae: lacrimae aridae: gummi: singulorum plenum acetabulum. cerati elotii: quod pepiemenon graeci uocant: selibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quaedam digerunt materiam: quaedam extrahunt: quae epispastica uocantur. pleraque certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

**S**i materia extrahenda est: ut in hydropico: in lateris dolore: in incipiente abscessu: in suppuratione quoque mediocri: aptum est id quod habet resinae aridae: nitri: ammoniaci: galbani: singulorum pondus: ceræ pondus. Aut in quo haec sunt: arginis rasae: turis: singulorum. P. XII. ammoniaci salis. P. XVI. squamae aeris: ceræ: singulorum. P. XVIII. resinae aridae. P. XXII. aceti cyathus. Ide praestat cum mini farina cum struthio

Malagma ad iecur dolens

& melle. p. ii.



**S**iccur dolet: id in quo est balsami lacrimae. P. XXII. costi: cinnamomi: casiae: corticis myrrae: croci: iunci rotundi: balsami feminis: iridis illiricae: cardamomi: amomi: nardi: singulorum. P. XXVI. Quibus adicitur nardum unguentum: donec caerati crassitudo sit: Et huius quidem recens usus est: Si uero seruandum est: resinae terebinthinae. P. XXVI: caerae. P. XX. ex uino leni contunduntur.

Malagma ad lienem.

**A**t si lienis torquet: glandis: quam balanon graeci uocant: cortex & nitrum paribus portionibus cōtunduntur: resperguntur que aceto quam acerrimo. Vbi caerati crassitudinem habet: linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur & sic imponitur: supraque farina hordeacea iniicitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet: ne lienem consumat. Satiusque est id bis aut ter fieri. Communem autem & iocineri & lieni & abscessibus & strumae: parotidibus: articulis: calcibus quoque suppurantibus / aut aliter dolentibus: etiam cōcocti oni uentris Lysias composuit ex hyssopi: panacis: styracis: galbani: resinae: singulorum. P. XII. ammoniaci: bdellii: cerae: feni taurini: iridis aridae. P. XIII. cactirios acetabulo: piperis granis quadraginta. Quae cōtrita irino unguento tēpantur.

Malagma ad laterum dolores

**A**d laterum autem dolores compositio est Apollophanis in qua sunt resinae terebinthinae: turis fuliginis: singulorum. P. XIII. bdellii: ammoniaci: iridis: feni uitulini: aut caprini a renibus sicci: singulorum. P. XIII. Haec aut eadem omnem dolorem leuant: dura emolliunt: mediocriter calefaciunt. Ad idem latus Andree quoque malagma est: quod etiam resoluit: educit humorem: pus maturat: ubi id maturum est: cutem rumpit: ad cicatricem pducit. prodest impositum minutis / maioribusque abscessibus: item articulis: ideoque & coxis & pedibus dolentibus. item siquid in corpore collisum est. reficit. praecordiis quoque dura & inflata emollic: ossa extrahit. ad omnia denique ualet: quae adiuuare calor potest. id habet. cerae. P. XI. uisci



83  
QVINTVS.

sycamini: quam alias sycomorum uocant: lacrimae: singulorū  
P. XI. piperis et rotundi et longi: ammoniaci: thymiamatis:  
bdelli: iridis illiricae: cardamomi: amomi: xilobalsami: tu-  
ris masculi: myrrae resinae aridae: singulorum .P. XX. pyre-  
tri: cocci: gindii: spuma nitri: salis ammoniaci: aristolochiae  
creticae: radicis ex circumere agresti: resinae terebinthinae: liq-  
da singulorum .P. XXX. Quibus adiicitur unguenti irini  
quantum satis est ad ea mollienda atq; cogenda.

Malagmata ad resoluenda quae astricta sunt: & mol-  
lienda quae dura sunt: & digerenda quae coeunt.

**P** Recipuum uero est ad resoluenda quae astricta sunt: mol-  
lienda quae dura sunt: digerenda quae coeunt id quod  
ad Polyarchum auctorem refertur. Habet iunci quadrati:  
cardamomi: turis fuliginis: amomi: caerae: resinae liquidae  
pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

**A** Aliud ad eadem: nilei: croci magmatis: quod quasi recte-  
mentum eius est. P. XIII. ammoniaci: thymiamatis:  
caerae: singulorum .P. XXX. ex quibus duo priora  
ex aceto teruntur: caera cum rosa liquatur: & tum omnia  
iunguntur.

Malagma mosci ad molliendum.

**P** Proprie etiam dura mollic id quod mosci esse dicitur.  
Habet galbani unciam: turis fuliginis. P. Z. caerae: am-  
moniaci: thymiamatis trientes: picis aridae. P. II. aceti he-  
minas tres.

Malagma medi ad digerenda quae coeunt.

**F** ertur etiam ad digerenda quae coeunt sub auctore me-  
do: quod habet caerae. P. Z. panacis. P. semis: squamæ  
aeris: aluminis rotundi: item scissilis: singulorum .P. I. plu-  
bi combusti. P. I. & semis

Malagma Panthemi ad eadem.

**A** D eadem panthemus utebatur: calcis. P. semis. sina-  
pis contriti: item foeni graeci: aluminis: singulorū .p. I.  
p. iii.



Seni bubuli. P. II. & semis. *biapocq br. mous audonco*

Malagma ad strumas *remydg bu mnt flobit*

**A**d strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quod  
peius id malum est: mihi nusquam facile discutitur: eo plura  
esse tentata: quae in personis uarie responderunt. Andreas  
auctor est: ut haec misceantur: urticae seminis. P. XI. piperis  
rotundi: bdellii: galbani: ammoniaci: thymiamatis: resinae aridae:  
singulorum. P. XIII. resinae liquidae: caerae: pyretri: pi-  
peris longi: laetue marinae seminis: sulphuris ignem non ex-  
perti: quod apyron uocatur: fecis aridae: aceti: spumae nitri: sa-  
lis ammoniaci: sinapis: cardamomi: radicis ex cucumeris silue-  
stri: resinae: singulorum. P. XVIII. Quae ex leni uino  
contunduntur. *dg boup malagmatu domo mntu mntu*

Aliud malagma ad id ualens. *elale adnd bono*

**E**xpediuit ad idem fit: quod habet uisci: semeni: sterco-  
ris: resinae: sulphuris ignem non experti pares portiones  
Et in quo est sulphuris. P. XI. lapidis quem pyriten uocant.  
P. XIII. cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eius-  
dem pars una: sulphuris duae partes: resinae cerebathinae  
partes tres. *elale adnd bono*

Malagma ad strumam & phymata *remydg bu mnt flobit*

**A**rabis autem cuiusdam est ad strumam & orientia tuber-  
cula: quae phymata uocantur: quod haec digerit. Habet  
myrrae: salis ammoniaci: turis: resinae & liquidae & aridae:  
croci magmatis: caerae: singulorum. P. XI. lapidis eius:  
quem pyriten uocant. P. XIII. quibus quidam adiiciunt  
sulphuris. P. II. *remydg bu mnt flobit*

Malagma ad strumam & tubera & carcinodas.

**E**t etiam proficiens in struma & in iis tuberculis: quae di-  
ffaciliter concoquuntur: & in iis: quae carcinoda uocan-  
tur: quod ex his constat. sulphuris. P. XII. nitri. P. XIII.  
myrrae. P. XVI. fuliginis turis. P. semis: salis ammoniaci.  
P. Z. caerae. P. I. *remydg bu mnt flobit*

Malagma protarchi ad parotidas & fauam & mala ulcera.



84  
QVINTVS

**P** Rotarchus autem ad parotidas etq; tubercula: quæ melice  
ra: id est faui uel phymata nominatur: item mala ulcera:  
pumicis: resinæ pineæ liquidæ: turis fuliginis: spumæ nicti: iri  
dis: singulorum. P. XVIII. cū cæra. P. XVIII. miscebat:  
hisq; olei cyathum & dimidium adiciebat.

Malagma aduersus panum & phymata.

**A** T aduersus panum tum primum orientem: quod phyge  
rron græci uocant: & omne tuberculum: quod phyma no  
minatur: misceatur ochra: quæ attice nominatur cum duabus  
partibus similæ: his que contunditur: subinde mel instillatur:  
donec malagmatis era siccudo sit.

Malagma aduersus phymata.

**D** Iscutit etiam omne tuberculum: quod phyma uocatur: id  
quod habet calcis: nicti spumæ: piperis rotundi: singulo  
rum. P. XI. galbani. P. XII. salis. P. XIII. quæ excipiun  
tur cærato ex rosa facto.

Malagma ad supprimendum omne quod abscedit.

**S** Vpprimetq; omne quod abscedit id: in quo est galbani:  
fabæ fresae: singulorum. P. XI. myrræ: turis: ex radice  
capparis corticis: singulorum. P. XIII. Satisq; ōnia abscedē  
tia digerit murex combustus & bene contritus aceto subinde  
adiecto.

Malagma ad sanguinem supprimendum & phymata.

**A** T si satis sanguis subit: recte imponitur quod aduersus  
phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii: styra  
cis: ammoniaci: galbani: resinæ & aridæ & liquidæ pineæ:  
Item ex lentisci: turis: iridis singulorum. P. XII.

Malagma ad carcinodas & phymata leniēda

**C** Arcinodæ uero & phymata commodè his leniuntur: gal  
bani: uisci: ammoniaci: resinæ teribinchinæ in singulis  
P. XI. sem taurini. P. XII. cæcis combustæ q̄ maxima porti  
one: dum id siccius non adiat: quæ esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

**Q** Uod si facie contusa liuor suberuentus est: hæc compo



ficio nocte & die imposita tollit. Aristolochiae: thapsiae: singulorum. P. XII. bdellii: styracis: ammoniaci: chymiamatis: galbani: resinae aridae & ex lentisco liquidae: turis masculae: iridis illiciae: caerae: singulorum. P. XIII. Idem faba quae q̄ imposita proficit.

Malagmata stomachica ad aperiendum.

**S**unt etiam quaedam malagmata: quae stomachica graeci uocant: quoniam aperiendi uim habent. Quale est quod ex his constat. piperis longi: spumae: nitri: singulorum. P. XII. erisami. P. XIII. Quae cum melle miscentur. Idonea quae etiam strumae aperiendae sunt eius generis. Vementius quae ex his est id quod habet calcis. P. XIII. piperis grana sex: nitri: caerae: singulorum. P. XX. mellis. P. Z. olei heminam.

Niconis malagma ad resoluendum aperiendum quae ac purgandum.

**N**iconis quoque est quod resoluit: aperit: purgat. Habet alcyonium: sulphur: nitrum: punicem paribus portionibus. quibus tantum picis & caerae adii citur: ut fiat caerati crassitudo.

Malagma ad ossa & nerues.

**A**ssa autem Aristogenis fit ex his. Sulphuris. P. XI. resinae terebinthinae: nitri spumae & ex scylla partis interioris: plumbi eloti: singulorum. P. XII. turis fuliginis. P. XVIII. ficus aridae quam pinguiSSimae: seui taurini: singulorum. P. XVIII. caerae. P. XXI. iridis macedonicae. P. XVI. sesami fricti acetabulum. maxime quae nervis & articulis malagma conuenit.

Malagma Euticlei ad articulos & ad omnem dolorem.

**I**citur Euticlei est & ad articulos et ad omnem dolorem et ad uesticae et ad recentis cicatrice contractos articulos: quas ancyas graeci nominant. quod habet fuliginis. turis acetabulum: resinae tantundem: galbani sine furculis sesunciam ammoniaci: bdellii: singulorum. P. Z. caerae. P. semis. Aliud



## .QVINTVS

item fit: quod habet iridis: ammoniaci: galbani: nitri: singulo-  
rū. P. XXIII. resinae liquidae. P. XVI. caerae. P. XXVI.

Malagma sosagoræ ad dolores articulorum

**A**d dolores articulorum Sosagoræ: plumbi combusti: pa-  
paueris lacrimae: corticis hyoscyami: styracis: peuced-  
ni: seui: resinae: cerae pares portiones.

Chrysippi malagma ad idem ualens

**C**hrysippi: resinae liquidae: sandaracae: piperis singulorū.  
P. XXII. quibus cerae paululum adiicitur.

Clesipontis malagma ad idem ualens & ad parotidas  
& phymata & strumam.

**C**lesipontis: cerae creticae: resinae terebinthinae: nitri q̄ ri-  
berim: singulorum. P. semis: olei cyathi tres. Sed id  
nitrum ante pertriduum instillata aqua teritur & cum sextario  
eius incoquitur donec omnis humor consumatur. Potest uero  
ea compositio etiam ad parotidas: phymata: strumam: om-  
nem q̄ coitum humoris emolliendum.

Malagma ad articulos

**A**d articulos fici quoq̄ aridi partem nepetae mixtam: uel  
uuam timiniam sine seminibus cum puleio recte aliquis  
imponit.

Malagma Aristonis aduersus podagras & recentia  
phymata & omnis dolores.

**E**dem podagrae praesidia sunt. Sed ad eam fit Aristonis  
quoq̄ quod habet nardi: cinnamomi: casiae: cameleotis:  
iunci rotundi singulorum. P. XVIII. seui caprini ex itino li-  
quati. P. XXX. iridis. P. XI. quae in aceto quam acerrimo  
iacere per. XX. dies debet. Idem autem etiam recentia phy-  
mata doloresq̄ omnes discutit.

Theoseni malagma ad pedum dolores

**A** T Theosenus ad pedum dolores seui a renibus partem  
tertiam: salis partes duas miscebat: hisque membran-  
lam illitam imponebat: tum super iniiciebat ammoniacum / thi-  
miana in aceto liquatum.



Numenii malagma ad podagram caeteros que articu-  
los induratos

**A**T Numenius podagram caeterosq; articulos induratos  
hoc mollebat. abrotani: rosae aridae: papaueris lacrimae  
singulorum. P. XIII. resinae terebinthinae. P. XIII. turis:  
spumae nitri: singulorum. P. XVIII. iridis: aristolochiae:  
singulorum. P. XXII. cæx. P. III. quibus adiicitur cedri  
cyathus unus. olei laurei cyathi tres: olei acerbi sextarius.

**S**D x i malagma siquando callus in articulis increuit.  
Iquando autem in articulis callus increuit Dexius docuit  
imponere calcis. P. XIII. cerussae. P. XVIII. resinae  
pinæ. P. XXX. piperis grana. XXX. cæx. P. Z. Quibus  
dum contunduntur hemina vini lenis instillatur.

DE EMPLASTRIS. CAPVT. XIX.

**E**Xemplastris autem nulla maiorem usum præstant: quam  
quæ cruentis protinus uulneribus iniiciuntur: enhaema  
græci uocant. Haec enim reprimunt inflammationem nisi ma-  
gna uis eam cogit: atq; illius quoq; impetum minuunt: cum  
glutinant uulnera quæ id patiuntur: cicatricem hisdem indu-  
cunt. Constât autem ex medicamentis non pinguibus. ideoq;  
alipene nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum: quod cruentis protinus  
uulneribus iniicitur.

**O**ptimum ex his est quod barbarum uocatur. Habet æru-  
ginis rasæ. P. XXII. spumae argenti. P. XXX. alumi-  
nis: picis aridae: resinae pinæ aridae singulorum. P. XI. qui-  
bus adiiciuntur olei & aceti singulae heminae.

Coacon emplastrum nigrum ad idem ualens

**A**lterum ad idem: quod choacon uocant: habet spumae ar-  
genti. P. XC. resinae aridae tantundem. Sed spuma pri-  
us ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris co-  
lor niger est: qui fere talis fit. ex pice. atq; resina. Ac ex bitu



86  
 .QVINTVS

mine nigerrimus. ex æruginē aut aeris squama uiridis. ex mī  
 nio ruber. ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

**P** Auca admodum compositiones sunt: in quibus aliquid  
 mixturæ uarietas nouat. Ergo id quod nigrum est: quod  
 basilicon nominatur. Habet panacis. P. XI. galbani. P. XII  
 picis & resinæ singulorum. P. XX. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum ad idem.

**A** T quod periri de est: smaragdinum appellatur. in quo  
 sunt resinæ pinæ. P. XIII. cæxæ. P. XI. æruginis. P. Se  
 mis. turis fuliginis. P. Z. olei tantundem. aceti quo fuligo &  
 ærugo in unum cogantur.

Emplastrum ruffum ad idem

**E** ST etiam coloris fere ruffi: quod celeriter ad cicatricem  
 uulnera perducere uidetur. Habet turis. P. XI. resinæ.  
 P. XII. squamæ æris. P. XIII. spumæ argenti. P. XXX.  
 Cæxæ. P. XC. olei heminam.

Paracolleticum emplastrum ad idem

**P** Raeterea est: quam paracolleticam a glutinando uocant.  
 Constat ex his. bituminis: aluminis scissilis. P. XIII.  
 spumæ argenti. P. X. & olei ueteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.

**P** Raeterea sunt quædam generis eiusdem: quæ quia capiti  
 bus fractis maxime conueniunt: cephalica a graecis nomi  
 nantur. Philotæ cōpositio. habet terræ erythriæ: chalcitidis:  
 Singulorū. P. XIII. myrræ: aeris cōbusti. P. XX. iethyocol  
 lae singulorū. P. XVI. aeruginis rasæ: aluminis rotundi: mysi  
 crudi: aristolochiæ: Singulorum. P. XVIII. squamæ aeris.  
 P. XX. turis masculi. P. XII. cæxæ. P. I. rosæ & olei acerbi  
 ternos cyathos: aceti quantum satis est: dum arida ex eo conte  
 runtur.

Emplastrum uiride ad idem ualens

**A** Liud ad idem uiride aeris combusti: squamæ aeris: myrræ  
 iethyocolle: Singulorum. P. XVI. mysi crudi: aeruginis



rase: aristolochiae: aluminis rotundi singulorum. P. XVIII.  
caerae. P. XI. olei hemina: aceti quod facis sit.

**P** Tetrapharmacum emplastrum ad pus mouendum.  
Vri autem mouendo non aliud melius: quam quod expe-  
ditissimum est. tetrapharmacou a graecis nominatur.  
habet pares portiones caerae: picis: resinae: seui taurini: si id  
non est/uitulini.

Enneapharmacum emplastrum ad pus mouendum &  
ad purgandum ualens.

**A** Iterum ad idem enneapharmacum nominatur: quod ma-  
gis purgat: constat ex nouem rebus: caera: melle: seuo: re-  
sina: myrra: rosa: medulla uel ceruina uel uitulina uel bubu-  
la: hyssopo: butyro. Quorum ipsorum quoque pondera paria  
miscentur. Sunt autem quaedam emplastra: quibus utriusque rei  
facultas est. quae si singula habenda sunt. meliora sunt. Sed  
in copia reiicienda sunt: iis potius adhibitis: quae proprie id:  
quod eo tempore opus est: consequuntur. Exempli causa duo  
proponam.

Attalum emplastrum ad uulnera.

**E** Strigitur ad uulnera attalum: quod habet squamae æris.  
P. XXVI. fuliginis. P. XXV. ammoniaci tantundem.  
resinae terebinthinæ liquidæ. P. XXXV. seui taurini tantun-  
dem. aceti heminas tres. olei sextarium.

Iudaei emplastrum fracto capiti accomodatum

**A** T inter ea quae fracto capiti accomodantur: habent qui-  
dam id quod ad auctorem iudaeum refertur. Constat ex  
his. salis. P. XIII. squamae æris rubri: aeris combusti: sin-  
gulorum. P. XXII. ammoniaci: thymiamatis: turis fuliginis:  
resinae aridae: singulorum. P. XVI. resinae colophoniaceae: ca-  
rae: seui uitulini curati: singulorum. P. XXX. aceti sesquicya-  
thum: olei minus cyathum. Tetherapeumena graeci appellat:  
quae curata uocant: cum ex seuo puta omnes membranulae di-  
ligenter exemptae sunt: ex alio medicamento.

Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum



**S**unt etiam quaedam emplastra nobilia ad extrahendum.  
Quae ipsa quoque epispastica nominantur. Quale est:  
quod quia lauri baccas habet: Diadaphnidon appellatur. in eo  
est resinae terebinthinae. P. XX. nitri: cerae: picis aridae: bac-  
ca rû lauri: singulorum. P. XXX. olei paulum. Quotiens aut  
baccam / aus nucem / aut simile aliquid posuero: scire oportet  
bit: anteq̃ expendatur: ei summam pelliculam esse demenda.

**A**liud diadaphnidon ad extrahendum & pus mouedū  
a Liud eo nomine: quod puri quoque mouendo est: seui uitu-  
lini: ammoniaci: thymiamatis: picis: cerae: nitri: bacca-  
rû lauri: resinae aridae: aristolochiae: pyretri pares portiones

**P**hilocratis emplastrum ad extrahendū & pus mouedū  
p Ræter has est philocratis: quod habet salis ammoniaci.  
P. XVII. aristolochiae. P. XVIII. cerae. resinae tere-  
binthinae. fuliginis turis. singulorum. P. XXV. spumae ar-  
genti. P. XXXXII. Quibus ut pus quoque moueant: iridis. P.  
XIII. & galbani. P. XVI. adiciuntur.

Rhypodes emplastrum ad extrahendum.

**O**ptimum tamen ad extrahendum est id: quod a similitudi-  
ne sordium rhyodes graeci appellant. Habet myrrae.  
croci. iridis. propolis. bdellii. capitulorum punici mali. alumi-  
nis & scissilis & rotundi. mysi. chalcitis. atramenti sutorii coc-  
ti. panacis. salis ammoniaci. uisci. singulorum. P. XIII. ari-  
stolochiae. P. XVIII. squamae æris. P. XXVI. resinae tere-  
binthine. p. LXXV. cerae & seui uel taurini uel hircini. p. XC

Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

**H**ecateo quoque auctore emplastrū generis eiusdē fit ex his.  
galbani. P. XII. fuliginis turis. P. XIII. picis. P. XVI  
cerae & resinae terebinthinae. singulorum. P. XVIII. quibus  
paulum irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

**A**lensq̃ ad idem emplastrum uiride alexandrinum est.  
Habet aluminis scissilis. P. XVIII. salis ammoniaci.  
pondo. XVIII. Z. squamae æris. P. XXVI. myrrae.



.QVINTVS.

turis: singulorum. P. XXVIII. caerae. P. X. CL. resinae colophoniacae aut pineae. P. XCC. olei heminam: aceti sextarium.

De emplastris exedentibus

**Q**Uaedam autem sunt emplastra exedentia: quae septa graeci uocant. quale est id quod habet resinae terebinthinae: fuliginis turis: singulorum. P. Z. squamae aris. P. XI. ladanii. P. XII. aluminis tantundem: spumae argenti. P. XIII.

Emplastrum quod exest corpus & ossa resoluit & super crescentem carnem coerct

**E**Xest etiam uehementer corpus atque ossa quoque resoluit & super crescentem carnem coerct id quod habet spumae argenti: squamae aris: uncias singulas: nitri ignem non experti: lapidis tasilii: aristolochiae. P. sextantes: caerae resinae terebinthinae: turis: olei ueteris: atramenti sutorii: salis ammoniaci. P. semis. aeruginis rasae. p. bessem. aceti scylliti heminam. uini aminei tantundem.

**S**unt etiam aduersus morsus & alia recetiora uulnera Vnt etiam aduersus morsus quaedam accommodata quale est Diogeni / nigrum: quod habet bituminis: caerae: resinae pineae aridae: singulorum. P. XXX. spumae argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in quo sunt. squamae aeris. P. XIII. caerussae & aeruginis passae singulorum. P. XVIII. ammoniaci. p. XXII. caerae: resinae pineae: singulorum. p. XXV. spumae argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in quo sunt squamae aris. P. XXIII. galbani. P. XVI. caerussae & aeruginis rasae: singulorum. P. XVIII. ammoniaci: p. XXII. caerae: resinae pineae: singulorum. p. XLV. spuma argenti cōcoquitur.

Ethesium emplastrum rubrum adidem ualens

**R**ubrum quoque emplastrum quod ethesium uocatur hoc aptum est. Habet resinae terebinthinae. P. XII. galbani: P. XIII. minii sinopici: P. XVI. turis fuliginis: P. XVI. caerae. P. XVIII. spumae argenti. P. XLVI. olei ueteris heminam.

Aliud emplastrum ad idem ualens. IIIVX. obnoq



88  
 .QVINTVS.

Item id quod ex his constat. squamæ æris: turis fuliginis: singulorum. P. XIII. galbani: P. XVI. salis ammoniaci. P. XXII. z. cærx. P. XXXV. olei tribus heminis. Hæc autem aliis quoque recetioribus uulneribus recte imponuntur.

Leuca emplastra non grauibz uulneribus accommodata & maxime senilibz.

**S**unt enim alba lenia: leuca græci uocant: fere non grauibz uulneribus accommodata / præcipueq; senilibz. Quale est quod habet caerussæ. P. XXXXII. seu uitulini curati & caerae. singulorum. P. XLVIII. olei heminas tres: ex quibus ea cærusa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

**A**liud quod habet cærusæ. P. X. caerae. P. XXXXV. olei heminam: aquæ sextarium. Quae quotiens adiciuntur caerussæ uel spumæ argenti: scire licet illa ex his coquenda esse. Est autem ea per candida compos. tioquæ supraposita est. ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastra

**L**enia quoque quædam emplastra sunt: quas liparas fere græci nominant. ut id quod habet minii. P. XIII. spumæ argenti. P. XXXV. caerae & adipis suillae: singulorum. P. XXXVII. uitellos quattuor.

Emplastrum lene

**L**ia cõpositio generis eiusdem: caerae: resinae terebinthinæ: singulorum. P. XVI. caerussæ. P. XVIII. spumæ argenti: plûbi recemêti: scorian molybdi græci uocât: singulorum. P. XXX. cicini: olei: & myrti: singulorum hemina.

Arcaghati emplastrum lene

**E**rtiaquæ ad auctore arcaghatu refertur: mysi costu: æris cõbusti: singulorum. P. XIII. caerussæ cõctæ. p. XV. III. resinae terebinthinæ: p. XX: spumæ argenti: p. XVI.

Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta

**E**tiam num generis eiusdem: spumæ argenti: caerae: adipis suillae: singulorum: p. XXXVII: uitelli cõcti



quattuor: rosae hemina. Aut caerati ex oleo myrteo facti partes tres: adipis suillae pars quarta: paulum ex plumbi recremento. Aut spumae argenti selibra ex olei hemina & aquae marinae altera cocta donec bullire desierit: cui paulum caerar sit adiectum. aut pares portiones caerae: seui: stibis: spumae argenti: caerulae.

DE pastillis & primo de his qui ad recentia uulnera glutinanda sanandaque apti sunt. CAPVT. XX.

**P**astilli quoque facultates diuersas habent. Sunt enim ad recentia uulnera glutinanda sanandaque apti. Qualis est qui habet chalcitis: mysi: spumae nitri: floris aeris: gallae: aluminis scissilis modice cocti: singulorum. P. XI. aeris combusti: capitulorum mali punici: singulorum. P. XIII. Hunc oportet diluere aceto: sic ubi uulnus glutinandum est illinire. Ac si nervosus aut musculosus is locus est: commodius est caerato miscere: sic ut illius octo partes: nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda uulnera

**A**lius ad idem constat ex his. bituminis: aluminis scissilis: singulorum. P. XI. aeris combusti. P. XIII. spumae argenti. P. XXI. olei sextarium.

De sphragide pastillo: quem Polybus confecit: ad glutinandum uulnus.

**S**ed longe polybi celeberrimus est. sphragis autem nominatur. qui habet aluminis scissilis. P. XI. Z. atramenti sutorii. P. XII. myrrae. P. XV. aloes tantundem: capitulorum punici mali: fellis taurini: singulorum. P. XVI. Quae contrita uino austero excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida & nigritie in auribus: naribus: oscenis partibus: inflammationesque eorum.

**A**d ulcera sordida & nigritiem in auribus: naribus: oscenis partibus: inflammationesque eorum: chrysocollae. P. XI. atramenti sutorii: aluminis scissilis: singulorum. P. XII



QVINTVS.

P. XII. halicacabi corticis. P. XIII. minii. P. XVI. spumæ  
argenti. P. XXII. caruissae. P. XXVI. Quae ex aceto & co  
guntur & ubi utendum est: diluuntur.

Pastillus andronis ad uiam inflammata & ad natu  
ralia sordida etiam cancro laborantia.

**A**ndronis uero est ad uiam inflammata: ad naturalia  
sordida etiam cancro laborantia: gallae: atramenti suto  
rii: myrrae: singulorum. P. XI. aristolochiae: aluminis scissi  
li: singulorum. P. XII. capitula punici mali. P. XXXV. ex  
passo coacta & cum uisus exigit aceto uel uino diluta: prout ua  
lentius aut lenius uicium est: cui medendum est.

Pastillus ad fissa ani: uel ora uenarum fundentia san  
guinem uel cancrum.

**P**roprie autem ad ani fissa: uel ora uenarum fundentia san  
guinem uel cancrum: æuginis. P. XII. myrræ. P. XXII  
stibis: lacrimae papaueris: acaciae: singulorum. P. XXVI.  
Quae ex uino & teruntur & in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cū urina  
**E**xpellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc  
compositio. casia: croci: myrrae: costi: nardi: cynamo  
m: dulcis radice. balsami: hyperici / pares portiones conte  
runtur. deinde uinum lene instillatur: & pastilli fiunt: qui  
singuli habeant. P. XZ. hi que singuli quotidie mane ieiuno  
dantur.

DE PESSIS.

CAPVT. XXI.

**H**æc tria compositionum genera: idest quae in malagma  
tis pastillis emplastris que sunt. maximum / præcipueq  
uariū usum præstant. Sed alia quoq; utilia sunt. ut ea quae  
fæminis subiiciuntur (pessos graeci uocant) Eorum hæc pro  
prietates est. Medicamenta composita molli lana excipiuntur:  
eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum



**A**D sanguinem autem euocandum canneis duabus adiicitur nitri. P. Xr. aut alii semen conteritur. adiicitur myrra paululum : & unguento susino miscetur . aut cucumeris filie stris pars interior ex lacte muliebri diluitur .

Ad uulvam molliendam

**A**D uulvam molliendam oui uitellus & foenum graecum & rosa & crocum temperantur . Aut elaterii. P. XZ. salis tantundem . uux riminiæ . P. XVI. melle excipiuntur .

Alia pessi compositio ad idem ualens .

**A**Ute Boeto auctore : croci : resinæ terebinthinæ : singulorū P. XIII. myrræ . P. X. ZZ. rosæ . P. XI. seui uitulini . P. XIX. cææ . P. XII. miscentur .

Ad inflammationes uulvæ Numenii pessus .

**O**Prima autem aduersus inflamationes uulvæ numenii compositio est : quæ habet croci . P. XZ. cææ . P. XI. butyri P. XVIII. adipis anserini . P. XXII. uitellos coctos duos : rosæ minus cyatho .

Ad eiiciendum e uulua infantem mortuum

**S**I uero infans intus decessit : quo facilius eiiciatur malocrium ex aqua terendum : eoq; utendum est .

Si mulier uitio locorum concidit qua cura tione utendum sit .

**S**I concidere uitio locorum mulier solet : cochleæ cum testis suis comburendæ : conterendæq; deinde his mel adiciendum est . Si non cōprehendit : adeps leonina ex rosa mollienda est .

DE medicamentis quibus aridis utimur . CAPVT . XXII .

Ad carnem super crescentem exedendam .

**Q**Uaedam autem mixturæ medicamentorum sunt : quibus aridis neq; coactis utimur : sic ut inspergamus : aut cum aliquo liquido mixta ilinamus . quale est ad carnem super crescentem exedendam . quod habet squamæ : fuliginis turis : sin



90  
 .QVINTVS.

gulorum. P. XI. æruginis. P. XII. Haec autem eadem cum melle purgant ulcera: cum caera implent. Myfi quoq; & galla si paribus portionibus misceantur: corpus consumunt. eaq; uel arida inspergere licet: uel excepta cadmia illinire.

Adputrem carnem continendam ne ultra serpat: eam q; leniter exedendam plures compositiones.

**P**utrem uero carnem continet: neq; ultra serpere patitur & leniter exest: mel uel cū lenticula uel cum marrubio uel cum oleæ foliis ante ex uino decoctis. Item fertula campana in mulso cocta: deinde cōtrita. aut calx cum cærato: aut amarae nuges cum allio: sic ut huius pars tertia sit: paulumq; his croci adiiciatur. Aut quod habet spumæ argenti. P. XVI. cornu bubuli combusti. P. XXII. olei myrtei & uini cyathos ternos. Aut quod ex his cōstat: floris punici mali, atramenti sutorii: aloes: singulorum. P. XII. aluminis scissilis: turis: singulorum. P. XIII. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. Vehementius idem facit etiam adurendo: auripigmentū cum chalcitide & aut nitro aut calce aut charta combusta. Itē sal cum aceto. Vel ea compositio quae habet chalcitidis: capitulum punici mali: aloes: singulorum. P. XII. aluminis scissilis: turis: singulorum. P. XIII. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel cātharides. XI. sulphuris. P. XI. lolii. P. XIII. Quibus adiicitur picis liquidæ quantum satis est. adiungendum uel ehalctis quoq; cum resina & ruta mixta. aut cum eadem resina. Idem uero possunt feces uini combustæ: & calcis & nitri pares portiones. uel aluminis scissilis. P. XXX. turis: sandaracæ: nitri: singulorum. P. X. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis est.

**H**ieræ compositio  
 Et etiam hieræ compositio. quae habet myrræ: chalcitidis: singulorum. P. XII. aloes: turis: aluminis scissilis: singulorum. P. XIII. Aristolochiæ: gallæ immaturæ: singulo



rum. P. XVIII. malocorii contriti. P. XX.

Iudaei compositio

**E** St iudaei: in qua sunt calcis partes duae: nitri q̄ ruberrimi pars tertia. quae urina impubertis pueri coguntur donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde. is locus: cui id illini tur: madefaciendus est.

Iollae compositio

**A** T Iollas: chartae combustae: sandaracae: singulorum. P. XI. calcis. p. XII. auripigmenti tantundem miscebat.

Ad sanguinis profluvia: uel ex membrana cerebri: uel aliis locis. & ad cancerum: & ad inducendam cicatricem & ad coercendam carnem crescentem.

**S** i uero ex membrana: quae super cerebrum est: profluit sanguis: vitellus combustus & contritus inspergi debet.

Si alio loco sanguinis profluvium est: auripigmenti: squamae aris: singulorum. P. XI. sandaracae. P. II. marmoris cocti P. XIII. inspergi debet. Eadem cancro quoque obsistunt.

Ad inducendam cicatricem: squamae aris: turis fuliginis: singulorum. P. XII. calcis. P. III. Eadem in crescentem quoque carnem coercent.

**T** imei compositio ad ignem sacrum uel ad cancerum  
imeus autem ad ignem sacrum uel ad cancerum his utebatur. Myrrae. P. XII. turis: atramenti sutorii: singulorum. P. XIII. sandaracae: auripigmenti: squamae aris: singulorum. P. X. III. gallae. P. XVI. caeruleae combustae. P. XVIII. Eadem uel arida inspsa: uel melle excepta idē praestant.

Ad sternutamenta excitanda.

**S** ternutamenta uero uel albo ueratro: uel struthio coniecto in nares excitantur. uel his mixtis. piperis: ueratri albi: singulorum. P. XX. castorei pondo. Xr. spumae nitri. P. XI. struthii. P. XIII.

gargarizationes quibus fieri debeant.

**G** argarizationes autem aut leuandi causa fiunt: aut reprimendi: aut euocandi. Leuant lac: cremor uel ptisanæ uel



91  
QVINTVS.

futurum. Reprimit aqua: in qua uel lenticula: uel rosa: uel rubus: uel cotoneum malum: uel palmulae decoctae sunt. Ego cant: sin: p: piper.

DE antidotis & quibus malis opitulentur. CAPVT. XXIII

a Antidota raro: sed praecipue interdum necessaria sunt: quia grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus uel per ictus: uel ubi ex alto deciderunt: uel in uiscerum: laterum: faucium: interiorum q: partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus uel per cibos aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

u Num est: quod habet lacrimae papaueris. P. XZ. acori: malobathri. P. XV. iridis illiricae: gummi: singulorum P. XII. anesi. P. XIII. nardi gallici: foliorum rosae aridorum: cardamomi: singulorum. P. IIII. petroselini. P. IIII. Z. pfolii. P. V. casiae nigrae: silis: bdellii: balsami: seminis pipis albi: singulorum. P. VZ. styracis. P. VZ. myrrae: opoponacis: nardi syri: turis masculi: hypocistidis succi: singulorum. P. XVI. castorei. P. XVI. costi: piperis albi: galbani: resinae terebinthinae: croci: floris iunci rotundi: singulorum. P. VI. Z. dulcis radicis. P. VIII. Z. Quae uel melle uel passo excipiuntur.

Aliud antidotum Ambrosia nominatum: quod Zopyrus Ptolemaeo regi composuit.

a Alterum quod Zopyrus regi Ptolemaeo dicitur composuisse atq: Ambrosiam nominasse: ex his constat. Costi: turis masculi: singulorum. P. V. piperis albi. P. Z. floris iunci rotundi. P. II. cinnamomi. P. III. casiae nigrae. P. IIII. croci cilici. P. IIII. Z. myrrae quam staten nominat. P. V. nardi indici. P. VZ. Quae singula contrita melle costo excipiuntur. Deinde ubi utendum est: id quod aegyptiae fabae



magnitudinem impleat: in potione uini diluitur.

**A**ntidotum mithridatis.   
**N**obilissimum autem est Mithridatis: quod quotidie sumendo rex ille dicitur aduersus uenenorum pericula tutum corpus suum reddidisse. In quo haec sunt. costi. P. S. Z. a cori. p. V. hyperici: cumini: sagapeni: agaciae succi: iridis illiricae: cardamomi: singulorum. p. II. anesi. p. III. nardi gallici: gentianae radices: aridorum: rosae foliorum: singulorum. p. III. papaueris lacrimae: petroselini: singulorum. p. III. z: casiae: scilis: lolii: piperis longi: singulorum. p. XVI. stracis. P. V. Z. castorei: turis: hypocistidis succi: myrrae: opopanax: singulorum. P. VI. malobathri foliis. XVI. floris iunci rotundi: resinae terebinthinae: galbani: dauci cretici seminis: singulorum. P. VIZ. nardi: opobalsami: singulorum. P. VI. z. thiaspis. P. XV. z. z. radices ponticae. P. VII. croci: zinziberis: cynamomi: singulorum. P. XVIII. r. Haec contrita melle excipiuntur & aduersus uenenum: quod magnitudinem nucis graecae impleat ex uino datur. In ceteris autem affectibus corporis pro modo eorum: uel quod aegyptiae fabae: uel quod erui magnitudinem impleat: satis est.

DE ACOPIIS. CAPVT. XXIII.

Acopum neruis utile.

**A**copa quoque utilia neruis sunt. Quale est quod habet floris iunci rotundi. P. II. ZZ. costi: iunci quadrati: lauri baccarum: ammoniaci: cardamomi: singulorum. P. III. z. myrrae: xris combusti: singulorum. P. VII. iridis illiricae: caera: singulorum. P. XIII. alexandrini calami: iunci rotundi: asphalti: xylobalsami: singulorum. P. XXVIII. seu. P. I. unguenti irini cyathum.

**A** Acopum elxodes neruis utile.

**A**lterum quod elxodes uocant hoc modo fit. caera. P. Z. olei tantundem: resinae terebinthinae ad nucis iuglandis



magnitudinem simul incoquuntur: deinde infusa in mortario teruntur: instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulū: tum irini unguenti & rosae terni cyathi.

Enchrīsta ad ulcera purganda & implenda.

**E**nchrīsta autem graeci uocant liquida quae illinuntur.

Quale est quod fit ad ulcera purganda & implenda maxime inter neruos: paribus portionibus inter se mixtis: butyri medullae uitulinae: seui uitulini: adipis anserinae: caerae: mellis: resinae terebinthinae: rosae: olei cilicini. Quae separatim omnia liquantur: deinde liquida miscentur: & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat. Magis uero emollit: si pro rosa cyprus infunditur.

Ad sacrum ignem.

**A**d sacrum ignem spumae argenti. P. XVI. corni bubuli combusti. P. XII. conteruntur: adiicitur quae inuicem uinum: & id quod specialiter sil uocatur: & myrteum: donec utriusque terni cyathi coiciantur.

## DE CATAPOTIIS.

## CAPVT. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum & leuationem doloris & simul ad concoquendum.

**C**atapotia quoque multa sunt: uariis quae de causis fiunt.

Anodyna uocant quae somno dolorem leuant. Quibus uti nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex uehementibus medicamentis & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum: quod habet papaueris lacrimae. galbani: singulorum. P. XI. myrrae: castorei: piperis: singulorum. P. XII. Ex quibus quod erui magnitudinem habet: satis est deuorasse.

Catapotium ualentius ad somnum.

**A**lterum stomacho peius: ad somnum ualentius ex his fit: mandragorae. P. Z. apii seminis: item hyoscyami seminis: singulorum. P. IIII. Quae ex uino teruntur. Vnum aut



tem eiusdem magnitudinis: quae supra posita est: abunde est fumpisse.

CATApotium ad plurimos dolores per somnum leniendos

**S**ive autem capitis dolores: siue ulcera: siue lippitudo: siue dentes: siue spiritus difficultas: siue intestinorum tormenta: siue inflammatio uulvae est: siue coxa: siue iecur: aut lienis: aut latus torquet: siue uitio locorum aliqua pro labitur & obmutescit: occurrit dolori per quietem eiusmodi catapoti-um. Silis: acori: rutae siluestris seminis: singulorum. P. I. ca-STOREI: cynamomi: singulorum. P. XII. papaueris lacrimae: panacis: radicis mandragorae: malorum aridorum: iunci ro-undi floris: singulorum: P. II: pip-ris grana. LVI. Haec p-se contrita: rursus instillato subinde passo / simul omnia te-runtur: donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut de-uoratur: aut aqua diluitur: & potui datur.

Catapotium aliud ad multa ualeus.

**Q**uin etiam siluestris papaueris: cum iam ad excipiendā la-crimam macerum est: manipulus qui manu comprehendi potest: in uas demittitur: & super infunditur aqua: quae id cō-tegat: atq; ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est ibidem expressus proiicitur: & cum eo humore, passi pari men-sura miscetur: inferuet que donec crassitudinem sordium habe-at. Cum infrixit: catapotia ex eo fiunt / ad nostrae fabae ma-gnitudinem / habentq; usum multiplicem. Nam & somnum faci-unt uel per se assumpta uel ex aqua data: & aurium dolores leuant: adiectis exiguo modo rutae succi ac passi. Et tormina supprimunt ex uino liquata. & inflammationem uulvae coer-cent mixta caerato ex rosa facto: cum paulum his croci quoq; accessit. et ex aqua fronti inducta: pituitam in oculos decur-rentem tenent.

Catapotium ad inducendum somnum: quod uulua do-lens prohibuit.

**I**tem si uulua dolens somnum prohibuit: croci. P. XII.



93  
 . QVINTVS.

anefi myrræ singulorum. P. XI. papaueris lacrimae. P. XIII  
 cicutae seminis. P. XVIII. miscentur: excipiunturq; uino uete  
 re & quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ  
 diluitur. Id tamen in febre periculosa datur.

Ad iecur sanandum.

**A** D sanandum iecur nitri. P. Z. croci: myrrae: nardi galli  
 ci singulorum. P. I. melle excipiuntur: daturque quod  
 ægyptiæ fabae magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

**A** D lateris dolores finiendus: piperis: aristolochiae: nardi  
 myrrae pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

**A** D thoracis nardi. P. I. turis: casiae singulorum. P. III  
 myrrae: cynamomi singulorum. P. XVI. croci. P. XV  
 III. resinae terebintinae quadrans: mellis heminae tres.

Catapodium athenionis ad tussim

**A** D tussim athenionis: myrrae: pipis singulorum. P. XI.  
 castorei: papaueris lacrimae: singulorum. P. XI. Quae  
 separatim confusa postea iunguntur: et ad magnitudinem fa  
 bae nostrae bina catapodia mane: bina noctu dormituro datur

Catapodium heraclidis tarentini ad tussim et somnum

**S** I tussis somnum prohibet: ad utranq; Heracli dis taren  
 tini. croci. P. XI. cynamomi: castorei: papaueris lacri  
 mae singulorum. P. I. myrrae piperis longi: costi: galbani:  
 singulorum. P. Z

Catapodium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus

**Q** Uod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus.  
 panacis: myrrae: resinae terebintinae singulorum: P. X  
 galbani. P. Z. hyssopi. P. Z. conterenda sunt. hisque hemi  
 na mellis adiicienda: & quod digito excipi potest: deuoran  
 dum est.

Collice Cassii medici

**C** Ollice uero cassii ex his constat: croci: anefi: castorei:  
 singulorum. P. XIII. petroselini. P. XIII. pipis & lōgi



& rotundi singulorum. P. XV. papaueris lacrimae: iunci rotundi: myrrae: nardi: singulorum. P. XVI. Quae melle excipiuntur. Id autem & deodorari potest: & ex aqua calida sumi.

**I** Ad infantem mortuum aut secundas expellendas. Infantem uero mortuum aut secundas expellit aquae portio cui salis ammoniaci. P. XI. aut cui dictami cretici. P. XI. adiectum est.

**E** Laborantibus ex partu quid dari debeat. Ex partu laboranti exisimum ex uino tepido ieiunae dari debet.

**V** Ad adiuuandam uocem. Uocem adiuuat turis. P. I. induobus cyathis uini datum.

**A** Ad uersus difficultatem urinae. Ad uersus urinae difficultatem: piperis longi: castorei. myrrae galbani: papaueris lacrimae: croci. colti. unciae singulae. styracis. resinae terbinthinae. Sondo sextantes. mel. ab linthii cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabae aegyptiae & mane & coenato dari debet.

**A** Arteriaceae compositio quomodo fiat. Arteriaceae uero hoc modo fit: casiae: iridis: cynamomi: nardi: myrrae: turis singulorum. P. I. croci. P. I. pipis grana. XXX. ex passi tribus sextariis decoquuntur: donec mellis crassitudo his fiat: aut croci. myrrae: turis: singulorum. P. I. coniiciuntur in passi eundem modum eodemque modo decoquuntur. aut eiusdem passi heminae tres usque eo coquuntur donec extracta inde gutta indurescat. & adicitur triae casiae. P. I.

De quinque generibus noxarum corporis & primo de uulneribus quae maxime per tela inferuntur. CAPVT: XXVI.

**C** Vm facultates medicamentorum proposuerim genera in quibus nexa corpori est: proponam. Ea quinque sunt:



Cum quid extrinsecus laesit: ut in uulneribus. Cum quid intra se ipsum corruptum est: ut in cancro. Cum quid innatum est: ut in uesica calculus: Cum quid increuit: ut uena quae intumescebat in uaricem conuertitur. Cum quid deest: ut cum curas pars aliqua est. Ex his alia sunt: in quibus plus medicamentum. Alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his: quae praecipue scalpellum & manum postulant: nunc de iis dicam: quae maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sic ut priorem. Et ante dicam: quae inquantumlibet partem corporis inducunt. Tum de iis quae certas partes infestant. Incipiam a uulneribus. In his autem ante omnia scire medicus debet: quae in sanabilia sunt. quae difficilem curationem habeant. quae promptiorem. Est enim prudentis hominis primum cum qui seruari non potest: non attingere: nec subire speciem eius ut occisi: quem sors ipsius peremit. Deinde ubi grauis metus sine certa tamen desperatione est: indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit: uel ignorasse uel fefellisse se uideatur. Sed ut haec prudenti uirico conueniunt: sic rursus histronis est: paruam rem attollere: quo plus praestitisse uideatur. Obligari quae aequum est confessione promptae rei: quo curiosius etiam circumspiciatur: ne quod per se exiguum est: maius curantis negligentia fiat.

Quae uulnera insanabilia sunt

**S**eruari non potest: cui basis cerebri: cui cor: cui stomachus. cui iocineris portae: cui in spina medulla percussa est. cuique aut pulmo medius: aut ieiunum: aut tenuis intestinum: aut uentriculus: aut renes uulnerati sunt. cui ue circa fauces grandes uenae uel arteriae praecisae sunt

Quae uulnera difficilem curationem habeant

**V**ix autem ad sanitatem perueniunt: quibus ulla parte pulmo: aut iocineris crassum: aut membrana, quae continet cerebrum: aut lienis: aut uulua. aut uesica: aut ullum intestinum: aut septum transversum uulneratum est.



ni quoque in praecipiti sunt: in quibus usque ad grandes iactus  
que conditas uenas in alis uel poplitibus mucto desedit. Peri-  
culosa etiam uulnera sunt ubicunque uenae maiores sunt: quo-  
niam exhaustire hominem profusione sanguinis possunt. Idque  
euenit non in alis tantum atque poplitibus: sed etiam in iis ue-  
nis: quae ad anum testiculosque perueniunt. Praeter haec ma-  
lum uulnus est: quodcunque in alis: uel foeminibus: uel inani-  
bus locis: uel in articulis: uel inter digitos est. Item quodcun-  
que musculum aut neruum. aut arteriam: aut membranam. aut  
os. aut cartilaginem laesit.

Quae uulnera tutiorem curationem habeant  
**T** Vcissimum omnium quod in carne est. & haec quidem lo-  
co uel peiora uel meliora sunt. Modo uero periculum fa-  
cit quodcunque magnum est.

Observationes quaedam & aetatis & corporis & uicae  
& temporis in uulneribus.

**A** Liquid etiam in uulneris genere / figura quae est. Nam pe-  
ius est quod etiam collisum / quam quod tantum discis-  
sum est: adeo ut acuto quoque: quod recuso celo uulnerari com-  
modius sit. Peius etiam uulnus est. ex quo aliquid excisum est  
ex quo uel caro alia parte abscissa. alia dependet. Pessima  
que plaga in orem est: tutissima / quae linea modo recta est.  
Quo deinde propius haec / illi uel figurae uulnus est: eo uel de-  
terius / uel tolerabilius est. quin etiam confert aliquid & aetas  
& corpus & uicae propositum & anni tempus. quia facilius sa-  
nescit puer uel adolescens / quam senior: ualens / quam infirmus. neque  
nimis tenuis. neque nimis plenus / quam si alterum ex his est: inte-  
gri habitus / quam corrupti. exercitatu / quam in herbis: sobrius & tempe-  
rans / quam uino uenerique deditus. Opportunissimumque curatio-  
ni tempus uernum est: aut certe neque feruens neque frigidum. si  
quidem uulnera & nimius calor & nimium frigus infestant: ma-  
xime tamen horum uarietas. ideoque perniciosissimus autumnus  
est. Sed pleraque ex uulneribus oculis subiecta sunt. quorum  
dam ipsae sedes indices sunt: quas alio loco demonstrauimus cum



## QVINTVS.

positus interiorum partium ostendimus. Veruntamen quia quaedam uicina sunt: interest quoque uulnus in summa parte sit: an penitus penetrauerit: necessarium est notas subiicere: p quas quid intus actum sit scire possimus: & ex quibus uel spes uel desperatio oritur.

### Signa percussi cordis

**I**gitur corde percusso / sanguis multus fertur. uenæ lingue scunt. color pallidissimus, sudores frigidi: maliq; odor tanq; in rorato corpore oriuntur. extremisq; partibus frigidis matura mors sequitur.

### Signa pulmonis icti

**P**ulmone icto / spirandi difficultas est. sanguis ex ore spu mansi: ex plaga rubens: simul que etiam spiritus cum sono fertur: in uulnus inclinari iuuat. quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum uulnus inclinati sunt: loquuntur. si in aliam partem: obmutescunt.

### Signa iocineris uulnerati.

**I**ocineris autem uulnerati notae sunt: multus sub dextra parte praecordiorum profusus sanguis. ad spinam reducta praecordia. in uentrem cubandi dulcedo. punctiones / doloresq; usq; ad iugulum: iunctumq; ei latus scapularum. os intantum. Quibus non nunq; etiam biliosus uomitus accedit.

### Signa percussorum renium

**R**enibus uero percussis, dolor ad inguina testiculosq; descendit: difficulter urina redditur: ea q; aut est cruenta: aut cruor fertur.

### Signa uulnerati lienis.

**A**liene icto sanguis niger a sinistra parte prumpit. praecordia cum uentriculo ab eadē parte idurescunt. sitis ingens oritur. dolor ad iugulum: sicut iocinere uulnerato uenit.

### Signa percussae uuluae

**A**t cum uulua percussa est: dolor in inguinibus & coxis & femoribus est. Sanguinis pars per uulnus: pars p naturale descendit. uomitus bilis insequitur. Quaedam obmutescunt.



quaedam mente labuntur. quaedam sui compotes / neruorum o  
culorum que dolore urgeri se confitentur. morientes que tan  
dem / quae corde uulnerato patiuntur.

Signa percussi cerebri uel membranae eius.

**S** In cerebrum membrana uel eius uulnus accepit: sanguis p  
nares: quibusdam etiam per aures exit: fere que bilis uo  
mitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur: appellati  
que ignorant. Quorundam trux uultus est. quorundam oculi  
quasi resoluti huc atque illuc mouentur. Fere que tertio uel qu  
to die delirium accedit. Multorum etiam nerui distenduntur.  
Ante mortem autem plerique fascias: quibus caput deligatum  
est. lacerant: ac nudum uulnus frigori obiciunt.

Signa percussi stomachi.

**V**bi stomachus autem percussus est: singultus & bilis uomi  
tus insequitur. Siquid cibi uel potionis assumptum est:  
ea redditur cito. Venarum motus elanguescunt. sudores tenu  
es oriuntur: per quos extremae partes frigescent.

Signa ieiuni intestini & uentriculi uulnerati. & alio  
rum intestinorum

**C**ommunes uero ieiuni intestini & uentriculi uulnerati no  
tae sunt. Nam cibus & potio per uulnus exeunt. praecordi  
a indurescunt. Non nunquam bilis per os redditur. Intestino  
tantum sedes inferior est. Caetera intestina ista uel stercus uel  
odorem eius exhibent.

Signa percussae medullae quae in spina est:

**M**edulla uero quae in spina est discussa: nerui resoluuntur  
aut distenduntur. sensus intercidit. interposito tempore  
aliquo sine uoluntate inferiores partes uel semen uel urinam  
uel etiam stercus excernunt.

Signa septi transversi percussi.

**A**t si septum transversum percussum est: praecordia sursum  
contrahuntur: spina dolet: spiritus rarus est: sanguis spu  
mans fertur.

Signa uesicae uulneratae.



96  
 .QVINTVS.

**V**Esica uero uulnerata dolent inguina. Quod super pubem est: intenditur: pro urina sanguis: aut ex ipso uulnere uрина descendit. Stomachus afficitur. Itaq; aut bilem uomunt: aut singultiunt. frigus: & ex eo mors sequitur.

De sanguine & sanie & pure & eorum speciebus quandoq; meliora / deteriora ue sint.

**H**is cognitis etiā nunc quaedam alia noscenda sunt ad omnia uulnera ulceraq; de quibus dicturi sumus: pertinentia. Ex his autem exit: sanguis: sanies: pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc: uarie crassa & glutinosa & colorata. Pus crassissimum albiissimumq; glutinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex uulnere recentis: aut iam sanescente. Sanies est inter utrunq; tempus. Pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies & pus quasdam species græcis nominibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies: quae uel hydrops uel melitera nominatur. Est pus quod elæodes appellatur. Hydrops tenuis / subalbidus ex malo ulcere exit: maximeq; ubi neruo laeso inflāmatio secuta est. Melitera crassior & glutinosior subalbida melli q; albo sublimilis fertur. Hæc quoque ex malis ulceribus: ubi nerui circa articulos laesi sunt: & inter hæc loca maxime ex genibus. Elæodes tenue subalbidum quasi unctum colore atq; pinguitudine: oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sanescētibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis aut crassus: colore uel liuidus uel niger: aut pituita mixtus: aut uarius. Optimus calidus: rubens: modice crassus: non glutinosus. Itaq; proptinus eius uulneris expedita magis curatio est: ex quo sanguis bonus fluxit. Item que postea spes in his maior est: ex quibus melioris generis quaeq; proueniunt. Sanies igitur mala est multa: nimis tenuis: liuida: aut pallida: aut nigra: aut glutinosa aut mali odoris: aut quae & ipsum ulcus & iunctam ei cutem erodit. Melior non multa: modice crassa: subrubicunda aut subalbida. Hydrops autem peior est multus: crassus: subliuidus: aut subpallidus: glutinosus: ater: calidus: mali odoris. Tolerantia



bilior est subalbidus: qui cetera omnia contraria prioribus habet. Melicera autem mala est multa & percrassa. melior quae & tenuior & minus copiosa est. Pus inter haec optimum est. Sed id quoque peius est: multum: tenue: dilutum: magis quod si ab initio tale est. Itemque si colore sero simile: si pallidum: si liuidum: si feculentum est. Praeter haec si male olet: nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est: quo minus est: quo crassius: quo albidius. Itemque si leue est: si nihil olet: si aequale est. modo tamen conuenire & magnitudini uulneris & tempori debet. Nem plus ex maiore: plus non dum solutis inflammationibus naturaliter fertur. Elaeodes quoque peius est: multum: & parum pingue. quo minus etiam: quoque id ipsum pinguius: eo melius est.

Curatio aduersus profusione sanguinis in uulneribus  
 q Vibis exploratis ubi aliquis ictus est: qui seruari potest: protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio: ne ue inflammatio interimat. Si profusionem timemus: quod ex sede uulneris & magnitudine eius & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest: siccis linamentis uulnus implendum est: supraq; imponenda spongia ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit: facpius linamenta miranda sunt. Et si sicca parum ualent: aceto madefacienda sunt. Id uehemens ad sanguinem suppressendum est. Ideoque quidam id uulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest: ne nimis ualenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. Quae res efficit neque rodentibus medicamentis: neque adurentibus: & ob id ipsum inducentibus crustam: sic utendum: quanuis pleraque ex his sanguinem suppressunt. Sed si semel ad ea decurritur: potius quae mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluuio uincuntur: uenae quae sanguinem fundunt apprehendendae: circaque id quod ictus est: duobus locis deligandae intercidendaeque sunt: ut & in se ipsae coeant: & nihilominus ora praclusa habeant. Vbi ne id quidem res patitur: possunt ferro candenti aduri. Sed etiam



43  
QVINTVS.

facis multo sanguine effuso ex eo loco: quo neque nervus: neque musculus est: ut puta in fronte: uel in superiore capitis parte. commoissimum tamen est cucubitulam ad mouere a diuersa parte: ut illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curaciones aduersus uulnorum inflammationem.

**E**T aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu ea timeri potest: ubi laesum est uel os: uel nervus: uel cartilago: uel musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris fluxit. Ergo quotiens quid tale erit: sanguinem mature suppressere non oportebit. sed pati fluere dum tutum erit: adeo ut si parum fluxisse uidebitur: mitti quaque ex brachio debeat: utique si corpus iuuenile & robustum & exercitatum est: multoque magis si id uulnus ebrietas praecessit. quod si musculus laesus uidebitur praecidendus erit. Nam percussus mortiferus est: praecisus sanitatem recipit.

De glutinatione uulnorum

**S**anguine autem uel suppresso: si nimius erumpit: uel exhausto: si per se parum fluxit: longe optimam est / uulnus glutinari. Potest autem id uel quod in cute uel etiam in carne est: si nihil ei praeterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens: alia inherens: si tamen etiam nunc integra est & coniunctione corporis fouetur. In his uero quae glutinantur duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte. sui debet: maximeque si discissa auris ima est: uel imus nasus: uel frenus: uel bucca: uel palpebra: uel labrum: uel circa guttur cutis: uel uenter. Si uero in carne uulnus est: hiatque: neque in unum orae facile attrahuntur: sutura quidem aliena est. Imponendae uero fibulae sunt: an aetheras graeci nominant. quae oras paulum tamen contrahunt: quo minus lata postea cicatrix sit. ex his autem colligi potest: id quomodo quod alia parte dependens / alia inheret. si alienatum adhuc non est: suturam an fibulam postulet. ex quibus neutra ante debet imponi / quam intus uulnus purgatum est: nequid ibi cohaere sanguinis relinquatur. id. n. et



## LIBER:

in pus uertitur, & inflammationem mouet: & glutinari uulnus prohibet. Ne linamentum quidem: quod suppressendi sanguinis causa inditum est: inibi relinquendum est. Nam id quoque inflammat. Comprehendi uero uel futura uel fibula non cutem tantum: sed aliquid etiam ex carne: ubi suberit haec: oportebit: quo ualentius hzreat: neque cutem abruppat. Vtraque optima est ex acia<sup>a</sup> molli non nimis torta: quo mitius corpori insadat. Vtraque neque nimis rara. neque nimis crebra initianda est. Si nimis rara est: non continet. Si nimis crebra est: uehementer afficit: quia quo saepius acus corpus transiit: quoque plura<sup>a</sup> loca iniectum uinculum mordet: eo maiores inflammationes oriuntur: magisque aestate. Neutra etiam uim ullam desiderat. Sed eatenus utilis est. qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Fere tamen fibulae latius uulnus esse patiuntur. Sutura oras iungit. quae ne ipse quidem inter se contingere ex toto debent: ut siquid intus humoris concreuerit: sit quae manet. siquod uulnus neutrum horum recipit: id tamen purgari debet. deinde ubi uulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa. si sustineri aliquis aceti uim non potest: uino utendum est. Levis plaga iuuatur etiam si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea quocunque modo imposta est. dum mader: prodest. itaque ut in arescat non est committendum. Licetque sine pegrinis & conquisitis & compositis medicamentis uulnus curare. Sed si quis huic parum confidit: imponere medicamentum debet: quod sine seuo compositum sit ex iis: quae cruentis uulneribus apta esse proposui. Maximeque si caro est: barbarum: si nerui: uel cartilago: uel aliquid ex eminentibus: quales aures/ uel labra sunt. Polybi sphragidem Alexandrinum quoque uiride neruis idoneum est. eminentibusque partibus ea: quam graeci raptusam uocant. Solet etiam colliso corpore exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit: non alienum est: scalpello latius aperire: nisi muscoli/ neruique iuxta sint: quod incidi non expedit. Vbi satis deductum est: medicamentum imponendum est. At si id quod collisum est: quan



is parum deductum est : latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet. adhibenda sunt ea. quae humorem leniter extrahant : praecipue ex iis id quod rhyppodes vocari proposui. Non alienum est etiam ubicunque vulnus graue est impositum: quo id iuuetur insup circumdare lanam succidam ex aceto & oleo. Vel cataplasma: si mollis is locus. quod leuiter reprimat. Si nervosus aut musculosus. quod emolliat.

Quomodo vulnus ligari conueniat

**F**ascia uero ad vulnus deligandum lincea aptissima est : eaq; lata esse debet: ut semel iniecta non vulnus tantum: sed paulum utrinque etiam oras eius comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit: ab ea melius attrahitur. Si aequae ab utraque transuersa: comprehendere oras debet. aut si id uulneris ratio non patitur: media primum iniicienda est: ut tum inutranque partem ducatur. Si autem deliganda est. ut & contineat neque astringat. Quod non continetur elabitur. quod nimis astrictum est: cancro periclitatur. Hyeme saepius fascia circuire debet: aestate quotiens necesse est. tum extrema pars eius inferioribus acu assuenda est. Nam nodus ulcus laedit. nisi tamen longe est. Illo neminem decipi debet ut propriam uiscerum curationem requirat: de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus uel sutura uel alio medicinae genere est. In uisceribus nihil mouendum est. nisi aut siquid ex iocinere. aut liene. aut pulmone duntaxat extremo dependeat: praecidatur. alioqui vulnus interius ea uictus ratio eaque medicamenta sanabunt: quae cuique uisceri conuenire superiore libro proposui.

De ratione uictus: & notis uulnerum: curationibusq; eorum.

**H**is ita primo die ordinatis homo in lecto collocandus est: is que si graue vulnus est: abstinere quantum uires patiuntur ante inflammationem acibo debet bibere donec sicim finiat aquam calidam. uel si aestas est: neq; febris neq; dolor est: etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est: Sed semp



## LIBER:

pro uinibus corporis estimandum: ut imbecillitas etiam cibum  
 protinus facere necessarium possit: tenuem scilicet & exiguum  
 qui tantum sustineat. Multique etiam ex profusio sanguinis  
 inter morientes/ ante ullam curationem uino reficiendi sunt.  
 quod alioqui inimicissimum uulnere est. Nimis uero intume  
 scere uulnus periculosum: nihil intumescere, periculosissimum  
 est. Illud inditium est magnae inflammationis: hoc emortui  
 corporis. Protinusque si mens homini consistit: si nulla febris  
 accessit: scire licet: mature uulnus sanum fore. Ac ne febris q  
 dem terrere debet: si in magno uulnere/ dum inflammatio est  
 permanet illa perniciofa est: quae uel leni uulnere superuenit:  
 uel ultra tempus inflammationis durat: uel delirium mouet:  
 uel si neruorum rigor: aut distentio: quae ex uulnere orta est:  
 eam non finit. Vomitus quoque biliosus non uoluntarius uel  
 protinus ut percussus est aliquis: uel dum inflammatio manet  
 malum signum est/ iniis duntaxat. quorum uel nerui uel etiam  
 nervosi loci uulnerati sunt. Sponte tamen uomere non alie  
 num est: praecipue iis quibus in consuetudine fuit. sed neque  
 protinus post cibum: neque iam in inflammatione ortum: neq  
 cum  
 in superioribus partibus plaga est. Biduo sic uulnere habito:  
 tertio die id aperiendum: detergendaq; sanies ex aqua frigida  
 est: eademq; rursus iniicienda sunt. Quinto iam die quanta in  
 flammatio futura est: se ostendit. Quo die rursus detecto uul  
 nere considerandus color est. Quod si liuidus aut pallidus a  
 ut uarius aut niger est: scire licet malū uulnus esse. Idq; quan  
 docutq; animaduersum est: terrere nos potest. album aut rubi  
 cundum esse ulcus commodissimum est. Item cutis dura: cras  
 sa. dolens/ periculum ostendit. Bona signa sunt: ubi haec si  
 ne dolore tenuis & mollis est. Sed si glutinatur uulnus: aut le  
 niter intumuit: eadem sunt imponenda: quae primo fuerunt.  
 Si grauis inflammatio est: neq; glutinandi spes est: eaq; pus  
 moueant: aquae quoq; calidae necessarius usus est: ut & materi  
 am digerat & duriciam emolliat & pus ciet. Ea sic temperan  
 da est: ut & manu contingenti iocunda sit. usq; eo adhibenda



donec aliquid ex tumore minuisse: coloremque ulceri magis naturalalem reddidisse uideatur. maxime que si grande uulnus est: tetrapharmacum. si in articulis: digitis: locis cartilagineis: rhyodes. Post id fomentum si lata plaga non patet: imponi protinus emplastrum debet: & si latius hiat: illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet. eoque illita linamenta disponi per plagam. deinde emplastrum supra dari: & super id succidam lanam: minus que etiam, quam primo fasciæ attingendæ sunt.

Curaciones propriæ articulorum.

**P**roprie quaedam in articulis uisenda sunt. in quibus si præcisi nervi sunt: qui continebant: debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est & ex acuto telo plaga est: ea transversa commodior est. Si recuso & graui est: nullum in figura discrimen est. Ac uisendum est: pus supra articulum: an infra nascatur. Si sub eo nascitur: album que & crassum diu fertur: neruum præcisum esse credibile est. Magis quoque maiores dolores inflammationes que: quo maturius excitatae sunt. Quauis autem non abscissus nervus est: tamen si circa tumor durus diu permanet: necesse est & diuturnum: ulcus esse: & sano quoque eo tumorem permanere. futurumque est: ut tarde membrum id extendatur: uel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est: ubi recuruato articulo curatio adhibita est: quæ in recuruando eo: quod rectum cõtinuerimus. Collocari quoque membrum: quod idem est ratione certa debet. Si glutinandum est: ut superius sit. si inflammatione est: ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit: ut deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri & ambulare nisi sanis alienum est. Minus tamen iis est periculosum: qui in capite uel brachiis: quam qui inferioribus partibus uulnerati sunt. Minime que ambulatio conuenit: femine: aut crure: aut pede laborante. Locus in quo cubabit: tepidus esse debet. Balneum quoque dum parum uulnus purum est:



inter res infestissimas est. Nam id & humidum & sordidum reddit. ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit: Lenis frictio recte adhibetur: sed iis partibus quae longius absunt a vulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

**I**nflammatione finita vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta: supra quae id / emplastrum: uel enneapharmacum dandum est. Tum demum uero purum ulcus est: cum rubet: ac nimium neque siccum neque humidum est: ac quodcunque sensu caret: quod non naturaliter sentit: quod nimium aut aridum aut humidum est. Quod aut pallidum aut albidum aut liuidum aut nigrum est: id purum non est.

Quo modo uulnus implendum est.

**P**urgato sequitur ut impleatur. iamque calida aqua eatenus necessaria est: ut sanies remoueat. Lanæ sucidae super uacuum usus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem uulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua: Itaque ea adhiberi non alienum est: ut butyrum cum rosa / exigua mellis parte: aut cum eadem parte / aut cum eadem rosa tetrapharmacum. aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rari. Cibi bonisucci / uitatis omnibus acerbis: sed iam plenioribus. Nā & a uis & uenatio & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris / dum inflammatio est: alienum est. Itemque usque ad cicatricem: si nervi / musculi uel uulnerati sunt: etiam si alte caro: aut si plaga in summa cute generis tutioris est: potest non per uetus / modice tamen datum ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est: quod in nervosis locis musculosisque necessarium est: cærato quoque super uulnus utendum est. At si caro supercreuit: modice reprimat siccum linamentum: uehementius squama æris. Si plus est: quod tolli opus est: adhibenda sunt etiam nunc uehementiora quae corpus exedunt. Cicatricem post omnia hæc commode inducit: licium ex passo aut lacte dilutum: uel etiam per se impositum siccum linamentum.



De uulneribus: quae extrinsecus per uulnera incidunt  
curationibusq; eorum

**I**le ordo foelicis curationis est. Sed quaedam tamen peri-  
culosa incidere consuerunt. Interdum enim uetustas ulcus  
occupat: induciturque ei callus: & circum orae crassae liuent:  
post quae quicquid medicamentorum ingeritur: parum profi-  
cit. quod fere negligerenter curato ulcere superuenit. Interdum  
uel ex nimia inflammatione: uel ob aestus immodicos: uel ob  
nimia frigora: uel quia nimis uulnus astrictum est: uel quia  
corpus aut senile aut mali habitus est: cancer occupat. Id ge-  
nus a graecis diductum in species est: nostris uocabulis non ē.  
Omnis autem cancer non solum id corrumpit: quod occupauit  
sed etiam serpit. deinde aliis aliisque signis decernitur. Nam mo-  
do super inflammationem rubor ulcus ambit. isque cum dolore pro-  
cedit. Erisipelas graeci nominant. Modo ulcus nigrum est: quia  
caro eius corrupta est. Idque uehementius etiam putrescendo in-  
tenditur. Vbi uulnus humidum est: & ex nigro ulcere humor  
pallidus fertur: malique odoris est: carunculaeque corruptae: inter-  
dum etiam nervi ac membranae resoluuntur: specillumque demis-  
sum descendit aut in latus aut deorsum: eoque initio non nunquam  
os quoque afficitur. modo oritur ea: quam graeci cangrenam ap-  
pellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hoc cum pro-  
minentibus membris id est inter ungues & alas uel inguina: fere  
que in senibus: uel iis quorum corpus mali habitus est. Caro  
in ulcere uel nigra uel liuida est: sed sicca & arida: proximaque  
cutis plerumque subnigris pustulis impletur. deinde ei proxi-  
ma uel pallida uel liuida fereque rugosa sine sensu est. Vltiori  
in inflammatione est: omnia que ea simul serpunt. Vlcus  
in locum pustulosum. Pustulae in eum qui pallet aut liuet. Pal-  
lor aut liuor in id quod inflammatum est. Inflammatio in id  
quod integrum est: transit. Intret haec deinde febris acuta ori-  
tur: ingensque sitis. quibusdam etiam delirium accedit. alii quibus  
mentis suae compotes sunt: balbutiendo tamen uix sensus suos  
os explicant. Incipit affici stomachus. Fit foedus spiritus ipse  
odoris. Atque initium eius quidem mali recipit curationem. Vbi uero



penitus infedit: insanabile est. plurimi que sub frigido sudore moriuntur.

Curatio ulceris.

**A** C pericula quide in uulnere hanc sunt. Vetus autem ulcus scalpello concidendum est: excidendæ que eius orae: & quicquid super eas liuet: æque incidendum. Si uaricula intus est: quae his sanari prohibet: ea quoque excidenda. Deinde ubi sanguis emissus: nouatum que uulnus est: eadem curatio adhibenda: quae in recentibus uulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non uult: potest sanare id emplastrum: quod ex ladano fit. & cum ulcus sub eo exesum est: id quo cicatrix inducitur.

Curatio erisipelarum.

**I** D autem quod erisipelas uocari dixi: non solum uulnere supernuenire: sed sine hoc quoque oriri consuevit: atque interdum periculum maius affert: utique si circa ceruices aut caput constitit. Oportet si uires patiuntur sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia: maximeque carum solani succo: aut cimoliam cretam aqua pluuiali exceptam: aut ex eadem aqua sub actam farinam cupresso adiecta: aut si tenerius corpus est: lenticulam. Quicquid impositum est: betae folio cõtegendum est: & super linteolum frigida aqua madens imponendū. Si per se refrigerantia parum pderunt: miscenda erunt hoc modo. Sulphuris. P. X. carullæ & croci singulorum. P. XX eaque cum uino cõterenda sunt: & id his illinendum. aut si durior locus est: solani folia cõtrita / suillæ adipi miscenda sunt: & illita linteolo super iniicienda. At si nigrities est: neque dum serpit: imponenda sunt quæ carnem putrem lenius exedunt. repurgatumque ulcus sic ut cætera nutriendum est. Si magis putre est: iamque pcedit ac serpit: opus est uehementius erodentibus. Si ne hæc quod euincunt: aduri locus debet donec ex eo nullus humor feratur. nam quod sanum est: siccum est cum aduritur. post unctionem puris ulceris supponenda sunt quæ crustas a nino resoluunt: eas escharas græci uocant, ubi exciderunt: purgandum ulcus maxime melle.



& resina est. sed aliis quorū purgari potest: quibus purulenta curantur: eodemq; modo ad sanitatem perducendum est.

Curatio Cangrenae.

**C** Angrenam uero si non dum plane tenet: sed adhuc incipit: curare non difficillimum est: utique in corpore inueniunt: & magis etiam si muscoli integri sunt: si nervi uel laesi non sunt: uel leuiter affecti sunt: neq; ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est: ideoq; non multum: quod putresceret: fuit: consistitq; eo loco uicium: quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est: si uires patiuntur: sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est & intentione quadam proximum quoq; locum male habet: utq; eo sanum corpus concidere. Medicamenta uero dum malū serpit adhibenda nulla sunt: quae pus mouere consuerunt. ideoq; ne aqua quidem calida. Grauiā quoq; / quāuis reprimētia: aliena sunt. Sed iis quam leuissimis opus est. superq; ea quae inflammata sunt: utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit: uri id quod est inter integrum ac uiciatū locum debet. Praecipueq; in hoc casu petendum non a medicamentis solum: sed etiam a uictus ratione praesidium est. Neq; enim id malum nisi corrupti uiciosiq; corporis est. Ergo primo / nisi imbecillitas prohibet / abstinentia utendum. Deinde danda quae p cibum potionemq; aluum: ideoq; etiam corpus astringant: sed ea leuia. Postea si uicium constitit: imponi sup uulnus eadem debent: quae in putri ulcere praescripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia: sic tamen non nisi aluum corpusq; ficcantibus. aqua uero pluuiāli frigida. balneum nisi iam certa fiducia reddita sanitatis est: alienum est: siquidem emollium in eo uulnus / cito rursus eodem malo afficitur. Solent uero nonnunq; nihil ōnia auxilia pficere: ac nihilo minus serpe his cancer. Inter quae miserū: sed unicum auxilium est: ut cetera pars corporis tuta sit: s.iii.



membrum: quod paulatim emouitur abscondere. Hæ grauiſſimo-  
rum uulnerum curationes ſunt. Sed ne illa quidem negligenda:  
ubi integra cute interior pars collifa eſt: aut ubi deraſum: ac  
tritum ue aliquid eſt: aut ubi ſurculus corpori infixus eſt: aut  
ubi tenue, ſed altum uulnus inſedit. In primo caſu commodiſ-  
ſimum eſt malicorium ex uino coquere: interiorẽ q̃ eius par-  
tem conterere: & caerato miſcere ex roſa faſto: id que ſuppo-  
nere. deinde ubi cutis ipſa exaſpata eſt: inducere lenẽ medica-  
mentum. quale lipara eſt. Deraſo uero detritũq̃ imponendum  
eſt emplatrum tetrapharmacum: minuenduſq̃ cibũ: & uinum  
ſubtrahendum. Neq̃ id: quia non habebit altiores iſtus: con-  
temnendum erit. Siquidẽ ex eiũſmodi caſibus ſæpe cancri fi-  
unt. Quod ſi leuius id erit: & in parte exigua: contenti eſſe  
poterimus eodem leni medicamento. Surculum uero: ſi fieri  
potẽſt: oportet uel manu/ uel etiam ferramento eiicere. Si uel  
præfractus eſt: uel altius deſcendit: q̃ ut id ita fieri poſſit: me-  
dicamento euocandus eſt. Optime autem educit ſuperimpoſi-  
ta arundinis radix: ſi tenera eſt: protinus contrita: ſi iam du-  
rior: ante in mulſo decocta. Cui ſemper mel addiciendum eſt:  
aut aristoſchia cum eodem melle. Peſſima ex ſurculi ſ arun-  
do eſt: quia aſpera eſt. Eademq̃ offeſa etiam in filice eſt.  
Sed uſu cognitum eſt utraq̃ aduerſus alteram medicamentũ  
eſſe: ſi contrita ſuper impoſita eſt. Facit autem idẽ in omni-  
bus ſurculis quodcunq̃ medicamentum extrahendi uim ha-  
bet. Idẽ altis/ tenuibus que uulneribus aptiſſimum eſt. Prio-  
ri rei Philocratiſ: huic Hecatei eplatrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulneri inducenda: purgandaq̃ ſit.  
**V**bi uerò in quolibet uulnere uentum ad inducendam cica-  
tricem eſt: quod perpurgatiſ iam repletis que ulceribus  
neceſſarium eſt: primum ex aqua frigida linamentum dum ca-  
tur: deinde cum iam continenda eſt: ſiccum imponendu  
ſt: donec cicatrix inducatur. Tum deligari ſuper album plum-  
um oportet: quo & reprimatur cicatrix: & colorem maxime  
ano corpori ſimilem accipit. Idẽ radix ſilueſtris cucumeris



præstat. Idem compositio: quæ habet elaterii. P. XII. Spumæ  
argenti. P. XII. unguenti Pondo. XIII. Quæ excipiuntur  
resina terebinthina: donec emplastri crassitudo ex omnibus fi  
at. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portio  
nibus mixta: ærugo: plumbum elorum: eadem que rosa costat:  
siue ungitur cicatrix: quod in facie fieri potest: siue id ut em  
plastrum imponitur. quod in aliis partibus commodius est.  
At si uel excreuit cicatrix: uel concaua est: stultum est decoris  
causa rursus & dolorem & medicinam sustinere. Alioquin res  
utrique succurri patitur. Siquidem utraq; cicatrix exulcerari  
scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult: idem effici  
unt compositiones ex: quæ corpus exedunt. Cute exulcerata:  
super eminentem carnem exedentia medicamenta conicienda  
sunt. Super concauam impleantia: donec utrunque ulcus sanæ cu  
ti æquetur: & tum cicatrix inducatur.

De uulneribus quæ per morsus inferuntur eorum que  
curationibus. CAPVT. XXVII.

**D**ixi de iis uulneribus quæ maxime per tela inferuntur. Se  
quitur ut de iis dicam: quæ morfu fiunt: interdum homi  
nis: interdum simæ: sæpe canis: non nunquam ferorum animalium:  
aut serpentium. Omnis autem fere morsus habet quoddam ui  
rus. Itaque si uehemens uulnus est: cucurbitula admouenda est.  
Si leuius: protinus emplastrum iniiciendum: præcipueque Dio  
gesi. Si id non est: quodlibet ex iis: quæ aduersus morsus p  
posui. Si ea non sunt: uiride alexandrinum. Si ne id quidem  
est: quodlibet non pingue ex iis: quæ recentibus uulneribus ac  
commodantur. Sal quoque his: præcipueque ei: quod canis fecit:  
medicamentum est: si manus uulneri imponitur: super que id  
duobus digitis uerberatur (Exsaniat enim) ac salsamentum  
quoque recte super id uulnus deligatur.

Curatio aduersus rabiosi canis morsum

**U**tique autem si rabiosus canis fuit: cucurbitula uirus eius ex



trahendum est. Deinde si locus neq; nervosus neque musculo-  
sus est: uulnus id adutendum est. Si uri non potest: sangui-  
nem homini mittere non alienum est. Tum uisto quidem uulnere  
super imponenda quae ceteris uistis sunt. Ei uero quod exper-  
tum ignem non est: ea medicamenta: quae uehementer exedunt.  
Post quae nullo nouo magisterio: sed iam supra posito: ulcus  
erit implendum: & ad sanitatem perducendum. Quidam post  
rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt: ibiq; pati-  
untur desudare dum uires corporis sinunt: ulcere ad aperto:  
quo magis ex eo quoq; uirus distillet. deinde multo / meracore  
uino excipiunt. Quod omnibus uenenis contrarium est. Idq;  
cum ita per triduum factum est: tutus esse homo a periculo ui-  
detur. Solet autem ex eo uulnere: ubi parum occursum est: a  
quae tumor nasci. hydrophogas graeci appellant. Miserri-  
mum genus morbi. In quo simul æger & siti & aquæ metu cru-  
ciatur. Quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen  
remedium est: nec opinantem in piscinam non ante ei prouisa  
proicere. Et si natandi scientiam non habet: modo mersum  
bibere pati: modo attollere. Si habet: interdum deprimere:  
ut inuitus quoq; aqua satietur. Sic enim simul & sitis & aquae  
metus tollitur. Sed aliud periculum excipit: ne infirmum cor-  
pus in aqua frigida uexatum neruorum distentio absumat. Id  
ne incidat: a piscina protinus in oleum calidum demittendus  
est. Antidotum autē: præcipue id quod primo loco posui. ubi  
id non ē: aliud / si non dum æger aquam horret: potui ex aqua  
dandum est. et si amaritudine offenditur: mel adiiciendum  
est. Et si iam is morbus occupauit: per cataporia sumi potest.

Curationes communes aduersus omnes morsus ser-  
pentium.

**S**erpentium quoq; morsus non nimium distantem curatio-  
nem desiderant: quanuis in ea multum antiqui uariarunt:  
ut in singula genera anguium / singula medendi genera præci-  
perent: atque aliis alia. Sed in omnibus eadem maxime profi-  
ciunt. Igitur in primis super uulnus id membrum deligandum



est: non tamen nimium uehementer: ne torpeat. Deinde ueniens  
extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neq; alienum  
est: ante scalpello circa uulnus incidere: quo plus uiriati iam  
sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamen uix  
incidere potest: tum quodlibet simile uas: quod idem possit.  
Si ne id quidem est: homo adhibendus est: qui uulnus ex su-  
gat. Neque hercules scientiam præcipuam habent ii: qui psyl-  
li nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam ue-  
nenum serpentis: ut quædam etiam uenatoria uenena: quibus  
galli præcipue utuntur: non gustu: sed in uulnere nocent. Ide-  
oque colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit: et si stupente  
ea: quod per quædam medicamenta circulatores faciunt: in os  
digitum quis indidit: neque percussus est: nulla in ea salua no-  
xa est. Ergo quisquis exemplum psylli secutus id uulnus exsu-  
xerit: & ipse tutus exit: & tutum hominem præstabit. Illud  
ne intereat: ante debet attendere: ne quod in gingiuis/pala-  
to ue: alia ue parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco  
calido collocandus est: sic ut id: quod percussum erit: in infe-  
riorem partem inclinetur. Si neque qui exsugat: neque cucurbi-  
tula est: sorbere oportet ius anserinum uel ouillum uel uiculi-  
num: & uomere. Viuum autem gallinaceum pullum per medi-  
um diuidere: & protinus calidum super uulnus imponere: sic  
ut pars interior corpori iungatur. Facit id etiam hædus, a-  
gnus ue discissus: & calida eius caro statim sup uulnus imposi-  
ta. Emplastra quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissi-  
mumq; est: uel ephesium: uel id quod ei subiectum est. Præses  
que in aliquo antidoto præsidium est. Si id non est: necessa-  
rium est exorbere potionem meri uini cum pipere: uel quidli-  
bet aliud: quo calor mouendus est: ne humorem intus coire  
patiat. Nam maxima pars uenenorum frigore interimit.  
Omnia etiam urinam mouentia: quia materiam extenuant.  
utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium & pri-  
mo aduersus ictum Aspidis.



**H**aec aduersus omnes ictus communia sunt. Vnus tamen ipse docuit: eum: quem aspis percussit: acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur: casus cuiusdam pueri: qui cum ab hac ictus esset: & partim ob ipsum uulnus: partim ob immodicos aestus sibi premeretur: ac locis siccis alium humorem non reperiret: acetum quod forte secum habebat: e bibit & liberatus est. Credo quoniam id: quamuis refrigerandi uim habet: tamen habet etiam dissipandi. Quo fit ut terra respersa eo / spumer. Eadem ergo ui uerisimile est: spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti: & sic dari sanitatem.

Aduersus ictum scorpionis

**I**n quibusdam etiam aliis serpentibus certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt: quidam eodem modo contritum super uulnus imponunt. quidam super prunam eo imposito uulnus suffumigant undique uelut circumdata: ne is fumus dilabatur, tum carbonem eius super uulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris: quam heliotropion graeci uocant: semen / uel certe folia ex uino. Super uulnus uero etiam fursures ex aceto: uel ruta siluatica recte imponitur: uel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos: qui ab scorpione ictis nihil aliud / quam ex brachio sanguinem miserunt.

Aduersus aranei & scorpionis ictum

**E**t ad scorpionis autem & ad aranei ictum allium cum ruta recte miscetur: ex oleo contritum super imponitur.

Aduersus Cerastris & Dipsae & Aemorrhoidis ictum.

**A**t si Cerastris aut Dipsas aut Aemorrhoids percussit: spoli quod aegyptiae fabae magnitudinem aequet: arefactum in duas portiones diuidendum est: sic ut ei rutae paulum adiciatur. Trifolium quoque & mentastrum & cum aceto panaces & que proficiunt. Costum que & casia & cynamomum recte per portionem assumuntur.

Aduersus Chelydri ictum & cerastris



**A**duersus Chelydri uero ictum: panacis aut laser: quod sit  
scripularū XII. uel porri succus cum hemina uini. sumen  
dus est: & edenda multa satureia. Imponendum autem super  
uulnus sterus caprinum ex aceto coctum: aut ex eodem hor  
deacea farina: aut ruta: uel nepeta cum sale contrita melle ad  
iecto. Quod in eo quoque uulnere: quod caeraestes fecit:  
aeque ualet.

Aduersus Phalangii ictum

**U**bi uero phalangium nocuit: praeter eam curationem: quae  
manu redditur: saepe homo demittendus in solium est: dā  
dusq; ei myrrae & uuae timinae par modus ex passi hemina.  
uel radulae semen: aut lolii radix ex uino: & super uulnus fur  
fures ex aceto cocti. imperandumq; ut is cōquiescat.

Aduersus ictus italorum anguim: qui minus terribi  
les peregrinis sunt

**U**trum haec genera serpentium & peregrina & aliquanto  
magis pestifera sunt: maxime quae aestuosis locis gignun  
tur. Italia / frigidiores quae regiones hac quoq; parte salubrita  
tem habent: quod minus terribiles angues edunt. Aduersus  
quos satis proficit herba betonica: uel cantabrica: uel centaui  
on: uel argimonia: uel trixago. uel personina: uel marinae pa  
stinacae singulae binae uel tritae & cum uino potui datae: & su  
per uulnus impositae. Illud ignorari non oportet: omnis ser  
pentis ictum & ieiuni & ieiuno magis nocere. Ideoq; pernitio  
sissimae sunt cum incubant. Utillissimumque est: ubi ex angui  
bus metus est: non ante progredi / q̄ quis aliquid assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena uel in c  
bo uel in potione assumpta

**N**on tam facile iis opitulari est: qui uenenum: uel in cibo:  
uel in potione sumpserunt. Primum: quia nō protinus sen  
tiunt: ut ab āgue icti: ita ne succurrere quidem statim sibi pos  
sunt. Deinde: quia noxa non a cute: sed ab interioribus partibus  
incipit. Commodissimum est tamen ubi primum sensit aliquis  
protinus oleo multo epoto uomere. Deinde / ubi praecordia ex



hausit: bibere antidotum. Si id non est: uel merum uinum.  
 Specialia remedia aduersus quaedam uenena. & pri-  
 mo aduersus cantharidas

**S**unt tamen quaedam remedia propria aduersus quaedam  
 uenena / maximeq; leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebi-  
 bit: panaces cum lacte contusa: uel galbano: uino adiecto da-  
 ri: uel lac per se debet.

Aduersus cicutam

**S**i cicuta: uinum merum: calidum cum ruta q̄ plurimum in-  
 gerendum est. deinde is uomere cogendus. Posteaq; laser  
 ex uino dandum. Is q; si febre uacat: in calidum balneum mit-  
 tendus. Si nō uacat: ungendus ex calfacientibus est. Post quē  
 quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum

**S**i hyoscyamum: feruens mulsum bibendum est: aut quodli-  
 bet lac: maxime tamen asininum.

Aduersus cæruſſam

**S**i cæruſſam: ius maluae: uel ius glandis ex uino contritae  
 maxime profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est, & lac quod in-  
 tus coit.

**S**i sanguisuga epota est: acetum cum sale bibendum est.  
 Si lac intus coit: aut passum: aut coagulum: aut cum  
 aceto laser.

Aduersus fungos inutiles.

**S**i fungos inutiles quis assumpserit: radícula aut epota: a-  
 ut cum sale & aceto edenda est. Ipsi uero hi & specie qui-  
 dem discerni possunt ab utilibus: & costurae genere idonei fie-  
 ri. Nam siue ex oleo inferuerunt: siue piri surculus cum his i-  
 feruit: omni noxa uacant.

De adustis corporis locis & quomodo curari debeant

**A**dustis quoq; locis extrinsecus uis infertur. Itaq; sequi ui-  
 detur: ut de his dicam. Haec autem optime curantur foli-  
 is: aut lili: aut linguae caninae: aut betae in uetere uino oleoq;



decoctis. Quorum quilibet prius impositum ad sanitatem perducit. Sed dimidi quoque curatio potest in ea: quae mediocriter exedentia reptimentia quae primo & pustulas prohibeant & summam pelliculam exasperent. Deinde ea quae lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulae cum melle farina: uel myrra uel uino: creta cimolia cum turis cortice contrita & aqua coacta: atque ubi usus necessitas incidit: aceto diluta. Ex insequentibus quaelibet lipara. Sed idonea maxime est: quae uel plumbi recrementum: uel uitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio: dum inflammatio est: impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit: farina cum ruta: uel porro: uel marrubio: donec crustae cadant. Tum eruium cum melle: aut irim: aut resinam terebinthinam: donec ulcus purum sit. Nouissime siccum linamentum.

De interioribus ulceribus: quae aliqua corporum parte corrupta nascuntur.

CAPVT. XXVIII.

De carbunculo & eius curatione

**A** B his quae extrinsecus incidunt adea ueniendum est: quae interius corrupta aliqua corporum parte nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. eius haec notae sunt. Rubor est superque eum non nimium pustulae eminet. maxime nigrae: interdum subliuidae aut pallidae. In his sanies esse uidetur. infra color niger est. Ipsum corpus aridum & durius quam naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est: eaque inflammatione cingitur. neque in eo loco leuari cutis potest: sed inferiori carni quasi affixa est. Sonus urget. non nunquam horror: aut febris oritur: aut utrunque. Idque uitium subter actis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius: interdum tardius. supra quoque procedens in albescit. dein liuidum fit. circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum: fauces ue incidit: subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est: quam prius adurere. Neque id graue est. Nam non sentit. quoniam ea caro mortua est. Finis quae adurendi est: dum ex omni parte sensus doloris est.

c. i.



Tum deinde vulnus: sicut cetera adusta: curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undiq; a viua carne diducta: quæ trahit secum quicquid corruptum erat: priusq; iam sinus curari potest implentibus. Ac si in summa cute vitium est: possunt succurrere quædam vel exedentia tantum vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumq; uero medicamentum positum est: si satis proficiet: protinus a uiua corruptam partem resoluit. Certa que esse fiducia potest fere ut undiq; uitiosa caro excedat: qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit: medicamentum malo uincitur. Utiq; ad ulationem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinendum a cibo / a uino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisq; ea seruanda sunt: si febricula quoq; accessit.

De carcinomate & eius curatione.

**N**on idem periculum carcinoma affert: nisi imprudentia curantis agitur. Id vitium fit maxime in superioribus partibus: circa faciem: nares: aures: labra: mammas feminarum. Et in iecore autem aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, isq; immobilis: inæqualis tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae uenæ quasi recuruantur. hæc pallent: aut liuent. nō nunq; etiam in quibusdam detestantur. Tactus que is locus aliis, dolorem affert: in aliis eum non habet. Et nō nunquā sine ulcere durior aut mollior est: q̄ esse naturaliter debet: non nunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdum que nullam habet proprietatem: interdum simile his est: quæ uocant græci condylomata: aspredine quadā & magnitudine sua. Colorq; eius ruber est: uat leuticulæ similis. neq; tuto fertur. Nam protinus aut resolutio neruorum: aut distentio insequitur. Sæpe homo ietus obmutescit: atq; eius aia deficit. Quibusdā etiam si id ipsū pressum ē: quæ circa sunt: intenduntur & intumescunt. Ob quæ pessimū id genus ē. fereq; primū id fit quod cacoethes a græcis nominatur. Deinde ex eo id carcinoma quod sine ulcere ē. Deinde ulcus ex eo thymum. Tolle nihil nisi cacoethes potē. reliqua curationibus irritantur. Et quo maior nis adhibita est: eo magis quidā usi sunt me



## LIBER V

dicamentis adurentibus. Quidam ferro aduxerunt. Quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam medicina perficit. Sed adusta protinus concitata sunt & increuerunt: donec occiderent. Excisa etiam post induritam cicatricem tamen reuenterunt: & causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam uim adhibendo: qua tollere id malum tentent: sed imponendo tantum lenia medicamenta: quae quasi blandiantur: quo minus ad ultimam senectutem perueniant: non prohibentur. Discernere autem cacoethes quod curationem recipit a carcinomate: quod non recipit: nemo scire potest. Sed tempore & experimento. Ergo ubi primum id uitium notatum est: imponi debent medicamenta adurentia. Si leuatur malum: minuiturque eius indicia: procedere curatio potest & ad scalpellum & ad uitionem. Si protinus irritatum est: scire licet iam carcinoma esse: remouenda quae sunt omnia acris: omnia uehementia. Sed si sine ulcere is locus est: imponi ficum quam pinguiSSimam: aut rhyodes emplastrum satis est. Si ulcus aequale est: caeratum ex rosa iniciendum est: adiciendus quae ex puluis ex contrita testa: ex qua faber ferrarius tingere candens ferum solitus est. Si id nimium supercreuit: te nanda squama aris est. quae lenissima ex adurentibus est: eatenus nequid eminere patiatur. sed ita, si nihil exacerbauit. Si minus: eodem caerato contenti esse debemus.

## De Therioma &amp; eius curatione.

**E**st etiam ulcus: quod therioma graeci uocant. Id & pse na scitur: & interdum ulceri ex alia causa facto superuenit. color est uel liuidus: uel niger. odor foedus: multus: & mucosi similis humor. Ipsum ulcus neque tractum: neque medicamentum sentit. prurigne tantum mouetur. At circa dolor est & inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Non nunquam ex ulcere sanguis erumpit. At id quoque malum serpit. Quae omnia saepe intenduntur. Fitque ex his ulcus: quod herpeta eschiomenon graeci uocant: quia celeriter serpendo penetrandoque usque ossa corpus uorat. Id ulcus inaequale est: coeno simile. in quo multus humor glutinosus: odor intolerabilis: maiorque quam pro modo ulceris inflammatio



Verum: sicut omnis cancer: fit maxime in senibus uel iis: quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusque eadem est: sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum a uictus ratione ordinandus est. ut quiescat in lectulo: ut primis diebus a cibo abstineat: aquam quam plurimam assumat. Alius quoque ei ducatur. Dein post inflammationem cibum boni succi capiat / uicinis omnibus acerbis: portionis quantum uolet: sic ut interdum quidem aqua contentus sit. In cetera etiam uini austeri aliquid bibat. Non æque tamen fame in iis: quos herpes urget: atque iis qui therioma adhuc habebunt: utendum erit. Et uictus quidem talis necessarius est. Super ulcus uero inspergenda atida aloë oenanthe est: et si parum proficiet: chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est: contegendus ante linteolo est: ne sub ro medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam num remedium opus est: ad eas compositiones ueniendum est: quæ uehementius adurunt. Quicquid autem inspergitur auerso specillo infundi debet. Super danda cum melle sunt uel linamenta: uel oleæ folia ex uino decocta: uel marrubium: eaque linteolo conregenda in aqua frigida madefacto: dein bene expresso. Circaque quæ tumor ex inflammatione est: imponenda quæ reprimant cataplasmata. Si sub his nihil proficitur: ferro locus aduri debet: diligenter nervis / si qui apparent / ante contextis. Adustum uel medicamentis uel ferro corpus / primum purgandum: deinde implendum esse: apparere cuilibet ex prioribus potest.

#### De Sacro igne & eius curatione

**S**acer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. Eius duæ species sunt. Alterum est sub rubicundum: aut mixtum rubore atque pallore: exasperatumque per pustulas continuas: quarum nulla / altera maior est: sed plurimae perexiguæ. In his semper fere pus: et sæpe rubor cum calore est. serpitque id non nunquam sanescente eo: quod primum uiciatum est: non nunquam etiam exulcerato. ubi ruptis pustulis nlcus continuatur: humorque exit: qui esse iter sanie & pus uideri potest. Fit maxime



in pectore: aut lateribus: aut eminentibus partibus: præcipue  
in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione:  
sed sine altitudine: latum: subliuidum: inæqualiter tamen: me-  
diumq; sanescit extremis procedentibus: ac sæpe id quod iam  
sanum videbitur: iterum exulceratur. At circa proxima cutis:  
quæ uitium receptura est: tumidior & durior est: colorem quæ  
habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque modo fere cor-  
pora seniores tentantur: aut quæ mali habitus sunt: sed incru-  
ribus maxime. Omnis autem sacer ignis ut minimum periculū  
habet ex iis quæ serpunt: sic prope difficillime tollitur. Me-  
dicamentum eius fortuitum est. Vno die febris: quæ humorē  
noxium absumat. Cuius quo crassius & albidius est: eo pericu-  
li minus est. Prodest etiam infra os ulcerum laedi: quo plus  
puris exeat: & id quo ibi corruptum corpus est: extrahat. sed  
tamen si febricula accessit: abstinencia: lectulo: alui ductione  
opus est. In omni uero sacro igni neq; lenibus & glutinosis ci-  
bis: neq; salis & acris utendum est: sed iis quæ inter utrumq;  
sunt. qualis est panis sine fermento: piscis: hedus: aues: excep-  
toq; apro omnis fere uenatio. Si non est febricula: & gestatio  
utilis est: & ambulatio & uinum austerum & balneum. Atq; in  
hoc quoq; genere potio magis liberalis esse: quam cibus de-  
bet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpunt: aqua calida. Si  
uehementius: uino calido fouenda sunt. Deinde acu pustulae  
quæcunq; sunt aperiendæ. Tum imponenda ea: quæ putrem  
carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata: ulcusq; purgatum  
est: imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere  
possunt proficere mala coronea in uino cocta atq; contrita.  
Potest emplastrum uel Hieræ: uel retrapharmacum: cui quinta  
pars turis adiecta sit. Potest nigra hedera ex uino austero coc-  
ta. Ac si celeriter malum serpit: non aliud magis proficit.  
Purgato ulcere: quod in summa cute esse proposui: satis ad sa-  
nitatem eadem lenia medicamenta proficient.

De Chironeo ulcere & eius curatione.



**C** Hironēū autem ulcus appellatur quod & magnum est & habet oras duas: callosas: tumentes. Exit sanies non multa: sed tenuis. Odor malus neq; in ulcere neq; in eius tumore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est. nihil serpit: ideo q; nullum periculum affert. sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur. deinde iterum rumpitur. ulcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet quod & lene aliquid & uehemens & reprimens habeat. Quale eius rei causa sit ex his. Squamae aris: plumbi eloti combusti: singulorum. P. XIII. Cadmix: ceræ: singulorum. P. XVIII. rosæ quantum satis est ad caeram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quae ex frigore in pedibus & manibus oriuntur & eorum curationibus.

**E**unt etiam ex frigore hiberno ulcera maxime in pueris & praecipue pedibus digitisq; eorum: non nunq; etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocris est. Interdum pustulae oriuntur. deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est. non nunq; humor exit: sed non multus: qui referre uel pus uel saniem uidetur. Inprimis multa calida aqua fouendum est: in qua rapa decocta: aut si ea non sunt: aliquae uerbenae ex reprimentibus. Si non dum ad apertum ulcus: atq; q; maxime calidum. quis pati potest ad mouendum est. Si iam exulceratio est: imponi debet alumen aequa portione cum turep contritum: cum uino adiecto. aut malicorium in aqua coctum: deinde contritum. Si summa detracta pellicula est: hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma & eius curatione

**S**truma quoq; est tumor: in quo subter concreta quaedam ex pure & sanguine: quasi glandulae oriuntur. Quae uel o praecipue fatigare medicos solent. quoniam & febres mouent: nec unq; facile maturescunt: & siue ferro siue medicamentis curantur. Plerunq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt: multaq; totq; post medicamento est opus. Quibus id quoque accedit mo



quod lōgo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice: sed etiam in alis & inguinibus & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se repperisse chirurgicus Meges auctor est. Propter hæc & album ueracrum recte datur: atque etiam sæpius donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur: quæ humorem uel educant uel dissipent: quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur: quæ exedunt: crustaque eum locum astringunt. tunc uero ut ulcus curant. Quaecumque autem ratio curandi est: corpus puro ulcere exercendum atque alendum est: donec ad cicatricem perueniat. Quæ cum medici doceant: quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet: eum / si anguem edit: liberari.

De furunculo & eius curatione.

**F**urunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore: maximeque ubi iam in pus uertit. Qui ubi ad apertus est: & exit: super apparet pars carnis in pus uersa: pars corrupta subalbida subrubra. quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se atque erumpit. Sed dolor efficit: ut potior medicina sit: quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est. Sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si caetera defunt: imponi debent primum non pingue emplastrum: ut id reprimat: deinde si non repressit: quodlibet puri mouendo accomodatum. Si neidquidem est: uel resina: uel fermentum. Expresso pure: nulla ultra curatio necessaria est.

De phymate & eius curatione.

**P**hyma uero nominatur tuberculum furunculo simile: sed rotundius & planius: sæpe etiam maius. Nam furunculus cui dimidii magnitudinem raro explet: nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit. Sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Vbi euulsus est pus: eodem modo apparet uentriculus. quod in furunculo non ingeneritur. Verum omnis corrupta caro in pus uertitur. Id autem in pueris & sæ-



pius nascitur & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur & difficilius curatur. Vbi ætas indurauit: ne nascitur quidem. Quibus uero medicamentis discuteretur / supra propositum est.

De phlygetro & eius curatione.

**P**hlygetron autem est tumor non alius: latusin: quo quidam pustulae simile est. Dolor distentioq; uehemens est & maior quam pro magnitudine tumoris. interdum etiam febricula. id que tarde maturescit: neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice: aut in alis: aut in gubibus. Panem ad similitudinem figuræ nostri uocant. Atq; id ipsum quo medicamento tolleretur supra demonstrauimus. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint: generale nomen trahit latius uitium ad suppurationem spectans. Idcirco fere fit aut post febres: aut post dolores partis alicuius: maxime que eos qui uentrem infestant. Saepius que oculis expositum est. Si quidem latus aliquid intumescit ad similitudinem eius: quod phlyma uocari proposui: rubet que cum calore: & paulo post etiam cum duritia: magis que innocenter indolescit: & sic in uigilia que exprimit. Interdum tamen nihil horum in eade deprehendi potest: maximeq; ubi altius pus mouetur. Sed cum sit in uigilia que sentiuntur intus aliquæ punctiones. & quod de subito durius non est: melius est. & quamuis non rubet: coloris tamen aliter mutati est. Quae signa iam pure oriente nascuntur. Tumor rubor que multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est: auertendus is materiae aditus est per cataplasmata: quae simul & reprimunt et refrigerant. qualia et alias et paulo ante in erisipela proposui. Si iam durior est: ad ea ueniendum est: quae digerant et resoluant. qualis est ficus arida. contusa. aut fex mixta cum caerato: quod ex adipe suilla coactum sit. aut cum cumeris radix: cui ex farina dux partes adiectae sint ante ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammo niacum: galbanum: propolim: uiscum: pondusq; adicere myrræ dimidio minus: q; in prioribus singulis erit. Atq; emplastra quoq; & malagmata idem efficiunt: quae supra explicui. Quod



.QVINTVS.

per hæc discussum non est: necesse est maturescat. Idq; quo  
celerius fiat: imponenda est farina hordeacea. ex aqua cocta  
recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoq; abscessi  
bus: quorum nomina proprietatesq; supra reddidi: recte fiunt:  
Eademq; omnium curatio. Tantum modo distat. Crudum est  
autem: in quo magis quasi venarum motus est & gravitas & ar  
dor & distentio & dolor & rubor & durities. Et si maior absces  
sus est: horror aut etiam febricula permanet: Penitusq; conda  
ta suppuratio. Si pro his: quæ alibi cutis ostendit: punctiones  
sunt: ubi ista se remiserunt: iamq; cutis prurit: et aut subliui  
dus aut subalbidus est: matura suppuratio est. eaq; ubi uel per  
ipsa medicamenta: uel etiam ferro aperta est: pus debet emitti  
Tum si qua in alis uel inguinibus sunt: sine linamento nutrien  
da sunt. In cæteris quoq; partibus: si una plaga exigua est: si  
mediocris suppuratio fuit: si non alte penetravit: si febris non  
est: si ualet corpus: æque linamenta supuacua sunt. In reliquis  
parce tamen: nec nisi plaga est: imponi deberet. Commode ue  
ro uel super linamenta: uel sine his imponitur lenticula ex mel  
le: aut malicorium ex uino coctum. Quæ & per se: et mixta:  
idonea sunt. Si qua circa duriora sunt: adea mollienda: uel ma  
lua confrica: uel foeni græci: lini ue semen ex passo coctum su  
per dandum est. Quicquid deinde impositum est: non astringi  
sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet: ut in hoc  
genere curato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ul  
cus: adimplendum: ad cicatricem inducendam: conueniunt quæ  
in uulneribus exposita sunt.

De fistulis & earum generibus & curationibus

**N**on nunquam autem ex eiusmodi abscessibus & ex aliis ul  
cerum generibus fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri al  
to: angusto: calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetq;  
quædam in singulis locis propria: prius de communibus dicam.  
Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem aliæ brues  
sunt: aliæ altius penetrant: aliæ recte intus feruntur: aliæ mul



## QVINTVS.

toq; plures transuerse. alia simplices sunt: alia duplices / tripli-  
 ces ue ab uno ore intus orsa: quæ tres fiunt: aut etiam in plures  
 sinus diuiduntur. alia rectæ: alia flexæ & tortuosæ sunt. Alia  
 intra carnem desinunt. Alia ad ossa: aut cartilaginem pene-  
 trant: aut ubi neutrum horum subest: ad interiora perueniunt.  
 Alia deinde facile: alia cum difficultate curantur. Atque  
 etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est  
 in fistula simplici recenti intra carnem: adiunatq; ipsum cor-  
 pus si iuuenile: si firmum est. Inimica / contraria his sunt. Itē  
 q; si fistula hos: uel cartilaginem: uel neruum: uel musculos læ-  
 sit. si articulum occupauit. si uel ad uesicam: uel ad pulmonem:  
 uel ad uulnam: uel ad grâdes uenas: arterias ue: uel ad inania:  
 ut guttur: stomachum: thoracem penetrauit. Ad intestina quo-  
 q; eam tendere semper periculosum: sæpe pestiferum est. Qui-  
 bus multum mali accedit: si corpus: uel aegrum: uel senile: uel  
 mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum infistu-  
 lam conuenit: ut quo tendat & quam alte perueniat: scire pos-  
 simus. Simul etiam protinus humida / an siccior sit. Quod ex  
 tracto specillo patet. Si uero os in uicino est: id quod disci  
 potest sic: iam nec ne eo fistula penetrauit / quatenus nocuerit.  
 Nam si molle est: quod ultimo specillo contingitur: intra car-  
 nem adhuc uitium est. Si magis id renititur: ad os uentum est.  
 Ibi deinde si labitur specillum: non dum caries est. Si non la-  
 bitur: sed aequali innititur: caries quidem / uerum adhuc leuis  
 est. Si inæquale quoq; & asperum subest: uehementius os exe-  
 sum est. At cartilago ubi subhaesit / ipsa sedes docet: peruen-  
 tumq; esse ad eam ex renixu patet. Sed ex his quidem colligū-  
 tur fistularum sedes: spatia: noxæ. Simples uero hae sint: an  
 in plures partes diducantur: cognosci potest ex modo puris:  
 cuius si plus fertur / quam quod simplici spatio conuenit: plu-  
 res sinus esse manifestum est. Cumq; fere iuxta sint caro & ner-  
 uus & aliqua nervosa: quales fere tunicae / membranae sunt: ge-  
 nus quoq; puris docebit: num plures sinus intus diuersa corpo-  
 ris genera perroserint. Siquidem ex carne pus leue: album: co-



pius fertur. Ac ex neruoso loco / coloris qdē eiusdem: sed  
tenuius & minus. Ex neruo / pingue & oleo non dissimile. Deni-  
q; etiam corporis iquinatio docet; num in plures partes fistu-  
la penetrarint: quia saepe cum quis aliter decubuit: aliter que  
membrum collocauit: pus ferri: quod iam defierat: incipit. et  
statutur que non solum alium sinum esse ex quo descendat: sed  
etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si & in carne  
& recens & simplex est: ac neq; rugosa neque caua sede: neque  
in articulo: sed in eo membro: quod per se immobile: non nisi  
cū toto corpore mouetur: satis proficiet emplastrum: quod re-  
centibus uulneribus imponitur: dū habeat: uel salem: uel alu-  
men: uel squamam æris: uel æruginem: uel ex metallicis aliqd.  
Ex quo collirium fieri debet altera parte tenuius: altera paulo  
plenius. Id que ea parte qua tenuius est: altera antecedente de-  
mitti oportet in fistulam: donec sanguis purus se ostendat.  
Quae in omnibus fistularum colliriis perpetua sunt. Idem de-  
inde emplastrum in linteolo super imponendum: supraq; ini-  
cienda spongia cum in acetum ante demissa. solui que quinto  
die satis est. Genus que uisus adhibendum est: quo carnem a-  
li docui. Ac si longius a præcordiis fistula est: interuallo ieiun-  
num radículas edisse: deinde uinere / necessarium est. Veru-  
state callosa fit fistula. Callus autem neminem fallit: quia du-  
rus est: & aut albus: aut pallidus. Sed cum ualidioribus medi-  
camentis opus est. Quale est: quod habet papaueris lacrimæ.  
P. I. gummi. P. III. cadmix. P. IIII. atramenti sutorii. P.  
XVIII. Ex quibus aqua coactis collirium fit. Aut in quo sūt  
gallæ. P. X. æruginis. sandaracæ. aluminis ægyptii: singulo-  
rum. P. XI. atramenti sutorii combusti. P. XII. Aut quod cō-  
stat ex chalcitide & saxo calcis. quibus auripigmenti dimi-  
dio minus / quam in singulis prioribus est: adiicitur. eaq; mel-  
le cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto  
Megetis: æruginis rasæ. P. XII. conterere: deinde ammoni-  
ci: thymiamatis. P. XII. aceto liquare: eo que infuso ex ærugi-  
ne colligere. Id que ex primis medicamentis est. Sed ut hæc



maximi effectus sunt: sic cui ista non adsunt: facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere. aut quibus hæc maxime in effectum sunt erodere. Satius quæ est uel papirum intortum: uel aliquid ex penicillo in modum collirii astrictum eo illinire. Seylla quoque cocta & mixta cum calce callum exest. Si quando uero longior & transversa fistula est: demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est & collirium utrumque demitti. At si duplicem esse fistulam aut multiplicem existimamus: sic tamen ut brevis: in traque carnem sit: collirio uti non debemus: quod unam partem curet: reliquas omittat. Sed eadem medicamenta arida in calammum scriptorium coicienda sunt: is quæ ori fistulæ aptandus: inspirandumque: ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex uino liquanda. Vel si sordidior fistula est: ex mulso. si callosior: ex aceto sunt. atque intus infundendum quicquid inditum est. Superponenda sunt quæ refrigerent & reprimant. Nam fere quæ circa fistulam sunt: habent aliquid inflammationis. Neque alienum est ubi quis resolverit: antequam rursus alia medicamenta coiciat: per oricularium clysterem fistulam eluere. Si plus puris fertur: uino. Si callus durior est: aceto. Si iam purgatur: mulso/ uel aqua in qua eruum coctum sit: sicut hunc quoque mellis paulum adiciatur. Fere uero fit: ut ea tunica: quæ inter ferrumen & integram carnem est: uicta medicamentis tota exeat: infraque ulcus purum sit. Quod ubi contigit: imponenda glutinantia sunt: præcipueque sponsia melle cocto illita. Neque ignoro multis placuisse: linamentum in modum collirii compositum tinctum melle demitti. Sed celerius id glutinatur/ quam impletur. Neque uerendum est ne purum corpus puro corpori iunctum non coeat: adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus: cum sæpe exulceratio digitorum: nisi magna cura prospeximus: sanescendo in unum eos iungat.

De melicera.

**E**st etiam ulceris genus: quod a faui similitudine melicera a græcis nominatur. id quoque duas species habet. Alterum



## QVINTVS.

subalbidum furunculo simile: sed maius & cum dolore maiore. Quod ubi maturefcit habet foramina per quæ fertur humor glutinosus & purulentus. Nec tamen ad iustam maturitatem puenit. Si diuifum est: multo plus intus corrupti, quam in furunculo apparet: altiusq; descendit. Raro fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus eminens: durum: latum: subuiri de: subpallidum: magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorū radices foramina sūt: per quæ fertur humor glutinosus subpallidus: crassitudinem mellis aut uisci referens. interdum olei. Si inciditur: uiridis intra caro apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est: adeo ut acutam quoque febrem mouere consuerint. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est: recte imponitur & ficus arida: & lini semen in mulso coctum: & emplastra ac malagmata materiam educentia: aut quæ pprie huc pertinentia supra posui. Super alterum: et ea medicamenta & farina ex mulso cocta: sic ut ei dimidiū resinae terebinthinae misceatur. & ficus in mulso decocta: cui paulum hyssopi contriti sit adiectum: & quæ timiniæ pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet: et ulcere ablato super plagam medicamenta danda sunt: primū quæ pus citet. deinde quæ purgent. tum quæ impleant. De acrochordone & Thymio & Myrmetio & Clauo curationibusque eorum

**S**unt quædam uero uerrucis similia. quorum diuersa nomina ut uicia sunt. Acrochordona graeci uocant ubi sub cute coit aliquid durius & interdum paulo asperius coloris eiusdē: infra tenue: ad cutem latius. id quæ modicum est: quia raro fabae magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur. sed fere plura: maximeq; in pueris. eaq; non nunq; subito desinunt: non nunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur quod super corpus quasi uerrucula eminet: ad cutem tenue: supra latius: sub durum: & in summo per aspe



## LIBER.

rum. Id que summum colorem floris thymi representat. Unde ei nomen est. Ibiq; facile finditur & cruentatur. non nunq; aliquantum sanguinis fundit. fereq; circa magnitudinem fabæ ægyptiæ est. raro maius: interdum per exiguum. modo unum: modo autem plura nascuntur: uel in talis: uel palmis: uel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obscenis sunt: maximeq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur: humilia thymio durioraq; quæ radices altius exigunt: maioremq; dolorem mouent: infra lata: super autem tenuia: minus sanguinis mittunt. magnitudine uix unq; lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoq; / aut in palmis / aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem non nunq; quidem etiam alibi: sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen excontuso: quanuis interdum aliter: doloremq; etiam / si non alias / tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon, siue thymium sæpe etiam perse finiuntur: & quo minora sunt: eo magis. Myrmecia & clauus sine curatione uix unq; desinunt. Acrochordon si excisa est nullam radiculam relinquit: ideoq; ne renascitur quidem. Thymio clauoq; excisis subter rotunda radícula nascitur: quæ penitus descendit ad carnem: eaq; relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inhaerent: ideoq; ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla ui sic emollefcit. ac si sanguinis quoq; aliquid emissum est: sæpe emoritur. Tollitur etiã siqs eũ circum purgat: deinde iponit resinam: cui miscuit pulueris paulum: quem ex lapide molari cõtrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt. Aliisq; id quod ex fece uini: myrmeciis id quod ex alumine & sandaraca fit: aptissimum. Sed ea: quæ circa sunt: foliis contegi debent: ne ipsa quoq; exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus & earum curationibus.

**A**T pustulæ maxime uernis temporibus oriuntur. earũ plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus / partemue



aspreudo quædam fit similis iis pustulis: quæ ex urtica / uel ex  
sudore nascuntur. Exanthemata graeci uocant: ea que modo  
rubent: modo colorem cutis non excedunt. Non nunq̃ plures  
similes uaris oriuntur: non nunquam maiores pustulae liuidæ /  
aut pallidæ / aut nigrae / aut aliter naturali colore mutato. Sub  
est q̃ his humor. Vbi hæc ruptæ sunt: infra quasi exulcerata  
caro apparet. helcodes græce nominatur. Fiunt uel ex frigore:  
uel ex igni: uel ex medicamentis. Phyzacion autem paulo duri  
or pustula est sub albidâ: acuta. ex qua ipsa quod exprimitur  
humidum est. Ex pustulis uero non nunquam etiam ulcuscula  
sunt aut aridiora aut humidiora: et modo tantum cum prurigi  
ne: modo etiam cum inflammatione aut dolore. Exitq̃ aut pus:  
aut sanies: aut utrunq̃. Maximeq̃ id euenit in ætate puerili: ra  
ro in medio corpore. sæpe in eminentibus partibus. Pessima  
pustula est. quæ epinyctis uocatur. Ea colore uel subliuida:  
uel sub nigra: uel alba esse consuevit. Circa hanc autem uehe  
mens inflammatio est: & cum ad aperta est: reperitur intus e  
xulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea  
supra magnitudinem eius est. Neq̃ enim ea / faba maior est.  
Atq̃ hæc quoq̃ oritur. in eminentibus partibus: & fere noc  
tu. Vnde nomen quoq̃ a graecis ei epinyctis impositum est.  
In õni uero pustularum curatione primum est multũ ambulare  
atq̃ exerceri. Siq̃ ista phibet: gestari. Secundum est: cibum  
minuere: abstinere ab õnibus acerbis & extenuantibus. eadem  
q̃ nutrices facere oportet: si lactens puer ita affectus ẽ. Præter  
hæc is q̃ iã robustus est: si pustulae minutæ sunt: desudare ibal  
neo debet: simulq̃ sup̃ eas nitrum inspergere: oleoq̃ uinum misce  
re: & sic ungi. Tum descendere in solium. Si nihil sic profici  
tur: aut si maius pustularum genus occupauit: imponenda len  
ticula est. de qua itaq̃ sũma pellicula ad medicamenta lenia trã  
seundum. Epinyctis post lenticulã recte herba quoq̃ sanguinali  
uel nitidi coriandro curatur. Vlcera expustulis facta tollit spu  
ma argenti cum semine foeni græci mixta: sic ut his iuicẽ ro  
sa atq̃ intubi succus adiciatur: donec mellis crassitudo fiat.



Proprie ad eas pustulas: quae infantes male habent: lapidis: quem pyriten uocant. P. XVIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur: adiciuntur quae olei cyathi tres. Sed prius ungi ex caerulea pustulae debent. tum hoc illini.

De scabie & eius curatione

**S**cabies uero est durior cutis rubicundus: ex qua pustulae oriuntur: quaedam humidiores: quaedam sicciores. Exit ex quibusdam sanies: fit quae ex his continuate exulceratio pruriens. serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto desinit: in aliis uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est: quoque prurit magis: eo difficilius tollitur. Itaque eam: quae talis est: agrian: id est feram graeci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem: quae supra: necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est: quod fit ex spodiis: croci: ruginis: singulorum. P. XI. piperis albi: omphacii: singulorum. P. XI. cadmia. P. XVIII. Aut ubi iam exulceratio est: id quod fit ex sulphuris. P. XI: cere. P. XIII. picis liquidae hemina: olei sextariis duobus. Quae simul incoquantur dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protagorae auctorem refertur. Habet hoc farinae lupinorum sextarium: nitri cyathos quatuor: picis liquidae heminam: resinae humidae selibram: aceti cyathos tres. Crocum quoque licium: rugo: myrra: cinis: aequis portionibus recte miscentur: & ex passo coquantur. Id quae omnem pituitam ubique sustinet. At si nihil aliud est amurca ad tertiam partem decocta: uel sulphur pice liquida mixtum: sicut in pecoribus proposui: hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

De impetiginis speciebus & curationibus.

**I**mpetiginis uero species sunt quattuor. Minime mala est: quae similitudine scabiem representat. Nam & rubet & durior est: & exulcerata est & roditur. Distat autem ab ea quia magis exulcerata est: & uariis similes pustulas habet: uidentur quae esse in ea quasi bullulae quaedam.



ex quibus interposito tempore squamulae resolvuntur. certioribus que hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est simile papulae fere: sed asperius rubicundius que: figuras varias habens. Squamulae ex summa cute discendunt. roseo maior est. celerius & latius procedit. certioribusque etiam non nunquam prior temporibus & fit & desinit. rubrica cognominatur. Tertia etiam num deterior est. Nam & crassior est & durior & magis tumet. in summa cute finditur: & uehementius rodit. Ipsa quoque squamosa: sed nigra procedit: et late et tarde eminus serpit. In temporibus aut oritur: aut desinit. neque ex toto tollitur. nigra cognomen est. Quartum genus est: quod curationem omnino non recipit: distans colore. Nam subalbidum est & recenti cicatrici simile: squamulas que habet pallidas: quasdam subalbidas: quasdam lenticulae similes. quibus demptis non nunquam profluit sanguis. Alioquin uero humor eius albidus est: cutis dura atque fixa est: procedit que latius. Haec uero omnia maxime genera oriuntur in pedibus & manibus: atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud ualentius est: quam quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho rectori. Serapion autem nitri. P. XII. sulphuris. P. XIII. excipiebat resina cnpiosa: eoque utebatur.

De papulis & earum curatione.

**P**apularum uero duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, et rubet leuiterque roditur. medium habet paulillo leuius, tarde serpit: idque uitium maxime rotundum incipit: eademque ratione in orbem procedit. Altera autem est: quam agriam: id est feram / graeci appellant. In qua similiter quidem: sed magis cutis exasperatur: exulceraturque: ac uehementius et roditur et rubet. interdum etiam pilos remittit. Quae minus rotunda est: difficilius senescit. nisi sublata est: in ipetiginem uertitur. sed leuis papula: etiam si ieiuna salua quotidie defricatur: senescit. Maior commodissime murali herba tollitur: si sub ea detrita est. Ut uero ad composita medicamenta ueniamus: idem illud Protarchi tanto ualentius in his est: quanto minus in his uitium est. alterum ad idem Myronis. nitri rubri



## LIBER.

cutis: singulorum .P. XI. cantharidum purgatarum .P. XII.  
 sulphuris ignem non experti tantundem: resinae terebinthi-  
 nae liquidat. P. XXX. farinae lolii semis: gith cyathos tres:  
 picis crudae unum.

De uiriliginis speciebus: idest de Alpho & Mela & leu-  
 ce & earum curatione

**V**iriligo quoque quanuis per se nullum periculum affert: ta-  
 men foeda est: & ex malo corporis habitu fit. Eius tres  
 species sunt. Alphos uocatur ubi color albus est fere sub asper  
 & non continuus: ut quaedam quasi guttae dispersae esse uide-  
 antur. Interdum etiam latius & cum quibusdam intermissioni-  
 bus serpit. Melas colore ab hoc differt: quia niger est & umbræ  
 similis. Cætera eadem sunt. Leuce habet quiddam simile al-  
 pho: sed magis albida est: & altius descendit: in eaq; albi pili  
 sunt & lanugini similes. Omnia hæc serpunt. Sed in aliis cele-  
 rius: in aliis tardius. Alphos & melas in quibusdam uariis tem-  
 poribus & oriuntur & desinunt. Leuce quem occupauit: non faci-  
 le dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt. ul-  
 timum uix unq; sanescit: ac siquid ei uitio demptum est: tamen  
 non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod ho-  
 rum sanabile sit: an non sit: experimento facili colligunt.  
 Incidi enim cutis debet: aut acu pungi. Si sanguis exit: quod  
 fere fit in duobus prioribus: remedio locus est. Si humor albi-  
 dus: sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum  
 est. Super id uero: quod curationem recipit: imponenda lenti-  
 cula mixta cum sulphure & ture: sic ut ea contrita ex aceto sit.  
 Aliud ad idem: quod ad Hixeneum auctorem refertur. Alcy-  
 onium: nitrum: cuminum: fici folia arida paribus portionibus  
 contunduntur adiecto aceto. His in sole uiriligo perungitur.  
 deinde non ita multo post: ne nimis erodatur. eluitur. Propri-  
 e qdē Myrone auctore eos: quos alphos uocari dixi: hoc me-  
 dicamento perungunt. sulphuris .P. XII. nitri .P. XIII.  
 myrræ aridae contritæ acetabulum miscent. deinde in balneo  
 super uiriliginem inspergunt farinam ex faba: tum hæc indu-



• SEXTVS .

cunt. Si uero: quos melanas uocari dixi: curantur. Cum simul contrita sunt aleyonium: tus: hordeum: faba sine oleo: in balneo ante sudorem insperguntur. tum genus id uiriliginis de fricatur.

CORNELII CELSI DE MEDICINA

LIBER SEXTVS INCIPIT.

De uitiiis singularum corporis partium. CAPVT. I.

De capillis fluentibus

**D**ixi de iis uitiiis: quæ per totum corpus sortientia / medicamentorū auxilia desiderant. Nūc ad ea ueniam: quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt: orsus a capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidē sæpe radendo succurritur. Adiciit enim uim quandam adcontinendum: ladanum cum oleo mixtum. Nunc de iis capillis loquor: qui post morbum fere fluunt. Nam quo minus caput quibusdam ætate nudetur: succurri nullo modo potest.

DE Porrigine & eius curatione.

CAPVT. II.

**P**orrigo autem est ubi inter pilos quaedam quasi squamulae surgunt: exq̃ a cute resoluuntur: & interdum madet: multo sæpius sicca sunt. Idq̃ euenit modo sine ulcere: modo exulcerato loco. huic quoq̃ modo malo odore: modo nullo accidente. fere que id in capillo fit: rarius in barba. aliquando etiam in supercilio. Ac neq̃ sine aliquo corporis uitio nascitur: neq̃ ex toto inutile est. Nam bene integro capite non exit. Vbi aliquid in eo uitium est: non incommodum est: summam cutem potius subinde corrumpi: q̃ id quod nocet in aliā



## SEXTVS.

partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo subinde pestendo repurgare: quam id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest: magis que si id etiam mali odoris est: caput sæpe radendum est: dein id super adiuuandum aliquibus ex leuiter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto: uel ladanum cum myrteo uino: uel myrobalanum cum uino. Si parum per hæc proficitur: uehementioribus uti licet: cum eo / ut sciamus utiq; in recenti uitio id inutile esse.

De fycosi & eius curatione.

CAPVT. III.

**E**st etiam ulcus: quod a fici similitudine Sycosis a græcis nominatur. Caro excrescit: et id quidem generale est. Sub eo uero duæ species sunt. Alterum ulcus durum & rotundum est, alterum humidum & inæquale. Ex duro exiguum quidam & glutinosum exit, ex humido plus: & mali odoris. Fit uero utrunq; in iis partibus: quæ pilis contegantur. Sed id quidem quod callosum & rotundum est: maxime in barba. Id uero quod humidum: præcipue est in capillo. Super utrunq; oportet imponere elaterium: aut lini semen contritum & aqua coactum: aut ficu in aqua decoctâ: aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum, terra quoq; erythria ex aceto liquata recte illinitur.

De areis & earum curationibus

CAPVT. IIII.

**A**rearum quoq; duo genera sunt. Cômune utriq; est: quod emortua summa pellicula pili primum extenuantur: deinde excidunt. ac si ictus is locus est: sanguis exit liquidus & mali odoris: increfcitq; utrunque in aliis celeriter: in aliis tarde. Perus est quod densam cutem & subpinguem & ex toto glabrâ fecit, sed ea quæ alopecia nominatur: sub qualibet figura dilatur. fit & in capillo & in barba. Id uero quod a serpentis similitudine ophiasis appellatur: incipit ab occipitio: duorum di-



115  
SEXTVS.

gitorum latitudinem non excedit. ad aures duobus capitibus  
serpit. quibusdam etiam ad frontem: donec se duo capita in  
priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate ē:  
hoc fere infantibus. Illud uix unq̄ sine curatione. hoc per  
se sæpe finitur. Quidam hæc genera arearum scalpello exa  
spérant. Quidam illinunt adurentia ex oleo: maximeq; char  
tam combultam. Quidam resinam terebinthinam cum tapfia  
inducunt. Sed nihil melius est: quam nouacula quotidie rade  
re. qua cum paulatim summa pellicula excisa est: adaperiun  
tur pilorum radiculæ. Neq; ante oportet desistere: quam fre  
quentem pilum nasci apparuerit. Id autem: quod subinde radi  
tur: illini atramento scriptorio satis est.

DE Varis & lenticulis & ephelide & eorum cura  
tionibus. CAPVT. V.

**P**ene ineptiæ sunt: curare uaros & lenticulas & ephelidas.  
Sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest.  
Ex his autem quas supra proposui: uari: lenticulæ que uulgo  
noxx sunt. quanuis rarior ea species est: quam xæmon græci  
uocant: cum sit ea lenticula rubicundior & inæqualior. Ephelis  
uero, a plerisq; ignoratur. quæ nihil est: nisi asperitas quædā  
& durities mali coloris. Cætera non nisi in facie: lenticulæ eti  
am in alia parte non nunq̄ nasci solent. De qua per se scribe  
re alio loco uisum operæ prætium non est. Sed uari cōmodis  
sime tolluntur iposita resina: cui nō minus q̄ ipsa ē: aluminis  
scissilis. & paulum mellis adiectum est. Lenticulā tollunt gal  
banum & nitrum: cum pares portiones habent: contrita q̄ ex  
aceto sunt: donec ad mellis crassitudinem uenerint. His cor  
pus illinendum: & interpositis pluribus horis mane eluendum  
est. oleoq; leuiter unguendum. Epheliden tollit resina: cui ter  
tia pars salis fossilis & paulum mellis adiectum est. Ad omni  
a uero ista atq; etiam ad colorandas cicatrices potest ea com  
positio: quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea



pares portiones sunt: myrobalani: magnatis: cretæ cimoliae  
subcæulæ: nucum amararum: farinae hordei atque erui: strucci  
albi: ferculæ campanæ feminis. Quæ omnia contrita / melle  
quam amarissimo coquuntur. allitum quæ a uespere usque ma  
ne eluitur.

De oculorum morbis curationibusque eorum: & primo de his  
morbis qui lenibus medicamentis curantur. CAPVT. VI.

**S**ed hæc quidem mediocria sunt. In gentibus uero & uari  
is casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem  
ad uitæ simul & usum & dulcedinem conferant: summa cura tu  
endi sunt. Protinus autem orta lippitudine quædã notæ sũt:  
ex quibus quid euenturum sit: colligere possimus. Nam simul  
et lacrima et tumor et crassa pituita coeperint: si ea pituita  
lacrimæ mixta est: et ea lacrima calida est: pituita uero alba  
et mollis: tumor non durus: longæ ualitudinis metus non est.  
Ac si lacrima multa et calida: pituita paulum: tumor modicus:  
idque in uno oculo est: longum id: sed sine piculo futurum est.  
Idque lippitudinis genus minime cum dolore est: sed uix ante  
uigessimum diem tollitur: non nunquam per duos menses durat:  
sed quandoque finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit:  
lacrimæque miscentur: aut si simul oæ utrunque oculum inuase  
runt: potest esse breuior: sed periculum ulcerum est. Pituita qu  
tem sicca et arida dolorem quidem mouet: sed maturius desi  
nit: nisi quid exulcerauit. Tumor magnus si sine dolore est  
et siccus: sine ullo periculo est. Si siccus quidem. sed cum do  
lore est: fere exulcerat: et non nunquam ex eo casu fit: ut pal  
pebra cum oculo g'ntinetur. Eiusdem exulcerationis timor in  
palpebris / pupillis uel est: ubi sup magnum dolorem lacrimæ  
salæ calidæque eunt: aut etiam si tumore in finito diu lacrima  
cum pituita profluit. Peius etiam num est: ubi pituita calida /  
aut liuida est: lacrima calida / aut mulca profluit: caput calet: a  
temporibus ad oculos dolor peruenit: nocturna uigilia urget.



116  
SEXTVS.

Siquidem sub his oculis plerumque rumpitur. notumque est: ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula iuuat. Si foras iam ruptus procedit: sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est: diu manet. At si asperum & crassum est: etiam post curationem uestigium aliquod relinquit. Curari uero oculos sanguinis detractione: medicamento: balneo: uino: uetustissimus auctor Hippocrates memorie prodidit. Sed eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicine summa est. Neque minus in abstinentia & alui ductione sepe auxilii est. Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his dolor est: sequiturque pituitae cursus: non nunquam copiosior uel acrior: non nunquam utraque parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium sunt quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet sic ut a sermone quoque abstineat. Nullum cibum assumere: si fieri potest ne aquam quidem, sin minus: certe quam minimum eius. Quod si graues dolores sunt: commodius secundo die. si tamen res urget: etiam primo sanguis mittendus est. utique si in fronte uenae tument. Si firmo corpori materia superest. Si uero minor impetus minus acrem curationem requirit: alium / sed non nisi secundo tertio uel die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Satisque est uti quiete & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atque acrior fiat. Sed secundo die dari debet id quod leuissimum uideri potest ex iis: quae pituitam faciunt crassiores. qualia sunt oua sorbilia. Si minor uis urget: pulicula quoque / aut panis ex lacte. In sequentibusque diebus quantum inflammationi detrahetur: tantum adiacere cibis poterit: Sed generis eiusdem. utique ut nihil calsum: nihil acre: nihil ex iis / quae extenuant: sumatur: nihil potui praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinus autem primo die croci. P. XI. & farinae candidae quam tenuissimae. P. XII. excipere oportet oui albo: donec mellis crassitudine habeat: idque in lintecolum illinire & fronti agglutinare:



ut compressis uenis picuitæ impetum cohibeat. Si crocum non est: tus idem facit. Linteolo an lana excipiat: nihil interest. Super inungi uero oculi debent: sic ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest: sumatur. myrræ / ad fabæ: papaueris lacrimæ / ad lenticulæ magnitudinem: eaq; cum passo conterantur & specillo super oculum inducantur. Aliud ad idem. Myrræ. P. XI. mandragoræ succi. P. XII. papaueris lacrimæ P. XII. foliorum rosæ: cicutæ seminis. singulorum. P. XIII. acaciæ. P. XIII. gummi. P. XVIII. Et hæc quidem interdum. Noctu uero / quo commodior quies ueniat: non alienum est super imponere candidi panis interiorem partem ex uino subactam. Nam & pituitam reprimat: & si quid lacrimæ processit: absorbet: et oculum glutinari non patitur. Si graue id & durum propter magnum oculorum dolorem uideretur: oui & album & uitellus in uas defundendum est: adiciendumq; eo mulsi paulum. id que digito permiscendum. Vbi facta unitas est: demitti debet lana mollis bene carpta: quæ id excipiat: superq; oculos imponi. Ea res & leuis est: et refrigerando pituitam coercet: & non exarescit: et glutinari oculum non patitur. Farina quoq; hordeacea cocta & cum malo cotoneo cocto mixta commodè imponitur. Neq; ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso. si leuior impetus est: ex aqua: si maior / ex posca. Priora fascia deliganda sunt: ne per somnum cadant et hoc super imponi satis est: quia & reponi ab ipso commode potest: et cum inaruit: iterum madefaciendum est. Si tantum mali est: ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum ē: quæ anodyna graeci uocant. Satisq; est puero / quod erui: uiro / quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum primo die nisi modica inflammatio est: nihil recte conicitur. Sæpe enim potius concitatur eo pituita / quam minuitur. A secundo die graui quoq; lippitudini per indita medicamenta recte succurritur: ubi uel iam sanguis missus: uel alius ducta est: aut ubi neutrum necessarium esse / manifestum est.

De diuersis oculorum colliriis



**M** Vita autem multorumq; auctorum colliria ad id apta sunt: nonis que etiā nunc mixturis temperari possunt cum lenia medicamenta & modice reprimencia facile & usque misceantur. Ego nobilissima exequar.

## Philonis collirium

**E** ST igitur Philonis quod habet cæussæ elotæ: spodii: gummi: singulorum P. XI. papaueris lacrimæ combustæ. P. XI. Illud scire oportet: hic quoq; omnia medicamenta: singula primum per se teri: deinde mixta iterum adiecta paulatim uel aqua uel alio humore. gummi cum quâdam alias facultates habeat: hoc maxime præstare: ut ubi colliria facta inaruerunt: glutinata sint: neq; fricentur.

## Dionysii collirium

**D** ionysii nero collirium est: papaueris lacrimæ combustæ donec tenerescat. P. XI. turis combusti: gummi: singulorum. P. XII. spodii. P. XIII. Cleonis collirium.

**C** Leonis nobile admodum. papaueris lacrimæ frictæ. p. XI. croci. P. XI. gummi. P. XI. quibus: cum teruntur: addicitur rosæ succus. Aliud eiusdem ualentius. squamæ aeris quod stomoma appellant. P. XI. croci P. XII. spodii. P. XIII. plumbi & eloti & combusti. P. XI. gummi tantundem. Eius aliud quoq; ad idem est. maxime ubi multa pituita profluit. Castorei. P. XX. aloes. p. xl. croci. p. xl. myrræ. p. XII. lycii. p. XIII. cadmiæ curatæ. p. XVIII. stibis tantundem. acaciæ succi. P. XXII. quod cum miscuit: liquidum in pigidicula seruatur. Theodotus uero huic cōpositioni adiecit papaueris lacrimæ cōbustæ. p. x. aeris combusti & eloti. p. XII nucleos palmarum cōbustos. P. XX. gummi. P. XXII.

## Theodoti collirium Acharistum appellatum

**A** T ipsius theodoti: quod aqbusdā Acharistum nominatur: euismodi ē. Castorei: nardi indici: singulorū. p. xl. lycii. p. x. papaueris lacrimæ tantundē: myrræ. p. XII. croci cæussæ elotæ: aloes singulorū. p. XIII. cadmiæ botryodis elotæ: aeris cōbusti singulorū. p. XVIII. gūmi p. XXVIII. acaciæ succi. P. XXX.



# SEXIVS.

sibis tantundem, quibus aqua pluvialis adicitur.

*Cythion uel tephion collirium*

**P**ater hęc ex frequentissimis colliriis id quod quidā cythi-  
on, quidam a cireneo colore tephion appellant. amyli:  
tragacanthae: acaciae succi: gummi: singulorum. P. XI. papa-  
ueris lacrimae. P. XII. caerustae elotae. P. XIII. spumae e-  
lotae. P. XVIII. Quae aequae ex aqua pluviali cōteruntur.  
Euelpidis collirium trygodes nominatum.

**E** Velpides autem qui aetate nostra maximus fuit oculari-  
us medicus utebatur eo: quod ipse composuerat: trygo-  
des nominabat. Castorei. P. XII. lycii: nardi: papaveris lacri-  
mae: singulorum. P. XI. croci: mirrae: aloes: singulorum. P.  
XIII. æris combusti. P. XVIII. cadmiae & itibis: singu-  
lorum. P. XXII. acaciae succi. P. XXXVI. gummi tantum-  
dem. Quo grauior uero quaeque inflammatio est: eo magis le-  
niri medicamentum debet: adiecto uel albo uel muliebri lacte.  
At si neque medicus neque medicamentum praesto est: saepius u-  
trunlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum facto infusum  
id malum lenit. Vbi uero aliquis reuelatus est: iamque cursus pi-  
tuitae constitit: reliquias fortasse leniores futuras discutunt  
balneum & uinum. Igitur lauari debet leuiter ante ex oleo per-  
fricat us: diutiusque in cruribus & feminibus: multaue calida  
aqua fouere oculos: deinde per caput prius calida tum egelida  
perfundi: a balneo cauere nequo frigore afflatu ue laedatur.  
post haec cibo paulo pleniore quam ex eorum dierum consue-  
tudine uti: uitatis tamen omnibus pituitam extenuantibus.  
Vinum bibere lene: subausterum: modice uetus neque effuse ne-  
que timide: ut neque cruditas ex eo & tamen somnus fiat: leni-  
anturque intus latentia acrimonia. Sed si quis in balneo sensit maio-  
rem oculorum perturbationem quam attulerat. quod incidere  
iis solet: qui manente adhuc pituitae cursu festinantur: quam  
primum discedere debet: nihil eo die uini assumere. cibi minus  
etiā quam pridie. Deinde cum primū satis pituita substitit: iterū



ad usum balnei redire. Solet tamen curare non nunquam si  
ue tempestatum utrio / siue corporis: ut pluribus diebus neque  
dolor neque inflammatio & minime pituitae cursus finiatur.  
Quod ubi incidit: iamq; ipsa uetustate res matura est: ab his  
hisq; auxiliis petendum est: id est balneo ac uino. Hæc e  
nim ut in recentibus malis aliena sunt: quia concitare ea pos  
sunt & accendere: sic in ueteribus: quæ nullis aliis auxiliis cesse  
runt: admodum efficacia esse consuevit. Videlicet hic quoq;  
ut alibi: cum secunda uana fuerint: contrariis adiuuantibus.  
Sed ante ronderi ad cutem conuenit. Deinde in balneo: aqua  
calida quam plurima caput atq; oculos fouere. tum utrunq; pe  
nicillo detergere: et ungere caput irino unguento: continere  
q; in lectulo se donec omnis calor qui conceptus est finiatur:  
desinaturq; sudor: qui necessario in capite collectus est. Tum  
ad idem cibi uiniq; genus ueniendum: sic uri poriones meracæ  
sint: obtegendumq; caput & quiescendum: Sæpe enim post hæc  
grauis somnus: sæpe sudor: sæpe alui deiectio pituitæ cursum  
finit. Si leuatum malum est: quod aliquanto sæpius fit: per  
plures dies idem fieri oportet: donec ex toto sanitas restitua  
tur. Si diebus iisdem aliud nihil reddit: ducenda est: quo ma  
gis superiores partes leuentur. Non nunquam autem ingens  
inflammatio tanto impetu erumpit: ut oculos sua sede propel  
lat. Propterea id: quoniam oculi procidunt: græci appellant.  
His utiq; si uires patiuntur sanguinem mitti. si id fieri non po  
test: aluum duci: longioremque in ediam idici necessarium esse  
Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque Cleonis co  
llirio quidam quod ex duobus ante positum est: utuntur. Sed  
optimum est Nilei. Neque de ullo magis inter omnes aucto  
res conuenit.

Nilei collirium omnium optimum

**I**D habet nardi indici: papaueris lacrimæ: singulorum. P.  
X. gummi. P. XI. croci. P. XII. foliorum rosæ recent  
iū p. XIII. Quæ uel aqua pluuiatili uel uino leni subaustero



coguntur. Neq; alienum est malicorū uel fertulam campanam  
exuino coquere: deinde conterere. aut myrtam nigram cum ro-  
sae foliis miscere: aut hyoscyami folia cum oui cocti utello:  
aut fardam cum acaciae succo: uel passo aut mulso. Quibus  
si folia quocq; papaueris adiciantur aliquanto ualentiora sunt.  
Horum aliquo praeparato penicillo fouere oculos oportet ex  
aqua calida expressa: in qua ante uel myrti uel rosae folia de-  
cocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Praeter haec ab oc-  
cipitio incisā cute cucurbitula admonenda est. Quod si per  
haec restitutus oculus in sedem suam non est: eodemq; modo  
prolapsus permanet: scire oportet lumen esse amissum. Dein-  
de futurum ut aut inarescat is aut in pus uertatur. Si suppu-  
ratio se ostendit: ab eo angulo qui propior tempore est: inci-  
di oculus debet: ut effuso pure & inflammatio ac dolor finia-  
tur: et intus tunicae residant: quo minus foeda postea facies  
sit. Videndum deinde uel iisdem colliriis est ex lacte aut ouo  
uel croco: cui album oui miscatur. Ac si induruit & sic emor-  
tuus est: ne in pus uertetur: quatenus foeda prominebat exci-  
dendum erit: sic ut h. amo summa tunica apprehendatur. In-  
fra id deinde scalpelus incidat: tū eadem medicamenta erunt  
conicienda: donec omnis dolor finiatur. Hisdem medicamen-  
tis in eo quoq; oculo utendum est: qui primum prociudit: dein-  
de per plura loca fissus est.

#### Decarbunculis oculorum & eorum curatione

**S**olent etiā carbunculi ex inflammatione nasci: nō nunq̃  
in ipsis oculis nō nunq̃ in palpebris. & in his ipsis mo-  
do ab interiore: modo ab exteriorē. In hoc casu aliud ducenda  
ē: cibis minuendus: lac potui dandum: ut acris quae laeserunt re-  
leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet: his  
iis utrum dum quae aduersus inflammationes proposita sunt.  
Acq; hic quoq; nil ei colliriū optimū ē. si tamen carbunculus in  
exteriorē palpebrae parte est: ad cataplasmata aptissimum est.



lini semen ex mulso coctum. aut si id non est: tritici farina eodem modo cocta.

Depustulis oculorum & curatione earum

**P**ustulae quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit: magis etiam seruanda sunt quae de sanguine & quiete supra posui. Sin ferias quam ut sanguis mitti possit: alius tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet: utique uictus ratio seruanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est. sicut quale Nileis: quale Cleonis est.

Phylactos collirium ad pustulas oculorum.

**D** quoque: quod phylactos uocatur: huic aptum est. Myrrae: papaueris lacrimae: singulorum. P. XI. plumbi eloti: terrae samiae: quae altera uocatur: tragacanthae: singulorum. P. XIII. stibis cocti: amyli: singulorum. P. XVI. spodii eloti: cerussae elotae: singulorum. P. XVIII. Quae aqua pluuiatili excipiuntur. Vtius collirii. uel ex ovo uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum & eorum curatione & de Diabala collirio.

**P**ustulis ulcera interdum fiunt: ea quae recentia acque lenibus medicamentis nutrienda sunt: et hisse rem fere quae supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad haec quod diabalanu uocatur. Habet aeris combusti & eloti papaueris lacrimae frictae: singulorum. P. XI. spodii eloti: turris: stibis combusti & eloti: myrrae gummi: singulorum. P. XII.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum

**V**enit etiam ut oculi uel ambo uel singuli minores fiant: quam esse naturaliter debeant. Idque & acer picui et cunctus in lippitudine efficit: et continuati fletur: et ictus parum bene curati. In his quoque hisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte utendum est. Cibis uero iis qui maxime corpus alere & implere consueverunt. Vitanda quoque omni modo causa: quae lacrimas excitet: cura quoque domesticorum. Quod si tale incidit: eius notitiae subtrahendum: atque acris quoque medicamentis



& acres cibi non alio magis nomine his nocent: quam quod la-  
crimas mouent.

**De pediculis palpebrarum**

**C**etus quoque uitii est: qui inter pilos palpebrarum pediculi  
nascuntur. Id phthiriasin graeci nominant. Quod cum  
ex malo corporis habitu fiat: raro non ultra procedit. Sed fe-  
re tempore interposito pituitae cursus acerrimus sequitur: ex  
ulceratisque uehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit.  
His alius ducenda: caput ad cutem tondendum: diuque quoti-  
die ieiunis pficandum. His ambulationibus aliisque exercitati-  
onibus diligenter utendum: gargarizandumque ex mulso: in quo  
nepeta & pinguis ficus decocta sit. saepe in balneo multa cali-  
da aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi: lacte uinoque pin-  
gui utendum. bibendumque liberalius quam edendum est. Medi-  
camenta uero intus quidem lenia danda sunt: ne acriorem pi-  
tuitam concitent. Super ipsos uero pediculos alia quae necare  
eos & prohibere: ne similes nascantur: possint. Ad id ipsum  
spumae neri. P. XI. Sandaracae. P. XI. urinae timorae. P. XI.  
simul teruntur: adiciunturque uetus oleum pari portione atque a-  
cetum donec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis: qui ex inflammationibus  
oriuntur: et ualidioribus medicamentis curantur. et de Andre-  
ae collirio & de Diacerato.

**H**actenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutriun-  
tur. Genera deinde alia sunt: quae diuersam curationem  
desiderant: fereque ex inflammationibus nata sunt: sed finitis  
quoque his manentia. Atque in primis in quibusdam perseverat  
tenuis pituitae cursus: quibus alius ab inferiore parte euocan-  
da est. demendum aliquid ex cibo: Neque alienum est illi  
frontem compositione Andreae. Quae habet gummi. P. XI.  
crustulae: stibis singulorum. P. XII. spumae argenti & coctae  
& elotae. P. XIII. Sed & ea spuma ex aqua pluuiatili coqui-  
tur: et arida haec medicamenta ex succo myrti coteruntur. His  
illita fronte: cataplasma quoque super iniiciendum est ex fari



na : quæ frigida aqua coacta sit : cuique aut acaciæ succus aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoque inciso uertice recte accommodatur. aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet quod habet squamæ æris : papaueris lacrimæ : singulorum. P. X. ceruini cornus combustæ et eloti plumbi : eloti gummi : singulorum. P. XIII. turis. P. XXII. Hoc collirium : quia cornum habet : diaceratos nominatur. Quotiens cumq; non adiicio quod genus humoris adiciendum sit : aqua intelligi uolo.

#### Memigmenon Euelpidis collirium

**A** Didem Euelpidis : quod memigmenon nominabat. In eo papaueris lacrimæ & albi piperis singulæ uncia sunt : gummi libra : æris combusti. P. XI. Inter has autem curationes potest intermissione aliqua profunt balneum & uinum. Cumq; omnibus hippientibus uitæ di cibi sunt qui extenuant : tum præcipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum quæ pituitam crassiorem reddunt : sicut in hoc genere materiae maxime promptum est : confugiendum est ad ea : quæ quia uentrem corpus quoq; astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus : sordidis : cauïs : ueteribus : et decurationibus singulorum.

**A** Ulcera si cum inflammatione finita non sunt : aut supercrescentia : aut sordida : aut caua : aut certe uetera esse cõsuerunt. Ex his supercrescentia collirio : quod memigmenon uocatur : optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem : et eo / quod Smilion nominatur.

#### Smilion collirium

**A** bet æuginis. P. XIII. gummi tantundem : ammonia : miniæ sinopici : singulorum. P. XXVI. Quæ quidam ex aqua : quidam / quo uehementiora sint : ex aceto terunt.

#### Phynon Collirium Euelpidis

**I** D quoq; Euelpidis : quod phynon appellabat : huic utile est. Croci. P. XI. papaueris lacrimæ : gummi : singulorum. P. XII. æris combusti et eloti : mirrae : singulorū. P. XIII.



piperis albi. P. XVI. Sed ante linitum hoc unguendum est.

**Sphaerion collirium Euelpidis**

**I**D quoque eiusdem: quod Sphaerion nominabat: eodem ualet.

**L**apidis hematitidis eloti. P. XII. piperis grana sex. cad  
mix elotae: mirra: papaueris lacrimae: singulorum. P. XIII.  
croci. P. XIII. gummi. P. XVIII. Quae cum uino amineo  
conteruntur.

**Liquidum Euelpidis collirium**

**L**iquidum quoque medicamentum ad idem componebat: in  
quo erant haec. Eruginis. P. X. minii combustis: atramenti  
futorii: cynamomi: singulorum. P. XIII. croci: nardi: papa  
ueris lacrimae: singulorum. P. XI. myrrae. P. XII. aeris com  
busti. P. XIII. cineris ex odoribus. P. XIII. piperis grana  
. XV. Haec ex uino austero teruntur. Deinde cum passi tri  
bus heminis decoquuntur: donec corpus unum sit. Idque medi  
camentum uetustate efficacius fit.

**Decanis oculorum ulceribus & curationibus**

**C**Aua uero ulcera commodissime implent ex his quae  
supra posita sunt Sphaerion: et id quod phylactos uo  
catur. Idem Sphaerion uetustis ulceribus & uix ad cicatricem  
uenientibus optime succurrit.

**Hermonis collirium.**

**E**ST etiam collirium quod cum ad plura ualeat: plura  
tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refer  
tur ad Hermonem auctorem. Habet piperis longi. P. XII.  
albi. P. X. cynamomi. costi: singulorum. P. XI. atramenti  
futorii: nardi: casiae: castorei: singulorum. P. XII. gallae. P.  
. XV. myrrae: croci: turis: lycii: caeruleae: singulorum. P. XV.  
III. papaueris lacrimae. P. XXII. aloes: aeris combusti: cad  
miae singulorum. P. XXVI. acaciae: stibis: gummi: singulo  
rum. P. XXXV.

De cicatricibus oculorum quae ex ulceribus factae sunt: et  
quo modo curari debeant. et de Asclepia et Canopite et Pixi  
no colliriis.



**F** Ad haec uero exulceribus cicatrices duobus uitiis periclitantur: ne aut caueat aut crassae sint. Si caueat sunt: potest eas implere id quod sphaerion uocari dixi: uel id quod asclepias nominatur: & habet papaueris lacrimae. P. XII. sagapeni: opopanaxidis: singulorum. P. XIII. eruginis: P. XIII. cumini. P. XVIII. piperis: P. XXII. cadmiae elotae / caerustae: singulorum. P. XXVI. At si crassae cicatrices sunt: extenuant uel Zmilion: uel Canopice collirium. quod habet cynamomi: a caciae: singulorum. P. XI. cadmiae elotae: croci myrrae: papaueris lacrimae: gummi: singulorum. P. XII. piperis: albi: turis: singulorum. P. XIII. aeris combusti: p. XVIII. cum aqua pluuiatili. Vel Euelpidis Pixinū quod ex his constat. Salis fossilis. p. XIII. ammoniaci: thymiamatis p. XVIII. papaueris lacrimae. p. XXII. caerustae. p. XXV. piperis albi: croci siculi: singulorum. p. XXX. II. gūmi. p. XXII. cadmiae elotae. p. XVIII. Maxime sollere cicatricem uidetur id quod habet gummi. p. XIII. ac eruginis. p. XI. croci magmaticis. p. XIII.

De alio genere inflammationis oculorum.

**E**ST etiam genus inflammationis: in qua sicuti tumore ac distenduntur cum dolore oculi: sanguinem ex fronte emitti necessarium est: multaq; aqua calida caput atq; oculos fouere: gargarizari ex lenticula uel ex fici cremore: inungui acribus medicamentis quae supra comprehensa sunt: maximeq; eo quod sphaerion nominatur. quod lapidem haematitē habet. Atq; alia quoq; utilia sunt: quae ad extenuandam aspritudinem fiunt. de qua protinus dicam. Hanc autem inflammatio oculorum fere sequitur: interdum maior: interdum leuior: non nunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit. deinde aspritudinem ipsam auget. fitq; ea in aliis breuis: in aliis longa & quae uix unquam finiatur. In hoc genere ualitudinis quidā crassas durasq; palpebras & ficulneo folio & asperato specillo & interdum scalpello eradunt. uersasq; quotidie medicamentis sufficiant. Quae neque nisi in magna uetustaq; aspritudine



neq; saepe facienda sunt. Nam melius eodem ratione victus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur & balneo frequentiore: multaq; oculorum palpebras aqua calida fouebimus. Cibos autem sumemus acres & extenuantes. *Cesarianum collirium*

**A** T medicamentum id quod cesarianum vocatur habet a trimenti sutorii. P. XI. myrrae. P. X. piperis albi. P. XV. papaueris lacrimae: gummi: singulorum. P. XII. cadmae lotae. P. XIII. stibis. P. XVI. Satisq; constat hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualitudinis idoneum esse: exceptis iis quae lenibus nutriuntur.

*Hieracis collirium*

**I** D quoq; quod Hieracis nominatur ad aspritudinem potest. Habet myrrae. p. XI. amoniaci: thymiamatis. p. XII. xanthi is rase. p. XIII. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum est etiam id quod Canopite est: et id quod zmiio vocatur: et id quod pixinum. et id quod Sphaerion. Si composita medicamenta non adsunt: felle caprino uel quam optimo melle satis commode aspritudo curatur.

*De Xyropthalmia: genere aridae lippitudinis*

**E** S etiam genus aridae lippitudinis: Xerophthalmiam graeci appellant. neq; tument: neq; fluunt oculi: sed rubent tantum & cum dolore quodam grauescunt & noctu praegrant pituita inhaerescunt. quantoq; minor generis huius impetus: tanto finis minus expeditus est. In hoc uitio multum ambulare: multum exerceri: lauare saepe: ibiq; desudare: multaq; frictione uti necessarium est. Cibi qui neq; implent: neq; nimium acres apti sunt: sed inter hos medii. Mane ubi concoxisse manifestum est: non alienum est ex sinapi gargarizare. cum deinde caput atq; os diutius defricare.

*Rhinion collirium*

**C** Ollirium uero aptissimum est: quod rhinion vocatur. Habet myrrae. P. X. papaueris lacrimae: acaciae succi: piperis: gummi: singulorum. P. XI. lapidis haematitis: lapidis



phrygii: lycii: lapidis scissilis: singulorum. P. XII. zris combusti. P. XIII. Ac pixinum quoque eodem accommodatum est.

#### Ad oculos scabros colliria

**S** I uero scabri oculi sunt: quod maxime in angulis esse consuevit: potest prodesse Rhinon id quod supra positum est. potest similiter prodesse id quod habet æruginis rasæ: piperis longi: papaueris lacrimæ: singulorum. P. XII. piperis albi: gummi: singulorum. p. XIII. cadmix ioræ: caerullæ: singulorum. P. XVI. Nullum tamen melius est quam Euelpidis quod basilicon nominabat. Habet papaueris lacrimæ: cærusæ: lapidis alii: singulorum. P. XII. gummi. P. XIII. piperis albi. P. XIII. croci. P. XVI. psorici. P. XXIII. Nulla autem per se materia est: quæ psoricum nominetur, sed chalcididis aliquid & cadmix dimidio plus ex aceto simul conteruntur: idque in uas fictile additum & contextum ficulneis foliis sub terra reponitur: sublatumque post dies uiginti rursus teritur & sic appellatur. Verum in basilico quoque collirio cōuenit ad omnes affectus oculorum id esse idoneum: qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta cōposita scabros angulos leuant & mel & uinum. Succurritque & his & aridæ lippitudini si quis panem ex uino subactum super oculum imponit. Nam cum fere sit humor aliquis: qui modo ipsum oculum modo angulos aut palpebras exasperat: sic & si quid prodit humoris: extrahitur: et si quid iuxta est: repellitur.

Ad caligationem oculorum quæ propter lippitudinem oritur remedia & colliria

**C** Aligare uero oculi non nunquam ex lippitudine: non nunquam etiam sine hac propter senectutem imbecillitatem uel aliam consueverunt. Si ex reliquis lippitudinis id uitium est: adiuvat collirium: quod asclepias nominatur. Adiuvat id quod ex croci magmate fit.

#### Diacroci collirium



**P**ropriè etiam ad id componitur: quod diacrocno  
cant. Habet piperis .P. XI. croci cilicis: papaueris la  
crimæ: carullæ: singulorum. P. XII. pforici: gutami: singu  
lorum. P. XIII.

Ad caligationem oculorum quæ propter senectutem aut ali  
am imbecillitatem fit.

**A**t si ex senectute / aliaue imbecillitate id est: recte inun  
gui potest & melle quam optimo & cyprino & oleo uetere.  
Commodissimum tamen est balsami partem unam: et olei ue  
teris: aut cyprini partes duas: mellis quā acerrimi partes tres  
miscere. Vtilia quoque huic medicamentis sunt: quæ ad caliginē  
proxime: quæque ad ex tenuandas cicatrices supra compre  
hensa sunt. Cuicumque uero oculi caligabunt: huic opus erit  
multa ambulatione atque exercitatione: frequenti balneo: ubi  
tutum quidem corpus perfricandum est: præcipue tamen ca  
put: et quidem irino / donec insudet. uelandumque postea: nec  
detegendum antequam sudor & calor domi: conquierint. Tum  
cibus utendum acris & extenuantibus. interpositisque aliqui  
bus diebus ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

**S**uffusio quoque: quam græci hypochysin nominant:  
interdum oculi potentia: qua cernit: se opponit. Quod  
si inueterauit: manu curandum est. Inter initia non nunquam  
etiam certis obseruationibus discutitur. Sanguinem ex fron  
te uel naribus mittere: in temporibus uenas adurere: gargariz  
ando pituitam euocare: suffumigare oculos acris medicamentis:  
inungere expedit. Vicius optimus est qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum: quæ paralytis dicitur.

**A**cne resolutio quidem oculorum: quam paralytim  
græci nominant: alio uictus modo: uel aliis medica  
mentis curanda est. Exposuisse tantum genus uicii satis est. I  
gitur interdum euenit modo in altero oculo: modo in utroque  
aut ex ictu aliquo: aut ex morbo comitiali: aut ex distentio  
ne neruorum: qua uehementer oculus ipse concussus est: ut is neque



quoquam intendi possit: nec omnino consistat: sed huc illuc  
ne sine ratione moueatur. ideoque ne conspectum quidem re-  
rum præstet.

De mydriasi oculorum

**N**on multum ab hoc malo distat id: quod mydriasi græ-  
ci uocāt. Pupilla effunditur et dilatatur: aciesque eius he-  
bescit: ac pene difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In  
utraque uero idest et paralyti et mydriasi pugnandum est per  
eandem omnia: quæ in caligine oculorum præcepta sunt: pau-  
cis tantum mutatis. Siquidem ad caput irino interdum acetū  
interdum nitrum adiiciendū est. melle inungi satis est. Qui-  
dam in posteriore uitio calidis aquis usi. releuatique. Quid ā  
sine ulla manifesta causa subito obæcati sunt. Ex quibus non  
nulli cum aliquandiu nihil uidissent: repentina profusione al-  
ui / lumen receperunt. Quo minus alienum uidetur / ex recenti  
re & interposito tempore medicamentis quoque moliri deiection-  
es: quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

**P**æter hæc imbecillitas oculorum est. ex qua quidam in-  
ter diu satis: noctu nihil cernunt. Quod infoeminam be-  
ne respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes in-  
ungi oportet sanguine iocineris / maxime hircini. sin minus /  
caprini: ubi id assum coquitur / excepto. atque edi quoque ipsum  
iecur debet. Licet et tamen etiam iisdem medicamentis non inu-  
tiliter uti: quæ uel cicatrices: uel aspritudinem extenuant. Qui-  
dam contrito semine portulacæ mel adiiciunt eatenus ne id ex  
specillo destillet. eoque inungunt. Exercitationibus: balneo: fri-  
ctionibus: gargarizationibus iisdem / his quoque utendum est.  
Ad oculos qui extrinsecus offenduntur: cum sanguine suffusi sunt

**E**t hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus  
uero interdum si ictus oculum lædit: ut sanguis in eo suf-  
fundatur: nihil commodius est / quam sanguine uel columbæ / uel  
palumbi / uel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit:



tum horum acies extrinsecus laesa interposito tempore in antiquum statum redeat: celeberrimeque hirundinis. Vnde etiam locus fabulae factus est: per parentes: id ne ha restitui: quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab exterro casu commodissime tuetur: hoc ordine: ut sit hirundinis optimus: deinde palumbi: minime efficax columbae & illi ipsi & nobis. Supra percussum uero oculum ad inflammationem leniendam non est alienum imponere etiam cataplasma. Sal ammoniacus / uel quilibet alius quam optimus teri debet: sic ut ei paulatim oleum adiciatur: donec crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina: quae ex mulso decocta sit. Facile autem recognitis omnibus: quae medici quoque prodiderunt / apparere cuilibet potest uix ullum ex his: quae supra comprehensa sunt: oculi uitium esse: quod non simplicibus quoque & promptis remediis subremoueri possit.

De aurium morbis & curationibus.

Caput. VII.

**H**Atenus in oculis ea reperiuntur: in quibus medicamenta plurimum possint. Ideoque ad aures transeundum est. quarum usum proximum a luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est. Nam uitia oculorum intra ipsos nocent. Aurium inflammationes doloresque / interdum etiam ad dementiam mortemque praecipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est: ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum / dolorem aliquis sensit: abstinere & continere se debet. Postero die / si uehementius malum est: caput tondere idque irino unguento calido perunguere & operire. At magnus cum febre uigiliisque dolor exigit: ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquae causae prohibent. aliud soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata perficiunt: siue foeni graeci siue lini / siue alia farina ex mulso decocta est. Recte etiam



subinde admoventur spongiae ex aqua calida expressae. Tum  
leuato dolore caeratum circumdari debet ex irino aut cyprino  
factum. In quibusdam tamen melius: quod ex rosa factum est  
proficit. Si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet  
adici cataplasinata debent papaueris corticis fricti atque con  
triti: sic ut ex his pars dimidia sit: eaque tum simul ex passo  
mixto decoquatur. In aurem uero infundere aliquod medica  
mentum oportet: quod semper ante tepescere conuenit. commo  
dissimeque per strigilem instillatur. Vbi auris repleta est: super  
lana mollis addenda est: quae humorem intus contineat. Et  
haec quidem communia sunt. Medicamentum uero est & rosa  
et radicum harundinum succus: et oleum in quo lumbrici coc  
ti sunt: et humor ex amaris nucibus: aut ex nucleo mali perfici  
expressus. Composita uero ad inflammationem doloremque le  
niendum haec fere sunt. Castorei / papaueris lacrimae pares  
portiones conteruntur. deinde adiicitur his passum. Vel papa  
ueris lacrimae: croci: mirrae par modus sic teritur: ut inuicem  
modo rosa / modo passum instilletur. Vel id quod amarum  
in aegyptia faba est: conteritur rosa adiecta. Quibus myrrae  
quoque paulum aquibusdam miscetur: uel papaueris lacrimae:  
aut tus cum muliebri lacte: uel amararum nucum cum rosae suc  
co. Vel castorei / myrrae: papaueris lacrimae pares portiones  
cum passo. Vel croci. P. XI. myrrae aluminis scissilis: singulo  
rum. P. XZ. quibus dum teruntur paulatim miscentur passi  
cyathi tres: mellis minus cyatho. Idque ex primis medicamentis  
est. Vel papaueris lacrima ex aceto. Licet etiam compositio  
ne uti Themisonis. quae habet castorei: opopanax / papau  
eris lacrimae ex aceto: singulorum. P. XII. spumae licii. P. X.  
III. Quae contrita passo excipiuntur donec caerati crassitu  
dinem habeant. Atque ita reponuntur. Vbi usus requiritur: rur  
sus idem medicamentum adiecto passo / specillo teritur. Illud ppe  
tuum est: quotienscumque crassius medicamentum est: quantum in aurem insti  
llari possit adiciendum esse humorem: ex quo id componi debet  
• γ. ii. •



## SEXTVS.

donec satis liquidum sit. Si uero pus quoque aures habent  
recte lycium per se infunditur: aut irinum unguentum: aut por-  
ri succus cum melle: aut centaureæ succus cum passo: aut dul-  
cis punici mali succus in ipsius cortice tepescit: adiecta my-  
rræ exigua parte. Recte etiam miscentur myrræ: quam stae-  
ten cognominant. P. XI. croci tantundem: nuces amaræ.  
.XXV. mellis sesquicyatus. Quæ contrita: cum utendum è  
in cortice punici mali tepescant. Ea quoque medicamenta: quæ  
oris exulcerati causa cõponuntur: æque ulcera aurium sanant.  
Quæ si uetustiora sunt: et multa sanies fluit: apta compo-  
sitiõ est: quæ ad uictorem Erasistratum refertur. Piperis. P. XI.  
croci. P. XI. myrræ: mysi cocti: singulorum. P. XII. aris  
combusti. P. XII. Hæc ex uino teruntur. Deinde ubi inarue-  
runt: adiiciuntur passi heminae tres & simul coquuntur. Cum  
utendum est: adiicitur iis mel et uinum. Est etiam Ptolemæi  
chirurgi medicamentum: quod habet lencisci. P. XI. gallæ.  
P. XI. omphacii. P. XI. succum punici mali. Est Menophili  
ualidum admodum: quod ex his constat. Piperis longi. P. XI.  
castorei. P. XII. myrræ: croci: papaueris lacrimæ: nardi syria-  
ci: turis: malicorii: ex ægyptia faba partis interioris: nucum  
amararum: mellis quam optimi: singulorum. P. XIII. Qui-  
bus: cum teruntur: adiicitur acetum quam acerrimum: donec  
crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis. cynamomi:  
casia: singulorum. P. XI. lycii: nardi: myrræ: singulorum. P.  
.XI. aloes. P. XII. mellis cyathi tres. uini sextarius. Ex qui-  
bus uinum cum lycio decoquitur. deinde his alia miscentur.  
Ac si multum puris: malusque odor est. aeruginis rassa: turis:  
singulorum. P. XII. mellis cyathi duo: aceti quattuor simul  
incoquuntur. Vbi utendum est: dulce uinum miscetur. Aut alu-  
minis scissilis: papaueris lacrimæ: acaciæ succi par pondus mi-  
scetur. hisque adiicitur hyoscyami succi dimidio minor: quam  
unius ex superioribus portio. Eaque trita ex uiro diluuntur. Per  
se quoque hyoscyami succus satis p̄ficit. Cõmune uero auxilium



aduersus omnes aurium casus: iamq; usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cynamomi: casiae: singulorum .P. XI. flores iunci rotundi: castorei albi piperis longi: amomi: myrobalani: singulorum scrupuli duo: turis masculi: nardi syriaci: myrrae pinguis: croci: spumae nitri: singulorum .P. XIII. Quae separatim contrita: rursus mixta ex aceto coeuntur: atq; ita condita: ubi utendum est: aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est Polybi sphragis ex dulci uino liquata. Quae compositio priore libello continetur. Quod si & sanies profluit & tumor est: non alienum est: mixto uino per oricularium clysterem eluere: & cum infundere unum austerum cum rosa mixtum: cui spodii paulum sit adiectum: aut lycium cum lacte: aut herbae sanguinalis succum cum rosa: aut mali punici succum cum exigua parte myrrae. Si sordida quoq; ulcera sunt: melius mulso eluuntur & cum aliquod ex iis quae supra scripta sunt: quod mel habeat: infunditur. Si magis pus profluit: et caput utiq; tendendum est et multa calida aqua perfundendum: et gargarizandum: et usq; ad lassitudinem ambulandum: et cibo modico utendum est. Si cruor quoq; ex ulceribus apparuit: lycium cum lacte debet infundi: uel aqua in qua rosa decocta sit: succo aut herbae sanguinalis: aut acaciae adiecto. Quod si super ulcera caro increuit: eaq; mali odoris sanguinem fundit: aqua tepida elui debet: cum infundi id: quod ex ture & ærugine & aceto & melle fit: aut mel cum ærugine incoctum. Squama quoq; æris cum sandaraca contrita per fistulam recte instillatur.

#### Aduersus aurium uermes

**V**bi uero uermes orti sunt: si iuxta sunt: protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius: medicamentis enecandi. Cauendumq; ne postea nascantur. Ad utrumq; proficit album ueratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet uino. in quo marrubium decoctum sit. Sic emortui uermes



in primam auris partem prouocabuntur. unde facillime educi possunt.

**S** Ad compressa aurium foramina  
In foramen auris compressum est: et intus crassa sanies subest: mel quā optimū addendum est. Si id pū proficit: mellis cyatho & dimidio / æruginis rasæ. P. XII. ad uiciendum est: incoquendumq; et eo utendum. Iris quoq; cum melle idem proficit. Item mellis: et rosæ: scripuli duo. Item galbani. P. XII. myrræ cum melle: & fellis taurini: singulorum. P. XII. uini quantum satis est ad myrram diluendam.

Ad grauem auditum

**V** Bi uero grauius aliquis audire coepit: Quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit: in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta qualis super ulcera innascitur: aut sordis coitus. Si crusta est: infundendum est aut oleum talidum: aut cum melle ærugo: uel porri succus: aut cum mulso / nieri paulum. Atq; ubi crusta a corpore iam recedit: eluenda auris aqua tepida est: quo facilius ea p se diducta / oriculario specillo protrahatur. Si sordes æque molles sunt: eodem specillo eximendæ sunt. At si duræ sunt: acetum & cum eo nieri paululum coiciendum est. Cumq; emollitæ sunt: eodem modo elui autem: purgari que oportet: Quod si capitis grauitas manet: attondendum idem: & leniter: sed diu perfricandum est: adiecto uel irino uel laureo oleo: sic ut utrilibet paulum aceti misceatur. cum diu ambulandum: leniterque post unctionem / aqua calida caput fouendum. Cibisq; utendum ex imbecillissima & media materia: magisque assumendæ dilutæ potiones. non nunquam gargarizandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto & laureo oleo & succo radiculæ corticis. Aut cucumeris agrestis succus adiectis contritis rosæ foliis. Immaturæ quoque uix succus cum rosa instillatus aduersus sordiditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra se ipsas.



**A**liud uitii genus est: ubi aures intra seipsas sonant. Atque hoc quoque fit: ne externum sonum accipiant. Leuissimum est: ubi id ex grauedine est. Peius: ubi ex morbis: capitis uel longis doloribus incidit. Pessimum: ubi magnis morbis nientibus: maximeque comitiali/ prouenit. Si ex grauedine est: purgare aurem oportet: & spiritum continere donec inde humor aliquis expumet. Si ex morbo/ uel capitis dolore. quod ad exercitationem: frictionem: perfusionem: gargarizationem pertinet: eadem facienda sunt. Cibis non utendum/ nisi exnuantibus. In aurem dandus radiculae succus cum rosa: uel cum succo radicis ex cucumere agresti: uel castoreum ex aceto & laureo oleo. Veratrum quoque cum aceto conteritur. deinde melle costeo excipitur: et inde collirium factum in aurem demittitur. Si sine his cepit: ideoque nouo metu terret: in aurem dari debet castoreum cum aceto uel irino uel laureo oleo: aut huic mixtum castoreum cum succo nucum amaratum: aut myrra & nictum cum rosa & aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit uictus ratio. Eademque facienda sunt: quae supra comprehendimus: cum maiore quoque diligentia: et praeterea donec is sonus finiat: a uino abstinendum. Quod si simul & sonus et inflammatio: laureum oleum coiecit abunde est. aut id quod ex amaris nucibus exprimitur. Quibus quidam uel castoreum uel myrram miscent.

Adea quae in aurem inciderunt extrahenda.

**S**olet etiam interdum in aurem aliquid incidere: ut calculus: aliquodue animal. Si pulex intus est: compellendum eo lanae paulum est: quo ipse is subit & simul extrahitur. Si non est secutus: aliud uel animal est: specillum lana inuolutum in resinam quam glutinosissimam/ maximeque terebinthinam demittendum: idque in aurem coiciendum: ibique uertendum est. Utique enim comprehendet et eximet. Sin aliquid ex anime est: specillo oriculario protrahendum est: aut hamulo retuso paulum recuruato. Si ista nihil proficiunt: potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commo-



de elidunt: aut oriculario clystere aqua uehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media inhaerens capitibus utriusque pendentibus: superque eam homo deligatur in id latus uersus: cuius auris eo modo laborat: sic ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulae: quod a pedibus est: feritur. atque ita concussa aure: id quod inest: excidit.

De narium morbis & curationibus.

Caput. VIII.

**N**ares uero intus exulceratas fouere oportet uapore aquae calidae: id est spongia expressa atque admota. fit & subiecto uase oris angusti calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda ulcera sunt: aut plumbi recremento: aut crassa. Aut argenti spumam cum quolibet horum aliquis conterit. eique dum teritur inuicem uinum & oleum myrteum adicit: donec mellis crassitudinem fecerit. sin autem ea ulcera circa nares sunt: pluresque crustas & odorem foedum habent: quod genus graeci ozenan appellant: sciri quidem debet: uix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen haec tentari possunt: ut caput ad cutem toneatur: assidueque uehementer perfricetur: multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit. cibis modicus: neque acer neque ualentissimus. Tum in nares ipsam mel cum exiguo modo resinae terebinthinae coiciatur. Quod specillo quoque inuoluto lana fit: attrahaturque spiritus is succus donec in ore gustus eius sentiat. sub his enim crustae resolvuntur: quae tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus uapor aquae calidae subiiciendus est. Deinde adhibendum aut lycium ex uino dilutum: aut amurea: aut omphacium: aut menta: aut marrubii succus: aut atramentum sutorium: quod candens factum deinde contritum sit: aut interius scyllae pars contrita: sic ut horum cuiuslibet mel adiciatur. Cuius in ceteris admodum exigua pars esse debet. in atramento sutorio tanta: ut ea mixtura liquida fiat. cum scylla utique pars maior. inuoluendumque lana specillum est & in eo medicamento intinguendum: eoque uicera implenda sunt. Rursus scylla



mentum inuolutum & ob longum eodem medicamento illinen-  
dum: demittendumq; in nares est: et ab inferiore parte leniter  
deligandum. Idq; per hyemem & uer/bis die: per æstatem &  
autumnū / ter die fieri debet. Interdum uero etiam in nari-  
bus caruncula quaedam similes muliebribus mammis nascun-  
tur: hæc in imis partibus quæ carnosissimæ sunt inhaerent.  
Has curare oportet medicamentis adurentibus sub quibus ex-  
toto consumuntur. Polypus uero est caruncula modo alba mo-  
do sub rubra: quæ narium ossi inhaeret: et modo ad labra pen-  
dens nares implet. modo retro per id foramen: quo spiritus  
anaribus ad fauces descendit: adeo increscit: uti post uiam cō-  
spici possit: strangulatque hominem maxime austro aut eu-  
ro flante. fereque mollis est: raro dura: eaque magis spiritum  
impedit & nares dilatat. quæ fere carcinodes est. Itaque attin-  
gi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur: in-  
terdum tamen inarescit. si addita in nares per linamentum  
aut penicillum ea compositio est: quæ habet minii sinopici /  
chalcitis: calcediis: sandaracæ: singulorum. P. XI. atramenti  
sutorii. P. XII.

De dentium dolore & curationibus.

Caput. IX.

**I**N dentium autem dolore: qui ipse quoq; maximis tor-  
mentis annumerari potest: uinum ex toto circuncidendū  
est. Cibo quoq; primo abstinendum: deinde eo modico molli  
que utendum: ne mandentis dentes irritet. tum extrinsecus ad-  
mouendus per spongiam napor aquæ calidæ: imponendum  
quæ caeratum excyprino aut itino factum: lanaque id com-  
prehendendum: caputque uelandum est. Quod si grauior is  
dolor est. utiliter & aluus ducitur: et calida cataplasmata su-  
per maxillas iniiciuntur: et ore humor calidus cum medicamē-  
tis aliquibus continetur: sæpiusque mutatur. Cuius rei causa  
& quinque folii radix in uino mixto coquitur: et hyoscyami  
radix uel in posca uel in uino mixto coquitur: sic ut paulum



his salis adiciatur: et papaueris non nimium aridi corticis: et mandragoræ radix eodem modo. Sed in his tribus utiq; uitā dum est: ne quod haustum erit: deuoretur. Ex populo quoq; alba cortex radice in hunc usum in uino mixto recte coquitur & in aceto cornu ceruinum rasum & nepeta cum tēda pingui: ac ficus item pinguis uel in mulso uel in aceto & melle. ex quibus cum ficus decocta est: is humor percolatur. Specillum quoq; lana inuolutum in calidum oleum demittitur: eoq; ipso dens fouetur. Quin etiam quædam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur. In quem usum ex malo punico acido atq; arido malicorii pars interior cum pari portione & gallæ & pinei corticis conteritur: misceturque his minium: eaque contrita / aqua pluuiatili coguntur. Aut panacis: papaueris lacrimæ: peucedani: uuae timiniae sine seminibus pares portiones conteruntur. Aut galbani partes tres: papaueris lacrimæ pars quarta. Quicquid dentibus admotum est: nihilo minus supra maxillā: caeratum: quale supra posui: esse debet / lana obiectum. Quidam etiam myrræ: cardamomi: singulorum. P. XI. croci: pyretri: ficorum partes: singulorum. P. XIII. Sinapis. P. XVIII. contrita linteolo illinunt: imponuntq; in humero partis eius qua dens dolet. Si is superior est: a scapulis. Si inferior: a pectore. Idq; dolorem leuat. et cum leuauit: protinus submouendum est. Si uero exesus est dens: festinare ad eximēdum eum: nisi res coegit: non est necesse. Sed cum omnibus fo mentis: quæ supra posita sunt: adiciendæ quædam ualentiores compositiones sunt: quæ dolorem leuant. quales hæc sunt. Habet autem papaueris lacrimæ. P. XI. piperis. P. XII. pso reos. P. XX. quæ contrita galbano excipiuntur: idq; circundatur. Aut Menemachi maxime ad maxillares dentes. in qua sunt croci. P. XI. cardamomi: turis fuliginis: ficorum partes: pyretri singulorum. P. XIII. sinapis. P. XVIII. Quidam autē immiscēt pyretri: piperis: elaterii: singulorum. P. XI. aluminis scissilis. papaueris lacrimæ. uux timiniae. sulphuris ignem



non experti: bituminis: lauri baccharum: sinapis: singulorum .P. XII. Quod si dolor eximi eum cogit: et piperis semen cortice liberatum: et eodem modo bacca hederæ coniecta in id foramen / dentem findit. isq; forte stans excidet. Et plani piscis quam pastinacam nostri: trygona græci uocant: aculeus torretur: deinde conteritur: resinaq; excipitur. quæ denti circum data hunc soluit. Et alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: Sed id tamen inuolutum in lanula demitti commodius est. quia sic dente seruato dolorem leuat. Haec a medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum est: cum dens dolet: herbam mentastrum cum suis radicibus uelli arbore & in peluem conici. supraq; aquam infundi: collocariq; iuxta / sedentem hominem undique ueste contestum. tum in peluem candentes silices demitti / sic ut aqua tegantur: hominemque eum hiante ore uaporem excipere: ut supra dictum est: undique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur: et per hos continens pituita defluit. idque sæpe longiorem: sæpe annuam ualitudinem bonam præstat.

De tonsillis & earum cura.

Caput. X.

**S** I uero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt: caput uelandum est extrinsecus. is locus uapore calido fouendus. multa ambulatione utendum. caput in lecto sublime habendum: gargarizandumque est ex reprimentibus. Radix quoque ea: quam dulcem appellant: contusa & in passio, mulsoque decocta idem præstat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est. quæ hoc modo fiunt. Ex malo punico dulci succus exprimitur: et eius sextarius in leni igne coquitur: donec ei mellis crassitudo sit. tum croci: myrræ: aluminis scissilis: singulorū .P. XII. per se conteruntur: paulatimque his adiiciuntur uini lenis cyathi duo: mellis unus. deinde priori succo ista miscentur: et rursus leniter



incoquantur. Aut eiusdem succi sexarius eodem modo coquitur: atque eadem ratione trita ei adiciuntur hæc. Nardi. P. X. omphacii. P. XI. cynamomi: myrræ: casiae: singulorum P. XI. Eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoque in hac ualitudine lenis esse debet ne exasperet. Quod si tanta inflammatio est: ut spiritum impediat: in lecto conquiescendum: a cibo abstinendum: neque assumendum quicquam præter aquam calidam est. Alius quoque ducenda est. Gargarizandum ex fico & mulso. Illi nendum mel cum omphacio. Intrinsicus admouendus: sed aliquanto diutius: uapor aquæ calidæ donec ea suppurent & per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur ii tumores: incidendi sunt. deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico. At si modicus quidem tumor et exulceratio est: furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adiciendum est: illi nendaque ulcera hoc medicamento. Passi quamdulcissimi tres heminæ adunam coquantur. tum adicitur turis. P. XI. croci: myrræ: singulorum. P. X: leniterque omnia rursus feruescunt. Vbi pura ulcera sunt: eodem furfurum cremore: uel lacte gargarizandum est. Atque hic quoque cibus lenibus opus est. quibus adiaci dulce uinum potest.

De oris ulceribus & curatōibus & quæ antheræ sint. Caput: XI.

**U**lcera autem oris si cum inflammatione sunt: et parum pura ac rubicunda sunt: optime iis medicamentis curantur quæ supra posita ex malis punicis fiunt: Continendusque sæpe ore reprimens cremor: est cui paulum mellis sit adiectum. Utendum ambulationibus et non acri cibo. Simulatque uero pura ulcera esse coeperunt: lenis humor: interdum etiam quam optima aqua ore continenda est. Prodestque assumptum purum uinum: pleniorque cibus: dum acribus uacet. Inspergigue ulcera debent alumine scissilli: cui dimidio plus gallæ inma



curæ sit adiectum. Si iam crustas habent: quales inadustis esse consuerunt: adhibendæ sunt ex compositiones: quas graeci antheras nominant. Iunci quadrati: myrræ: sandaracæ: singulorum P. XIII. aluminis pares portiones. Aut croci: myrræ: singulorum. P. XII. iridis: aluminis scissilis: sandaracæ: singulorum. P. XIII. iunci quadrati. P. XVIII. Aut gallæ: myrræ: singulorum. P. XII. aluminis scissilis. P. XII. rosæ foliorum P. XIII. Quidam autem croci. P. X. aluminis scissilis: myrræ: singulorum. P. XI. sandaracæ. P. XII. iunci quadrati. P. XIII. miscent. Priora arida insperguntur. Hoc cum melle illinitur. neq; ulceribus tantum: sed etiam consillis. Verum ea longe periculossima ulcera sunt: quas apthas graeci appellant: sed in pueris. Hos enim saepe consumunt. In uiris & mulieribus idem periculum non est. Haec ulcera aginguis incipiunt: deinde palatum totumq; os occupant: tum ad uiam faucesq; descendunt. Quibus obsessis non facile fit: ut puer conualescat. Ac miserius etiam est. si lactans adhuc infans est. quo minus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus / iisque operibus: quae superiores partes mouent. Mittenda in balneum: iubendaq; ibi calida aqua mammas perfundere. tum alenda cibis lenibus & iis qui facile non corrumpuntur. Potiones: si febricitat puer: aquae. si sine febre est: uini diluti. Ac si alius nutritici substituit: ducenda est. Si pituita eius in os coit: uomere debet. Tum ipsa ulcera perungenda sunt melle: cui ros: quæ syriacum uocant: aut amarae nuges adiectae sunt. Vel mixtis inter se rosae foliis aridis: pineis nucleis: mentae coliculo: melle. Vel eo medicamento: quod ex moris fit. quorum succus eodem modo quo pnnici mali ad mellis crassitudinem coquitur. eademq; ratione ei crocum: myrra: alumen: uinum: mel / miscetur. Neq; quicquam dandum: ad quod humor euocari possit. Si uero iam firmior puer est: gargarizare debet iis fere: quæ supra comprehensa sunt. Ac si lenia medicamenta in eo parum proficiunt: adhibenda sunt ea: quae adurendo crustas ulceribus iducant. Quale est scissile alumen: uel chalcitis: uel atramentum sutorium.



Prodest etiam fames et abstinencia quāta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

De linguae ulceribus. Caput. XII.

**I**nguāe quoque ulcera non aliis medicamentis egent: quam linguae prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quae in latere eius nascuntur: diutissime durant. Videndumque est num contra dens aliquis acutior sit: qui sanescere saepe ulcus eo loco non finit. ideoque limandus est.

De parotidibus gingivarum tuberculis deque aliis ulceribus gingivarum. Caput. XIII.

**S**olent etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quaedam oriri dolentia: parotidas graeci appellant. Haec initio leniter sale contrito perfricare oportet. aut interse mixtis sale fossili: combusto cupresso. nepeta. deinde eluere os tremore lenticulae. et inter haec hiare: donec pituita satis profluat. In maiore uero inflammatione iisdem medicamentis utendum est: quae ad ulcera oris supra posita sunt: & mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione exiis: quas aetheras uocari dixi: demittendumque id inter dentem & gingiuam. quod si durior erit & id prohibebit: extrinsecus admouendus erit spongiae uapor calidus: imponendumque caeratum. Si suppuratio se ostendet: diutius eo uapore utendum erit: & continendum ore calidum mulsum: in quo ficus decocta sit. Itemque sub crudum incidendum: ne si diutius ibi pus permanserit: os laedat. Quod si maior is tumor est: commodius totus exciditur: sic ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exempto: si levis plaga est: satis est ore calidam aquam continere: et extrinsecus fouere eodem uapore. Si maior est: lenticulae cremore. Vti iisdem medicamentis: quibus caetera ulcera oris curantur. Alia quoque ulcera in gingivis plerumque oriuntur: quibus eadem quae in reliquo ore succurrunt. Maxime tamen mandere ligustrum oportet: succumque eum ore continere. Fit etiam interdum: ut ex gingivae ulcere: siue parotides



fuit: siue non fuit: diutius pus feratur. Quod aut dente corru-  
ptor: aut fracto: uel aliter uitiato ossis: maximeq; id per fistu-  
lam uenire consuevit. Vbi incidit: locus aperiendus: dens exi-  
mendus: testa ossis siqua excessit recidenda est: siquid uitiati  
est radendum. Post quae quid fieri debeat supra in aliorum ul-  
terum curatione comprehensum est. Si uero a denticibus gingi-  
uae recedunt: eadem antherae succurrunt. Utile est etiam pira  
aut mala non permatura mandere: et ore eum humorem con-  
nere. Idemq; praestare non acre acetum in ore retentum potest.

De uuae morbo & curatione.

Caput. XIII.

**U**uae uehemens inflammatio terrere quoq; debet. Itaq; in  
hac & abstinencia necessaria est: & sanguis recte mitti-  
tur: et si id aliqua res prohibet: alius utiliter ducitur: caputq;  
super hac uelandum & sublimius habendum est. cum aqua gar-  
garizandum: in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illi-  
nend. autem ipsa uua uel omphacio: uel galla: uel alumine scis-  
sili: sic ut cuilibet eorum mel adiciatur. Est etiam medica-  
mentum huic aptum: quod andronium appellatur. Constat ex  
his. alumine scissili: squama aeris rubri: atramento sutorio:  
galla: myrra: mysi. Quae per se contrita mixtaq; rursus paula-  
ti a liecto uino austero teruntur: donec his mellis crassitudo  
sit ubi horum aliquo illita uua est: celidoniae quoq; succo per co-  
cheat illita uua maxime prodest. Fere multa pituita decurrit:  
cumque ea quieuit: ex uino calido gargarizandum. Quod si  
minor in ea inflammatio. laser terere: eiq; adicere frigidam a-  
quam satis est: eamque aquam cochleario exceptam ipsi uuae  
subiicere. Ac mediocriter eam tumentem aqua quoq; frigida  
eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua: garga-  
rizandum quoq; est: quae uel cum lasere: uel sine eo hac curatio-  
ne uuae subiecta est.

De cancro oris.

Caput XV.

.z. ii.



**S**i quando autem ulcera oris cancer inuasit: primum confi-  
 derandum est: num malus corporis habitus sit: eique oc-  
 currendum. deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in summa  
 parte iduicium est: satis proficit ambra humido ulcere arida  
 inspersa: siccori cum exigua parte mellis illita. Si paulo alti-  
 us chartae combustae partes duae: auripigmenti pars una. Si  
 penitus malum descendit: chartae combustae partes tres: auri-  
 pigmenti pars quarta. Aut pares portiones salis fricti & iri-  
 dis fricti. Aut item pares portiones chalcitidis: calcis: auri-  
 pigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere.  
 et super adurentia medicamenta imponere: ne uicinum & sanū  
 locum laedant. Quidam etiam in acris aceti herinam frictum  
 salem coiciunt: donec tabescere desinat. deinde id acetum co-  
 quunt: donec exicceretur: eumq; salem contritum inspergunt.  
 quotiens autem medicamentum iniicitur: et ante & post / os di-  
 luendum est uel cremore lenticulae / uel aqua in qua aut erum /  
 aut olea. aut uerbenae decoctae sint: sic ut / cuilibet eorum pau-  
 lum mellis misceatur. Acetum quoq; ex scylla retentum ore /  
 satis aduersus haec ulcera proficit. Ex aceto cocto sali: sicut su-  
 pra demonstratum est: rursus mixtum acetum. Sed & diu con-  
 tinere utrunlibet: et id bis aut ter die facere / pro ut uehemens  
 malum est: necessarium est. Quod si puer est: cui id incidit.  
 specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est:  
 & super ulcus tenendum: ne per imprudentiam adurentia deuo-  
 ret. Et si dolor ingingiu is est: mouenturq; aliqui dentes: refi-  
 ci eos oportet. Nam curationes uehementer impediunt. Si ni-  
 hil medicamenta proficient: ulcera erunt adurenda. Quod ta-  
 men in labris ideo non est necessarium. quoniam excidere co-  
 modius est. Et id quidem aequè adustum atq; excisum sine ea  
 curatione: quae corpori manu adhibetur / impleri non potest.  
 Gingiuarum uero ossa / quae hebetia sunt / in perpetuum ustione  
 nudantur. Neq; enim postea caro increfcit. Imponenda tamen  
 adustis lenticula est: donec sanitatem: qualis esse potest reci-  
 piant.



De parotibus: quae sub auribus oriuntur. Caput. XVI.

**H**aec is capita ferementis egent. Sub ipsis uero auribus oriri parotides solent: modo in secunda ualitudine ibi inflammatione orta: modo post longas febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est. Itaque nullam nouam curationem desiderat. Animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam, quia si sine morbo id intumuit: primum reprimendum / experimentum est. Si ex aduersa ualitudine illud inimicum est: maturarique & quam primum aperiri commodius est.

De umbilici prominentis curatione. Caput. XVII.

**A**d umbilicos uero prominentes: ne manu / ferroque utendum sit: ante tentandum est: ut abstineat. alius is ducatur, imponatur super umbilicum id: quod ex his constat. Cicuta & fuliginis: singulorum .P. XI. caeruleae elotae. P. XIII. plumbi eloti. P. XVIII: ouis duobus. quibus etiam folani succus adiiicitur. Hoc dilutius impositum esse oportet: et interim conuiescere hominem. cibo modico uti: sic / ut uideantur omnia in infantia.

De obscenarum partium uitiis & curationibus. Caput. XVIII.

**P**roxima sunt ea: quae ad partes obscenas pertinent: quarum apud graecos uocabula & tolerabilius se habent: et accepta iam usu sunt. cum omni fere medicorum uolumine atque sermone iactentur apud nos foediora uerba: ne consuetudine quidem aliqua uerecundius loquentium commendata sunt. ut difficilis haec explanatio sit simul & pudorem et artis praecepta seruantibus. Neque tamen ea res a scribendo detertere me debuit. Primum ut omnia: quae salutaria accepi: comprehenderem. dein quia inuulgus eorum curatio etiam praecipue cognoscenda est. quae inuicissimus quisque alteri ostendit.

De colis / morbis et curationibus

**I**gitur si ex inflammatione coles intumuit: reduci que summa cutis: aut rursus induci non potest multa calida aqua fouendus locus est: Vbi uero glans contexta est: oriculatorio quoque clystere inter eam / cutemque aqua calida



inferenda est. Si mollita sic & extenuata cutis ducenti paruit: expecta. Iuxta reliqua curatio est. Si tumor uicit: imponenda est uel lenticula uel marrubium uel oleæ folia ex uino cocta: sic ut cuilibet eorum dum teritur: mellis paulum adiciatur. Super sumq; coles aduentrem deligandus est. Quod in omni curatione eius necessarium est. Itq; homo continere se debet: et abstinere a cibo: et potione aquæ tantum assiri uindicari. Postero die rursus adhibendum hisdem rationibus aquæ fomentum est & cum ui quoq; experiendum: an cutis sequatur. Ea q; si non parebit: leuiter summa scalpello concidenda erit. Nam cum sanies profluxerit: extenuabitur is locus & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo uicta erit: siue nunquam repugnauerit: ulcera uel in cutis ulteriore parte: uel in glandes ultra ue eam in cole reperientur. Quæ necesse est: aut pura siccae sint: aut humida & purulenta. Si sicca sunt: primum aqua calida fouenda sunt: deinde imponendum lycium ex uino est: aut amurca cocta cum eodem: aut cum rosa butyrum. Si leuis is humor est uino eluenda sunt. tum bueyri & rosæ mollis paulum & resinæ terebinthinæ pars quarta adicienda est: eoq; utendum. Aut si pus ex his profluit: ante omnia elui mulso calido debet. Tum imponi piperis. P. XI. myrræ. P. XII. croci: mysi cocti: singulorum. P. XII. Quæ ex uino austero coquuntur: donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio consililis: uux madentioris: nariumq; ulceribus accommodata est. Aliud ad eam: piperis. P. XI. myrræ. P. XI. croci. P. XII. mysi cocti. P. XI. xris combusti. P. XII. Quæ primum ex uino austero conteruntur: deinde ubi inauerunt: iterum teruntur ex passi cribus cyathis & incoquuntur: donec uisci crassitudinem habeant. Aerugo quoq; cum cocto melle: et ea quæ ad oris ulcera supra comprehensa sunt: curant. Aut Erasistrati compositio: aut Cratonis recte super purulenta naturalia imponitur. Folia quæq; oleæ ex nouem cyathis uini coquuntur. His adicitur aluminis scissilis. P. XIII. lycii. P. XVIII. mellis sesquicyathus. Ac si plus puris est: id medicamentum



ex melle. si minus: ex uino diluitur. Illud perpetuum est. post curationem dum inflammatio manet: quale supra positum est cataplasma supra dare: et quotidie ulcera eadem ratione curare. Quod si pus & multum & cum malo odore coepit profluere: elui cremore lenticulae debet: sic ut ei mellis paulum adiciatur: aut oleae: uel lentisci folia: uel marrubium decoquendum est. Eoque humore eodem modo cum melle utendum: imponendaque eadem: aut etiam omphacium cum melle: aut id quod ex aerugine & melle ad aures fit: aut compositio Andronis. aut anthera: sic ut ei paulum mellis adiciatur. Quidam ulcera omnia: de quibus adhuc dictum est: lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atque altius serpit: eodem modo elui debet. Imponi uero: aut cerugo: aut omphacium cum melle: aut Andronis compositio: aut marubii: myrrae: aut croci: aluminis scissilis cocti: rosae foliorum aridorum: gallae: singulorum. P. XL. minii sinopici. P. XII. Quae per se singula primum teruntur: deinde iuncta iterum melle adiecto: donec liquidi exarati crassitudine habeant: tum in aeneo uase leniter coquantur ne superfluant. Cum iam guttae indurescunt: uas ab igne remouetur: idque medicamentum tum / pro ut opus est / aut ex melle aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas utile est. Solet etiam interdum ad nervos ulcus descendere: profluatque pituita multa: sanies tenuis maliq; odoris: non cocta: aut aquae similis: in qua caro recens lora est. Doloreque is locus & putredines habet. Id genus quamuis inter purulenta est: tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum: ex rosa liquatum: sic ut turis quoque paulum ei miscatur. Aut id quod ex butyro: rosae: resina: melle fit. Supra uero ante positum est. Praecipueque id ulcus multa calida aqua fouendum est: uelandumque: neque frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus: sic / ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. Perpetuumque est: quotiens glans: aut excole aliquid: uel excidit: uel abscinditur: hanc non esse seruandam: ne conficiat: ulcerique agglu



tinetur: ac neq; reduci possit postea, et fortasse fistulam quoque urinæ cludat. Tubercula etiam: quæ phymata græci uocant circa glandem oriuntur: quæ uel medicamentis uel ferro aduruntur: et cum crustæ exciderunt / squama æris inspergitur: ne quid ibi rursus increseat.

De cancri: qui in cole nascitur: curatione

**H**æc citra cancrum sunt, qui cum in reliquis partibus: tum in his quoque uel præcipue ulcera infestat. Incipit angitæ: quæ si cutem occupauit: protinus specillum subiiciendum: eaque incidenda est. deinde ora uulsellæ prehendendæ. tum quicquid corruptum est: excidendum: sic ut ex integro quoque paulû demat: idque adurendum. Quociens quid uisum est: id quoq; sequitur: ut imposita lenticula sit. deinde ubi crustæ exciderunt: ulcera sic ut alia curentur. At si cancer ipsum colem occupauit: inspargenda aliqua sunt ex adurentibus: maximeq; id quod ex calce: chalcitide: auripigmento componitur. Si medicamenta uincuntur: hic quoque scalpello quicquid corruptum est: sic ut aliquid etiam integri trahat: præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est: exciso cancro uulnus esse adurendum. Sed siue ex medicamentis / siue ex ferro crustæ occalluerunt: magnum periculum est: ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili pene corpore opus est: donec ex ipso / crustæ puræ leniter resoluantur. At si uel uolens aliquis uel imprudens dum ingreditur immature crustas diduxit & fluit sanguis: frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum ualet: decurrendum est ad medicamenta: quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt: aduri diligenter et timide debet neque ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De phagedænae in cole nascentis curatione

**N**on nunquam etiam id genus ibi cancri: quod phagedæna a graecis nominatur: oriri solet. in quo minime differendum: sed protinus hisdem medicamentis occurrendum est: & si parum ualet: ferro adurendum. Quaedam etiam nigræ.



ties est: quæ non sentitur & serpit: ac si sustinuerimus usq; ad u-  
sicam tendit: neq; succurri postea potest. Si id in summa gla-  
nde circa fistulam urinæ est: prius in ea tenne specillum demit-  
tendum est: ne claudatur. deinde id ferro adurendum. Si uero  
alte penetravit: quicquid occupatum est: præcidendum est. Cæ-  
terum eadem: quæ in aliis canceris: facienda sunt.

De carbunculo qui in eole nascitur.

**O**ccallefcit etiam incole interdum aliquid: idq; omni pe-  
ne sensu caret. Quod ipsum quoq; excidi debet. Carbu-  
culus autem ibi natus ut primum apparet: oriculario, clystere  
eludendus est. Deinde ipse quoq; medicamentis utendus: maxi-  
meq; chalcitide cum melle: aut ærugine cum cocto melle. aut o-  
uillo stercore fricto & contrito cum eodem melle. Vbi is exci-  
dit: liquidis medicamentis utendum est: quæ ad ora ulceris co-  
ponuntur.

De testiculorum morbis & eorum curatione.

**I**n testiculis uero si qua inflammatio sine ictu orta est: sa-  
nguis ex talo mittendus est. acibo abstinendum. im-  
ponendum ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito  
ex melle cocto: Aut contritum cuminum cum cærato ex rosa  
facto. Aut lini semen frictum contritum & in mulso coctum  
aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso. aut lilii radix  
contrita. aut si iidem induruerunt: imponi debet lini uel foeni  
graeci semen ex mulso coctum: aut ex cyprino cæratum: aut  
similia ex uino contrita: cui paulum croci sit adiectum. Si ue-  
rustior iam durities est: maxime proficit cucumeris agrestis  
radix ex mulso cocta: dein contrita. Si ex ictu tument: sangui-  
nem mittere necessarium est: magisq; si etiam liuene. Imponen-  
dum uero utrunlibet ex his quæ cum cumino componuntur: su-  
praq; proposita sunt. aut ea compositio: quæ habet nitri coc-  
ti. P. XI. resinæ pinæ: gummi: singulorum. P. XII. uuae ti-  
minæ sine seminibus. P. XIII. mellis quantum satis sit ad  
ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid desit: fere pus  
quoq; increfcit: neque aliter succurri potest: quam si inciso



.SEXTVS .

seroto & pus emissum: et ipse testiculus excisus est.

De ragadiis & Condilomate & hæmorrhoidis: aliisque ani mor-  
bis & curationibus eorum & primo de ragadiis

**A** Nus quoque multa tedii que plena mala recipit: nec  
in se multum abhorrentes curationes habet. At primū  
ineo sæpe & quidem pluribus locis / cutis exciditur.  
Ragadia græci uocant. Id si recens est: quiescere homo debet  
in aqua calida desidere. Columbina quoque oua coquenda sunt  
et ubi aduruerunt / purganda. deinde alterum iacere in aqua be-  
ne calida debet: altero calido foueri locus: sic / ut inuicem utro-  
que aliquis utatur. Tum tetrapharmacum: aut rhyppodes / ro-  
sa diluendum est: aut hyssopum recens miscendum cum cærato  
liquido ex rosa facto. Aut eidem cærato liquido plumbum e-  
lorum adiciendum. Aut resina terebinthinae myrra. aut spu-  
mae argenti uetus oleum. Et quolibet ex his id perungendum.  
Si quicquid laesum est: extra est: neque intus reconditum / eo-  
dem medicamento tinctum linamentum super dandum est: et  
quicquid ante adhibuimus cærato contegendum. In hoc autē  
casu neque acris cibis utendum: neque asperis: nec alium cō-  
primentibus. ne aridum quidem quicquam satis utile est: nisi  
admodum paulum. Liquida: lenia: pigra: glutinosa meliora  
sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

De condilomate.

**C**ondiloma autem est tuberculum: quod ex quadam inflam-  
matione nasci solet. Id ubi ortum est: quod ad quietem  
cibos: potionesque pertinet: eadem seruari debent: quæ proxi-  
me scripta sunt. Iisdem etiam ouis recte tuberculum id fouetur.  
Sed desidere ante homo in aqua debet: in qua uerbena deco-  
ctæ sunt ex reprimentibus. Tum recte imponitur & lenticula cū  
exigua mellis parte: et sertula campana ex uino cocta: et rubi  
folia contrita cum cærato extrosa facto. et cum eodem cærato  
contitum / uel corot. eum malum: uel malicorii ex uino cocti



pars interior: & chalcitis cocta atq; contrita: deinde hyssopo  
ac rosa excepta. Et ex ea compositione: quæ habet turis. P.  
XI. aluminis scissilis. P. XII. cerussæ. P. XIII. spumæ ar  
genti. P. XV. Quibus dum teruntur: inuicem rosa & uinum  
instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum: aut pāniculus  
quadratus est: qui ad duo capita duas ansas: ab altera uero  
parte totidem fascias habet: cumq; subiectus est: ansis ad uen  
trem datis a posteriore parte in eas adductæ fasciæ coiciuntur:  
atq; ubi artatæ sunt: dexteriori sinistra: sinisteriori dextra  
procedit. circumdataeq; circa aluum inter se nouissime nodo  
deligantur. Sed si uetus condiloma iam induruit neq; sub his  
curationibus desidit: aduri medicamento potest: quod ex his  
constat. æruginis. P. XII. myrræ. P. XIII. gummis. P. XV  
III. turis. P. XXII. Stibis: papaueris lacrimæ: acaciæ: singulo  
rum. P. XXVI. quo medicamento quidam etiam ulcera: deq;  
bus proxime dixi: renouant. Si hoc parum in condilomate p  
ficat: adhiberi possunt etiam uehementius adurentia. Vbi cō  
sumptus est tumor: ad medicamenta lenia transeundum est.

## De hæmorrhoidis

**T**ertium autem uitium est: ora uenarum canquam ex ca  
piculis quibusdam surgentia: quæ sæpe sanguinem fun  
dunt: hæmorrhoidas graeci uocant. Idque etiam in ore uuluae  
foeminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum  
tuto supprimitur: qui sanguinis profluvio imbecilliores non  
fiunt. Habent enim purgationem hanc non morbum. Ideoq;  
curati quidam cum sanguinis exitum non haberent: inclinata  
in præcordia ac uiscera materia subitis & grauissimis morbis  
correpti sunt. Sicui uero id nocet: is desidere in aqua ex uer  
benis debet. imponere. maxime malicorium cum aridis rosæ  
foliis contritum. aut ex his aliqua: quæ sanguinē supprimunt.  
Soler autem oriri inflammatio maxime ubi dura aluus eum  
locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum est: et id fouen



dum ouis . imponendi uitelli cum rosae foliis ex passo subae-  
tis . Idq; : si intus est : digito illinendum . si extra super illitum  
panniculum imponendum est . Ea quoq; medicamenta : quae re-  
centibus scissuris posita sunt : hic idonea sunt . Cibus uero in  
hoc casu iisdem quibus in prioribus utendum est . Si ista parū  
iuuant : solent imposita medicamenta adurentia ea capitula ab-  
sumere . Ac si iam uetustiora sunt : subaustore Dionysio inspa-  
rgenda sandaraca est . deinde imponendum : quod ex his con-  
stat . Squamae aeris : auripigmenti : singulorum . P . XV . saxi  
calcis . P . XVIII . postero die acu compungendum . Adustis  
capitulis fit cicatrix : quae sanguinem fundi prohibet : Sed qu-  
otiens is suppressus est : nequid periculi afferat multa exercita-  
tione digerenda materia est . Praeterea & uiris & foeminis  
quibus menstrua nō proueniunt : interdum ex brachio sanguis  
mittendus est .

Si anus uel os uuluae procidit qua curatione utendum sit :

**A** T si anus ipse uel os uuluae procidit . nam id quoq; inter-  
dum fit : considerari debet purum ne id sit : quod prouo-  
lutum est : an humore mucoso circumdatum . si purum est : in a-  
qua desidere homo debet : aut salsa : aut cum uerbenis uel mali-  
corio incocta . si humidum : uino austero subluendum est : illi-  
nendumq; fece uini combusta . Vbi utrolibet modo curatum  
est : intus reponendum est : imponendaq; plantago contrita :  
uel folia salicis in aceto cocta / tum linteolum / et super lana &  
que deliganda : cruribus inter se deuinctis .

De ulcere fungo simili in ano .

**F** Vngo quoq; simile ulcus in eadem sede nasci solet . Id si  
hyems est : egelida : si aliud tempus : frigida aqua fouen-  
dum est . deinde squama æris inspergenda : supraq; æratum ex  
myrteo factum . cui paulum squamæ : fuliginis : calcis sic adiec-  
tum . si in hac ratione non tollitur : uel medicamentis uehemen-  
tioribus : uel ferro adurendum est .

Dedigitorum ulceribus .

Caput . XIX



**D** igitorum autem uetera ulcera commodissime curantur a  
ut lycio aut myrra cocta : cum utriuslibet uinum adiectum  
est. In hisdem recedere abungue caruncula cum magno dolore  
consuevit. Prterygion graeci appellant. Oportet alumen meli  
num rotundum in aqua liquare : donec mellis crassitudinem ha  
beat. cum quantum eius aridi fuit : tantumdem mellis infunde  
re & radicula miscere : donec similis croco colore fiat : eoque illi  
nire . Quidam adeundem usum decoquere simul malunt cum  
paria pondera aluminis aridi & mellis miscuerint . Si hac rati  
one ea non exciderunt : excidenda sunt : deinde digiti fouen  
di aqua ex uerbis : imponendumq; super medicamentum ita  
factum . Chalcitis : malicorium : squama aeris excipiuntur fico  
pingui leniter cocto ex melle . Aut chartae combustae : auripig  
menti : sulphuris ignem non experti par modus caerato misce  
tur ex myrteo facto . Au : æruginis rasae . P. XI . squamae . P.  
XII . mellis cyatho coguntur . Aut pares portiones miscentur :  
Saxi calcis : chalcitidis : auripigmenti . Quicquid horum impo  
situm est : regendum linetolo aqua madefacto est : tertio die  
digitus resoluendus est . Siquid aridi est : iterum excidendum  
Similisq; adhibenda curatio est . Si non uincitur : purgandus  
scalpello : tenuibusq; ferramentis durendus ē , & sicut reliqua  
ultra curandus est . At ubi scabri ungues sunt : circum aperiri  
debent : qua corpus contingunt . tunc super eos ex hac compo  
sitione aequè imponi sandaracae : sulphuris : singulorum . P.  
XII . nitri / auripigmenti : singulorum . P. XIII . resinae liqui  
dae . P. XVIII . Tertioq; id die resoluendum est . Subquo me  
dicamento uitiosi ungues cadunt & in eorum locum meliores  
renascuntur .

FINIT LIBER SEXTVS.

. & . i .



CORNELII CELSI DE MEDICINA  
LIBER SEPTIMVS INCIPIT.

DE chirurgica et qui in ea clauerint : & qualis esse chirurgus  
debeat & quid hoc in libro describatur.

**T**ertiam esse medicinæ partem : quæ manu cu-  
ret : & uulgo notum : & a me propositum est.  
Ea non quidem medicamenta atq; uictus ratio-  
nem omittit : sed manu tamen plurimū præ-  
stat . estq; eius effectus inter omnes medicinæ  
partes euidentissimus . Siquidem in morbis  
cum mletum fortuna conferat : eademq; sæpe salutaria / sæpe  
uana sint : potest dubitari / secunda ualitudo medicinæ an cor-  
poris beneficio contigerit . In iis quoq; in quibus medicamen-  
tis maxime nitimur : quanuis profectus euidentior est : tamen  
sanitatem et per hæc frustra quæri et sine his reddi sæpe mani-  
festum est . Sicut in oculis quoque deprehendi potest : qui a  
mdicis diu uexati : sine his interdū sanescunt . Ac in ea parte :  
quæ manu curata euident est : omnem profectum : ut aliquid  
ab aliis adiuetur : hinc tamen plurimum trahere . Hæc autem  
ps cū sit uetustissima . magis tamen ab illo pente omnis medicine  
Hippocrate / quam a prioribus exculta est . Deinde posteaq; di-  
ducta ab aliis habere professores suos coepit : in ægypto quo-  
que increuit : Philoxemo maxime auctore : qui pluribus uolumi-  
nibus hanc partem diligentissime comprehendit . Gorgias  
quoque & Sostratus & Hieron & apollonii duo & Hammo-  
nius alexandrinus : multique alii celebres uiri / singuli quæ-  
dam repperierunt . Ac romæ quoque non mediocres professo-  
res : maximeque nuper Tryphon pater : & Euelpistus & ut ex  
scriptis eius intelligi potest horum eruditissimus Meges : qui  
busdam in melius mutatis : aliquantum ei disciplinæ adiecerunt



## SEPTIMVS.

Esse autem chirurgus debet adolescens: aut certe adolescentiae propior: manu sit renua stabili: nec unquam intremescente: ea quae non minus sinistra / quam dextra promptus: acie oculorum acri clara quae: animo intrepidus: imisericors: sic ut sanari uelit eum quem accipit: non ut clamore eius motus: uel magis quam res desiderat / properet: uel minus quam necesse est: secet: sed perinde faciat omnia ac si nullus ex uagibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri: quid huic parti proprie uendicandum sit. quia uulnere quoque ulcere quoque multorum curationes: quas alibi executus sum: chirurgi sibi uendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio. Atque ubi se diuiserunt: eum laudo: qui quod plurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui: in quibus uulnus facit medicus: non accipit: & in quibus uulneribus ulceribus ut plus perfici manus: quam medicamento credo. tum quicquid ad ossa pertinet: quae deinceps exequi aggrediar. dilatisque in aliud uolumen ossibus: in hoc caetera explicabo: praepositisque iis: quae in qualibet parte corporis fiunt: ad ea: quae proprias sedes habent: transibo.

## De luxatis

## CAPVT I

**L**uxata igitur in quacunque parte corporis sunt: quam primum sic curari debent: ut qua dolor est ea scalpello cutis crebro incidatur: detergeaturque eodem aduerso profluens sanguis. Quod si paulo tardius subuenitur: iamque etiam rubor est: qua rubet corpus: si tumor quoque accessit: quacunque is est: id opimum auxilium est. Tum super danda reprimentia sunt: maxime quae lana lucida ex aceto & oleo. Quod si leuior is casus est: possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est: cinis quoque maxime ex famentis. Si is non est: quilibet alius ex aceto uel etiam ex aqua coactus.

De iis quae per se intumescunt quomodo excidenda & curanda sunt.

## CAPVT II

. &amp; .ii



**V**erum hoc quidem p̄mptū est. Inius autē negociū maius ē:  
 quæ p̄ se uitio intus orto intumescunt: et ad suppurationem  
 spectant. Ea ōnia generi abscessuum esse alias proposui: me-  
 dicamenta que eis idonea executus sum. Nunc superest ut dicā  
 in iisdem quæ manu fieri debeant. Ergo priusquam indure-  
 rant: cutem incidere & cucurbitulam accommodare oportet.  
 quæ quicquid illuc malæ corruptæque materiæ coit: extrahat:  
 idq; iterum terioq; recte fit donec ōne indicium inflammati-  
 onis excidat. Neque tamen fas non est nihil cucurbitula age-  
 re. Interdum enim sed raro quicquid abscedit uelamento suo  
 includitur: id antiqui tunicam nominabant. Meges quia tuni-  
 ca omnis nervosa sit: dicit non nasci sub eo uitio nervum: quo  
 earo consumeretur: sed subito ita iam uetustiore pure callum  
 circumdari. Quod ad curationis rationē nullo loco pertinet:  
 quia quicquid dixi si tunica est: idem si callus est fieri debet.  
 Neq; ulla res prohibet etiam si callus est: tamen quia cingit:  
 tunicam nominari. Tum pure quoq; maturior hæc interdum  
 esse consuevit. Ideoq; quod sub ea est: extrahi per cucurbitu-  
 lam non potest. Sed facile id intelligitur ubi nihil admodū il-  
 la mutauit. Ergo siue id incidit siue iam durities est: in hac au-  
 xilii nihil est. Et ut alias scripsi uel auertenda concurrens eo  
 materia: uel digerenda: uel ad maturitatem perducenda est.  
 Si priora contigerunt: nihil præter ea necessarium est. Si pus  
 maturuit in alis quidem & in inguinibus raro secandum ē. Itē  
 ubicūq; mediocris abscessus est. Item quotiens in summa cute  
 uel etiam carne uitium est: nisi festinare curātis imbecillitas  
 cogit. Satisq; est cataplasmatibus efficere: ut p̄ se pus aperiat.  
 Nam fere sine cicatrice potest esse is locus: qui expertus fer-  
 rum non est. Si autem altius malum est: considerari debet ner-  
 uosus ne is locus sit: an non sit. Nam si sine neruis est: candem  
 ti ferramento apiri debet. Cuius hæc gratia est: quod exigua  
 plaga diutius ad pus ruo adū patet: paruaq; postea cicatrix fit.  
 At si nerui iuxta sunt: ignis alienum est: ne uel distendantur



137  
 .SEPTIMVS.

hi uel membrum debilitent. Necessaria uero opera scalpelli est. Sed cætera etiam sub cruda aperiri possunt. Inter neruos uero ultima expectanda maturitas est: quæ cutem extenuet: etq; pus iungat: quo propius reperiatur. Itemq; aliam rectam plagam desiderant in carne: quia fere uehementer cutem extenuat. tota ea super pus excidenda est. Semper autem ubi scalpellus admouetur id agendum est: ut & quam minimæ & quam paucissimæ plagæ sint. cum eo tamen ut necessitati succurramus & in modo & in numero. Nam maiores sinus latius: interdum etiam duabus aut plurius lineis incidendi sunt. Dandaque opera ut imus sinus exitum habeat: nequis humor intus subsidat: qui proxima & adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura: ut cutis latius excidenda sit. Nam ubi post longos morbos totus corporis habitus uitatus est: lateque se sinus diffudit & in eo pars cutis pallet: scire licet eam iam mortuam esse & inutilem futuram. Ideo que excidere commodius est: maxime si circa articulos maiores id euenit: cubantemque ægrum fluens a. uis exaruit: neque per alimenta quicquam corpori accedit. Sed excidi ita debet: ut plaga ad similitudinem myrtei folii fiat: quo facilius sanescat. Id que perpetuum est. Vbiunque medicus ex quacunque causa cutem excidit: pure effuso in alis uel inguinibus: linamento opus non est. Spongia ex uino imponenda est. In cæteris partibus si æque ea linamenta superuacua sunt: purgationis causa paulum mellis infundendum: dein glutinantia super danda. Si illa necessaria sunt: super ea quoque similiter dari spongia eodem modo ex uino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit. quando non sit: alias dictum est. Cætera eadem incisa suppuratione facienda sunt: quæ ubi per medicamenta rupta est: facienda esse proposui.

De bonis malis ue signis exulceratorum.

Caput. III.

& .iii.



**P**ropterea autem quantum curatio efficiat: quantumque aut sperari aut timeri debeat: ex quibusdam signis intelligi potest: fereque iisdem quae in uulneribus exposita sunt. Nam bona signa sunt: somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum non fastidire: si febricula fuit: ea uacare. Itemque habere pus album / leue / non foedi odoris. Mala sunt: uigilia: spiritus grauitas / sitis / cibi fastidium: febris: pus nigrum aut feculentum & foedi odoris. Item procedente curatione eruptio sanguinis: aut si antequam sinus carne impleatur orae carnosae fiunt. Illa quoque ipsa carne hebetere nec firma deficere tamen animam uel ipsa curatione uel postea / pessimum omnium est. Quinetiam morbus ipse siue subito solutus est: deinde suppuratio exorta est: siue effuso pure permanet: non iniuste terret. Estque inter causas timoris: si sensus in uulnere rodentium non est. Sed ut haec ipsa fortuna huc illuc ue discernit: sic medici partium est: eniti ad reperiendam sanitatem. Ergo quotiens ulcus res luerit: eluere id / si reprimendus humor uidebitur / uino ex aqua pluuiatili mixto: uel aqua in qua lenticula cocta sit: debebit. Si purgandum erit: mulso, rursusque imponere eadem. Vbi iam repressus uidebitur humor uetusque parum erit produci carnem conueniet & foueri uulnus pari portione uini ac mellis: superque imponi spongia ex uino & rosa tincta. Per quae cum caro producat: plus tamen: ut alias quoque diximus ratio eo confert. id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita: balneum rarum / quotidiana / sed lenis gestatio cibi portionesque corpori reficiendo. Aptaeque omnia per medicamenta quoque / suppuratione rupta sequuntur: sed quia magno malo uix sine ferro mederi licet: in hunc locum reseruata sunt.

Defistulis.

Caput III.

**A**dversus fistulas quoque si altius penetrant: ut ad ultimas demitti collirium non possit: si tortuosae sunt: si multiplices: maius in manu quam in medicamentis praesidium est.



## SEPTIMVS.

minusq; operæ est: si sic sub cute transuerse feruntur: quam si recte intus cedunt. Igitur si sub cute transuersa fistula est: de mitti specillum debet: supraque id ea incidi: si flexus reperiuntur: hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemque faciendum: si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ nentum est: excidendum ex toto callus est: superq; fibulae dandæ: & medicamentum quo glutinetur. At si recta subter tendit: ubi quo maxime ferat specillo exploratum est: excidi is sinus debet: dein fibula oris cutis iniicienda est: & æque glutinantia medicamenta super danda sunt. Aut si corruptius ulcus: quod interdum osse uitiato fit: ubi id quoque curatum est: pus mouentia. solent autem inter costas fistulæ subter exire. quod ubi incidit: eo loco costa ab utraque parte decidenda & eximenda est: nequid intus corruptum relinquatur. solent ubi costas transierunt: septum id quod transuersum a superioribus uisceribus intestina discernit: uiolare. Quod intelligi & ex loco & ex magnitudine doloris potest: ex quia non nunquam spiritus eo: cum humore quasi bullante prorumpit: maximeq; si hunc ore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est. In cæteris uero quæ circa costas sanabilia sunt: pinguius medicamenta inimica sunt. cæteris quæ ad uulnera accommodantur: uti licet. Optime tamen sicca linamenta: uel si purgandum aliquid uidetur: in melle tincta imponuntur. Ventri nullum os subest: sed ibi perniciosæ admodum fistulae fiunt: ad eo ut Solstratus insanabiles esse crediderit. Id non extoto ita se habere usus ostendit. Et quidem: quod maxime mirum uideri potest: tutior fistula est contra iecur & lienem & uentriculū quam contra intestina: non quo perniciosior res ibi sit: sed quo alteri periculo locum faciat. Cuius experimento moti quidam auctores: parum modum rei cognouerunt. Nam uenter sæpe etiam telo perforatur: prolapsaq; intestina conduntur: & oras uulneris futuræ comprehendunt. quod quemadmodum fiat mox indicabo. Itaq; etiam ubi tenuis fistula abdomen perumpit: excidere eam licet: suturæq; oras coniungere. Si uero



ea fistula intus patuit: excisa necesse est latius foramen relin-  
quatur: quod nisi magna vi utique ab interiore parte sui non potest  
qua quasi membrana quædam finit abdomen: quam peritone-  
on graeci vocant. Ergo ubi aliquis ingredi ac moveri coepit.  
rumpitur illa futura atque intestina solvuntur. Quo fit ut pere-  
undum homini sit. Sed non omnimodo res ea desperationem  
habet. Ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

## De ani fistulis.

**P**ropriam etiamnum animadversionem desiderant ea  
quæ in ano sunt. In has demisso specillo ad ultimum ei-  
us caput incidi cutis debet. dein nouo foramine specillum edu-  
ci lino sequente: quod in aliam eius partem ob id ipsum perfo-  
ratum coniectum sit. Ibi linum prehendum: quincindumque  
cum altero capite est: ut laxè cutem: quæ superfistulam est: te-  
neat. Idque linum esse debet crudum & duplex triplexue: sic co-  
rectum ut unitas facta sit. Iterum autem licet negotia agere: am-  
bulare: lauare: cibum capere perinde atque sanissimo. Tantum  
modo id linum bis die saluo nodo ducendum est: sic ut sube-  
at fistulam pars quæ superior fuerit. Neque committendum est  
ut id linum putrescat. Sed tertio quoque die nodus resolu-  
endus est: & ad caput alterum recens linum alligandum est: edu-  
ctoque uetere: id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic  
enim id paulatim cutem: quæ suprafistulam est: incidit: simulque & id  
sanescit quod a lino relictum est: et id quod ab eo mordetur:  
inciditur. Hæc ratio curationis longa: sed sine dolore est.  
Qui festinat: astringere cutem lino debet: quo celerius secet:  
nocturnoque penicillo tenuia quædam intus demittere: ut cutis hoc  
ipso extenuetur: quo extenditur. Sed hæc dolorem mouent.  
Adiicitur celeritati sic ut tormento quoque: si & linum et id quod  
ex penicillo est: aliquo medicamento illinitur exiis quibus  
callum exedi posui. Poterit tamen fieri ut ad scalpelli cura



## SEPTIMVS.

tionem etiā illo loci ueniendum sit: si intus fistula fert: si multiplex est. Igitur in hęc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est: ut media inter eas habenula tenuis admodum eiiciatur: ne protinus ora coeant: sitq; locus aliquis linamentis: quæ quam paucissima super iniicienda sunt: omniaque eodem modo facienda: qui in abscessibus positus est. Si uero ab uno ore plures sinus erunt: recta fistula scalpello erit incidenda: ab eo cæteræ quæ iam patebunt lino excipiendæ. si intus aliqua procedet: quo ferrum tuto peruenire non poterit: collirium demittendum erit. Cibus autem in omnibus eiusmodi casibus: siue manu: siue medicamentis agatur: dari debet humidus: potio liberalis: diuq; aqua ubi iam caro increscit. tum de mum & balneis raris utendum erit: et cibus corpus implentibus

De telis e corpore extrahendis.

Caput. V.

**T**ela quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt: magno negotio saepe eiiciuntur. Sunt q; quaedam difficultates ex generibus eorum: quædā ex iis sedibus in quas illa penetrarūt. Omne autem telum extrahitur: aut ab ea parte qua uenit: aut ab ea in qua retendit. Illic uiam qua redeat / ipsum sibi fecit. Hic a scalpello accipit. Nā cōtra muerōem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit: et in summa carne est: aut certe magnas uenas & loca neruosa non transit: nihil melius est / quam qua uenit id euellere. Si uero plus est per quod telo reuertendum: quam quod pertrahendum est: iamq; uenas neruosq; id transit: commodius est aperire quod superest: eaq; extrahere. Nam & propius petitur & tutius euellitur: et in maiore membro si medium mucro transit: facilius sanescit quod peruium est: quia utrinque medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendum est: amplianda scalpello plaga est: quo facilius id sequatur: quoque minor oriatur inflammatio: quæ maior fit: si ab illo ipso telo dum redit corpus laniatur. Item si ex alia



parte uulnus aperitur: laxius esse debet: quam ut telo postea  
 transeunte ampliatur. Summa autem utraque parte ita habenda  
 cura est: ne neruus: ne uena maior: ne arteria incidatur: Quo-  
 rum ubi aliquid detectum est: excipiendum hamo retuso est:  
 abducendumque scalpello. Vbi autem satis incisum est: telum ex-  
 imendum est: tum quoque eodem modo & eadem cura habita: ne  
 sub eo quod eximeretur: aliquid eorum laedatur: quae tuenda es-  
 se proposui. Hæc communia sunt. Propria quædam in singulis  
 telorum generibus subiicienda sunt. quæ protinus subiiciam. Ni-  
 hil tam facile in corpore quam sagitta conditur: eademque altis-  
 sime insedit. Hæc autem eueniunt & quia magna ui fertur illa:  
 et quia ipsa in angusto est. Sepius itaque ab altera parte quam  
 ex qua uenit recipienda est: præcipueque quia fere spiculis cin-  
 gitur: quæ magis laniant si retro quam si contra trahuntur. Sed  
 inde aperta uia caro diduci debet ferramento ad similitudi-  
 nem facto græcæ litteræ ψ. Deinde ubi apparuit: si mucro:  
 si harundo in haeret: propellenda est: donec ab altera parte ap-  
 prehendi & extrahi possit. Si iam illa decidit: solumque intus  
 ferrum est: mucro uel digitis apprehendi uel forfice: atque ita  
 educi debet. Neque alia ratio extrahendi est: ubi ab ea parte  
 qua uenit: euelli magis placuit. Nam ampliato uulnere aut ha-  
 rundo / si inest: euellenda est: aut si ea non est: ferrum ipsum.  
 Quod si spicula apparuerunt: eaque breuia & tenuia sunt: for-  
 fice ibi comminui debent: uacuumque ab his telum educi: si ea  
 maiora ualentioraque sunt: fixis scriptoriis calamis contegen-  
 da: ac nequid lacerent: sic euellenda sunt. Et in sagittis quidē  
 hæc observatio est. Latum uero telum si conditum est: ab al-  
 tera parte educi non expedit: ne ingenti uulnere ipsi quoque inge-  
 ns uulnus adiciamus. Euellendum est ergo genere quodam fe-  
 rramenti: quod diocri græci belulcum uocant: quoniam aucto-  
 rem Dioclen habet. quem inter priscos maximosque medicos  
 fuisse iam posui. Lamina uel ferrea uel abenea etiam ab  
 altero capite duos utrinque deorsum conuersos uncus habet:  
 ab altero duplicata alteribus: leuiterque extrema in eam partem



140  
SEPTIMVS.

inclinata: quæ sinuata est. insuper ibi etiam parte inclinata: quæ perforata est. Hæc iuxta telum transuersa demittitur. De inde ubi adimum mucronem uentum est: paulum torquetur: ut telum foramine suo excipiat. Cum incauo mucro est: illico duo digiti subiecti partis alterius/uncis simul & ferramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est: quod interdum euelli debet: plumbea glans: aut lapis: aut simile aliquid: quod perrupta cute integrum intus insedit. In omnibus his latius uulnus aperiendum: id quæ quod inest/ea qua uenit forfice extrahendum est. Accedit uero aliquid difficultatis sub omni ictu si telum uel ossi inhaesit: uel in articulo se inter duo ossa demersit. inosse usque eo mouendum est donec is locus laxetur qui mucronem momordit: et tum uel manu uel forfice telum extrahendum est. quæ ratio induribus quoque euiciendis est: Et uix unquam ita telum non sequitur. Sed simorabitur excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Vltimum est ubi non euellitur: terebra iuxta forare: ab eo quoque foramine ad speciem litteræ  $\psi$  contra telum os excidere: sic ut lineæ quæ diducuntur adtelum spectent. eo facto id necesse est labet & facile auferatur. Inter duo uero ossa si per ipsum articulum pruperit: circa uulnus duomenbra fasciis habendis ue deliganda: & per has in diuersas partes diducendæ sunt ut neruos distendant. Quibus extentis laxius inter ossa spatium est: ut sine difficultate telum recipiatur. Illud uidendum est: sicut in aliis locis posui: nequis neruus aut uena aut arteria a telo lædatur: dum id extra itur: eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si ueneno to quoque telo quis ictus est: hisdem omnibus si fieri potest etiam festinantius actis adiicienda curatio est quæ uel epoto ueneno uel a serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est: quam quæ esset si corpore icto nihil inhaesisset. De qua satis alio loco dictum est.

De gangiliis & meliceride & heromate & scæthomate  
Capitis tuberculis  
Caput. VI.



**H**aec uel ire in qualibet parte corporis possunt. Reliqua certas sedes habet. de quibus dicam / orsus a capite. In hoc multa uariaque tubercula oriuntur. gangilia: meliceridas: et heromata nominant: aliisque etiam nunc uocabulis quaedam alii discernunt: quibus ego steathomata quoque adiciam. Quae quauis & in ceruice & in alis & in lateribus oriri solent: perse tamen non posui: cum omnia ista mediocres differentias habeant: ac neque periculo terreant: neque diuerso genere curentur. Omnia autem ista et ex paruulo incipiunt. et diu paulatimque increscunt. et tunica sua includuntur. Qaedam ex his dura ac renitentia: quaedam mollia cedentiaque sunt: quaedam spatio nudantur: quaedam testa capillo suo permanent: fereque sine dolore sunt. Quid intus habeant ut coniectura praesagiri potest: sic ex toto cognosci nisi cum eiecta sunt: non potest. Maxime tamen in his quae renitentur: aut lapillis quaedam similia: aut concreti confectique pili reperiuntur. In his uero quae cedunt: aut melli simile aliquid: aut tenui puliculae: aut quasi rase cartilagini: aut carni heberi et cruentae. quibus aliqui colores esse consueverunt. fereque gangilia renitentur. At heromati subest quasi tenuis pulicula. Meliceridi liquidior humor: ideoque pressum circumfluit. Steathomati pingue quiddam: idque latissime patre consuevit: resoluitque totam cutem superpositam: sic / ut ea labet / cum inceteris sit astrictior. Omnia derasa ante si capillis conteguntur per medium oportet incidere: sed steathomatis tunica quoque secanda est: ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile a cute subiecta carne ea separaretur. In ceteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba & intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda a cute & carne est: eiciendaque cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicae musculus inhaesit: ne is laedatur: superior pars illius decidenda: alia ibidem relinquenda est. Vbi tota exempta est: committendae orae: fibulaque his iniicienda: et super medicamentum glutinans dandum est. Vbi uel tota tunica: uel aliquid ex ea relictum est: pus mo



uentia adhibenda sunt.

De oculorum uitiiis quae scalpello & manu curantur

Caput. VII

**S**ed ut haec neq; genere uitii / neque ratione curationis inter se multum distant: sic in oculis quae manum postulant & ipsa diuersa sunt: & aliter aliterq; curantur. Igitur in superioribus palpebris uesicae nasci solent pingues grauesq; quae uix attollere oculos sinunt: leues q; pituitae cursus / sed assiduos in oculis mouent. Fere uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo atq; ita cute intenta scalpello transversam lineam incidere suspensa leuiter manu ne uesica ipsa uulneretur: & ut locus ei patefactus est ipsa prorumpat. tum digitis eam apprehendere oportet & euellere. Facile autem sequitur. Dein super ungui collirio debet exiis aliquo / quo lippientes oculi super inunguntur. paucissimisq; diebus cicatrice inducitur. Molestius est ubi incisa uesica est. Effundit enim humorem. neque postea quia tenuis admodum est: potest colligi. Si forte id incidit: eorum aliquid imponendum est: quae puri mouendo sunt.

De criche tuberculo palpebrarum

**I**n eadem palpebra super pilorum locum tuberculum paruum nascitur: quod a similitudine ordeï agraeicis criche nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit comprehensum est. Id uel calido pane: uel caera subinde calefacta foueri oportet: sic ne nimius is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione saepe discutitur. interdum concoquitur. Si pus se ostendit: scalpello diuidi debet: et quicquid intus humoris est: exprimi. Eodem deinde uapore postea quoque foueri & super iungi: donec ad sanitatem pueniat.

De chalazia palpebrarum.

**C**halazia quoque quaedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur: sed neq; itaque figurae eiusdem & mobilia simul atq; digito huc uel illuc impelluntur. Ideoque ea chalazia uocant. haec incidi debet si sub cute sunt: ab exteriori parte. si sub cartilagine



ab interiore. Dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac si intus plaga est: inungendum primo lenibus: deinde acrioribus. Si extra: super dādū ē plastrū quo id glutinetur. De ungue oculorū: quod pterigio agræcis uocatur.

**V** Nguis uero: quod pterigion græci uocant: est membrana la nervosa oriens ab angulo: quæ non nunq̃ ad pupillam quoq̃ peruenit: eiq̃ officit. Sæpius anarium: interdum etiam a temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis: quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueterauit: iamq̃ ei crassitudo quoq̃ accessit: excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei: uel aduersus insedili contra medicum is homo collocandus est: uel sic aduersus/ ut ingremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo uitium est: aduersum. Si in dextro: resupinum collocari uolunt. Alteram autem palpebram a sinistro diduci oportet: alteram a medico. Sed ab hoc: si ille aduersus est. inferioriorem, si supinus. superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recuruato subiicere extremo ungui debet: eumq̃ infigere: atque eam quoq̃ palpebram tradere alteri. ipse hamulo apprehenso levare unguem: eumq̃ acu traicere linum trahente. deinde acum ponere: lini duo capita apprehendere/ & per ea erecto ungue si qua parte oculo inhaeret manubriolo scalpelli diducere: donec ad angulum ueniat. Deinde inuicem modo remittere: modo attrahere: ut sic & initium eius & finis anguli reperiat. Duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur: quod exulceratum uix ullam recipiat curationem: uel ex angulo quoq̃ caruncula abscidatur: quæ si uehementius unguis ducitur: sequitur. Ideoq̃ decipit: ac si abscissa est: patescit foramen: per quod postea sæpe humor descendit: rhypada græci uocant. Verus ergo angui finis nesciendus ē. qui ubi satis constitit: non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est: deinde excidenda ea membrana. nequid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum super claudendum est: supra que linteolum &



142  
& aut spongia aut lana succida proximisque diebus diducendus quotidie oculus est: ne cicatrice inrer se palpebrae glutinentur. Siquidem id quoque tertium periculum accedit: eodem modo linamentum imponendum: ac nouissime inungendum collirio: quo ulcera ad cicatricem perducuntur: Sed ea curatio uere esse debet: aut certe ante hyemem. De qua re ad plura loca pertinente semel dixisse satis erit. Nam duo generum curationum sunt. Alia in quibus eligere tempus non licet: sed utendum est eo quod incidit: sicut in uulneribus & infistulis. Alia in quibus nullus dies urget: & expectare tutissimum & facile est: sicut euenit in iis quae & tarde increscunt & dolore non cruciant: in his uer expectandum est. Aut siquid magis pressit: melior tamen autumnus uel aestas: quam hyems est. Atque is ipse medijs iam fractis aestatibus: non dum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit quae tractabitur: hoc quoque maiori periculo subiecta est. et saepe quo maior plaga facienda: eo magis haec temporis ratio seruabitur.

De enchanti tuberculo.

**E**X curatione uero unguis ut dixi uitia nascuntur: quae ipsa alijs quoque de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo / parum ungue exciso uel aliter / tuberculum: quod palpebras parum diduci patitur. enchantis graece nominatur. Excidi hamulo & circuncidi debet: hic quoque diligenter temperata manu / ne quod ex ipso abscidat. Tum exiguum linamentum respergendum est uel cadmia uel atramento sutorio / inque angulum ductis palpebris inferendum: supraque eodem modo deligandum. proximisque diebus similiter nutriendum: tantum ut primis aqua egeliga uel etiam frigida foueatur.

De ancyloblepharo oculorum uitio.

**I**nterdum inter se palpebrae coalescunt: aperiri que non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere: ut palpebrae cum albo oculi cohaerescant. scilicet cum in utroque fuit ulcus negligenter curatum. Sanescendo



enim quod diduci potuit & debuit: glutinabit. ancyloblepharos sub utroque uicio graeci uocant. Palpebrae tantum inter se cohaerentes non difficulter diducuntur: sed interdum frustra nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet: quia bene res saepius cedit. Igitur aduersum specillū inserendum: diducendaque eo palpebrae sunt: deinde exigua penicilla interponenda donec exulceratio eius loci finiatur. At ubi albo ipsius oculi palpebra inhaesit: Heracides tarentinus auctor est: aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione: ut neque ex oculo neque ex palpebra quicquam abscidatur. ac si necesse est ex palpebra potius. Post haec inungatur oculus medicamentis quibus asperitudo curatur: quotidieq; palpebra uertatur non solum ut ulceri medicamentum inducatur: sed etiam ne rursus inhaereat: ipsique etiam praecipiantur: ut saepe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoque multa tentasse: neque unquam profuisse: quia semper iterum oculo palpebra inhaeserit memoriae prodit.

**E** De aegylopa fistula oculoq; *De aegylopa*  
 Etiam num in angulo qui naribus propior est ex aliquo uitio quasi parua fistula aperitur: per quam pituita assidue destillat. aegylopa graeci uocant. idque assidue male habet oculum. non nunquam etiam exeso osse usque adnates penetrat idque interdum naturam carcinomatis habet. Vbi intentae uenae & recuratae sunt: color pallet: cutis dura est & leui tactu irritatur: inflammationemque in eas partes: quae coniunctae sunt: euocat. Ex his eos qui quasi carcinoma habent curare: periculosum est. Nam mortem quoque ea res maturat. Eos uero quibus ad nates tendit: superuacuum. Neque enim sanescunt. At quibus id in angulo est: potest adhiberi curatio cum eam non ignotum sit esse difficilem. quantoque angulo propius id foramen ē: tāto difficilior ē. quoniam per angustū ē in quouersari manus possit. Recenti tamen re mederi facilius est. Sed hamulo summū eius foraminis excipiedū deinde totū id caui: sicut



in fistulis dixi: usque ad os excidendum: oculoque et ceteris iunctis partibus bene obiectis osfermento adurendum est uehementius. Quod si iam carie uexatum est: quo crassior his squama accedat: quidam adurentia imponunt: ut atramentum sutorium uel chalcitidem uel æruginem rasam. Quod & tar dius & non idem facit. Osse adusto curatio sequitur eadem: quæ in ceteris uestis.

**P**ili uero qui in palpebris sunt duabus decausis oculum irritare consueverunt. Nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur & procidit: quo fit ut eius pili ad ipsum oculum conuertantur: quia non simul cartilago quoque se remittit. Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit: qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes hæ sunt. Si pili nati sunt qui non debuerunt: tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata in ignem coicienda est. Deinde candens sublata palpebra sic ut eius peritiosi pili inconspicuum curantibus ueniant: subipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est: ut ea tertiam partem palpebræ transueat. Deinde iterum tertioque usque ad alterum angulum. Quo fit ut omnes pilorum radices adustæ emoriantur. Tum super imponendum medicamentum est: quod inflammationem prohibeat. atque ubi crustæ exciderunt: ad cicatricem perducendum. facillime autem id genus sanescit. quidam aiunt acu transui iuxta pilos in exteriorem partem palpebræ oportere: eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem: atque ubi acus transiit in ipsius capilli finem qua duplicatur pilum esse coiciendum & per eum in superiorem palpebræ partem attrahendū: ibique corpori agglutinandum & imponendum medicamentum quo foramen quoque glutinetur. sic enim fore ut is pilus in exteriorem partem postea spectet. Id primum fieri non potest nisi in pilo longiore: cum fere breues eo loco nascantur. Deinde si plures pili sunt: necesse est longum tormentum cum totiens acus transuet magnam inflammationem moueat. Nouissime cum humor aliquis ibi subsit: oculo & ante per pilos & tum per palpebras



foramina affecto : uix fieri potest ut gluten quo uinctus est pilus non resoluator. Eoq; fit ut is eo unde ui abductus est: redeat. Ea uero curatio : quæ palpebre laxioris ab omnibus frequentatur: nihil habet dubii. Siquidem oportet confecto oculo mediam palpebre cutem : siue ea superior: siue inferior ē: apprehendere digitis ac leuare . tum considerare quantulo detracto futurum sit: ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoq; duo pericula circumsunt. Si nimium fuerit excisum . ne contegi oculus non possit. Si parū: ne nihil actum sit : & frustra sectus aliquis sit. Quadeinde incidendum uidebitur: per duas lineas atramento notandum est: sic ut de interiore quæ pilos continet & propiore ei linea aliquid relinquatur: quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est. et si superior palpebra est: ante . si inferior: postea propius ipsis pilis incidendum. initiumq; faciendum in sinistro oculo : ab eo angulo qui tempori indextro: ab eo qui naribus propior est: idq; quod inter duas lineas est excidendum. Deinde oræ uulneris inter se simplici sutura committendæ: operiendusq; oculus est: et si parum palpebra descendet: laxanda utiq; . si nimium: aut astringenda: aut etiam rursus tenuis habenula ab alteriore ora excidenda. Vbi secta est: aliæ suturæ adiciendæ: quæ supra tres esse non debent. Praeter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est: ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idq; si leuis inclinatio est: etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo nō eget. His factis spongia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum iniiciendum. Quarto futura tollenda est: et collirio quod inflammationes reprimat super inungendum.

Deglaucophthalmia oculorum

**N**on nunq̃ autem nimium sub hac curatione excisa cute euenit ut oculus non contegatur. Idq; interdum etiam alia de causa fit glaucophthalmos græci appellant. In quo si



144  
SEPTIMVS.

nimum palpebræ deest: nulla id restituere curatio potest. Si exiguum mederi licet: paulum infra supercilium cutis inciden- da est: lunata figura cornibus eius deorsum spectantibus. Al- titudo esse plagæ usq; ad cartilaginem debet: ipsa illa nihil læsa. Nam si ea incisa est: palpebra concidit: neq; attolli pos- tea potest. Cute igitur tantum diducta fit: ut paulum inima o- culi ora descendat: hiantes scilicet super plagam: inquam li- namentum coiciendum est: quod & coniungi diductam cutem- prohibeat: & in medio carunculam citet. quæ ubi eum locum implevit: postea recte oculus operitur.

De ectropio

**V** T superioris autem palpebræ vitium est: quod parum des- cendit: ideoq; oculum non contegit: sic inferioris: quod parum sursum attollitur: sed pendet & hiat neq; potest cum su- periore committi. Atq; id quoq; enenit interdum ex simili vi- tio curationis: interdum etiam senectute. ectropion graeci vo- cant. Si ex mala curatiõe est: eadem ratio medicinae est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas non adocu- lum conuertenda sunt. Si ex senectute est: tenui ferramentoid- totum extrinsecus adurendum est: deinde melle inunguendum at quarto die uapore aquæ calidæ fouendum: inunguendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De Staphylomate oculi.

**H** Acc fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere con- suerunt. In ipso autem oculo non nunquam summa attol- litur tunica: siue ruptis intus membranis aliquibus siue laxatis & similis figura acino fit. Vnde id staphyloma graeci uocant. Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium trans- uere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte: alterius ex interiore astringere inter se. quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad



lenticulae magnitudinem excidere. deinde spodium aut cadmi-  
am inficere. Vtrobet autem facto album oui lana excipien-  
dum & imponendum / posteaque uapore aquae calidae fouendus  
oculus & lenibus medicamentis unguendus est.

De clauis oculorum.

**C**laui autem uocantur callosa in albo oculi tubercula: qui-  
bus nomen a figura similitudine est. Hos ad imam radicem  
perforare acu commodissimum est: infraque eam excidere: dein  
de lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum & de eorum suffusione.

**S**uffusionis iam alias: feci mentionem: quia cum recens  
incidit medicamentis quoque saepe discutitur. Sed ubi ue-  
tustior facta est: manus curationem desiderat / quae inter sub-  
tilissimas haberi potest. De qua ante quod dico: paucis ipsius o-  
culi natura indicanda est. Cuius cognitio cum ad plura loca  
pertineat: tum uel praecipue ad hunc pertinet. Is igitur sum-  
mas habet duas tunicas: ex quibus superior a graecis ceratoi-  
des uocatur. Ea qua parte alba est satis crassa pupillae loco ex-  
tenuatur. Huic inferior adiuncta est media parte: qua pupilla  
est / modico foramine concava: circa tenuis: ulterioribus par-  
tibus ipsa quoque plenior. quae choroides a graecis nominatur.  
Hae duae tunicae cum interiora oculi cingant: rursus sub his  
coeunt: extenuataeque et in unum coactae per foramen quod in-  
ter ossa est: ad membranam cerebri perueniunt / eoque inhae-  
rescunt. Sub his autem qua parte pupilla est: locus uacuus est.  
Deinde infra rursus tenuissima tunica. quam herophilus arae-  
noides nominauit. Ea media subdit: eoque cauo continet qui-  
dam quod a uetri similitudine hyaloides graeci uocant. Idne-  
que liquidum / neque aridum est: sed quasi concretus humor: ex  
cuius colore pupillae color uel niger est / uel exsiccus: cum summa  
tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte  
membranula includit. sub his gutta humoris est oui albo simi-  
lis: aqua uidendi facultas proficiscitur. cristalloides a graecis



145  
SEPTIMVS.

nominatur. Igitur uel ex morbo uel ex ictu concrefcit humor sub duabus tunicis: qua locum uicium eſſe prop. ſui iſque paulatim indureſcens interiori potentiae ſe opponit. Vtutque eius plures ſpecies ſunt. quedam ſanabiles. quaedam quae curationem non admittunt. Nam ſi exigua ſuffuſio eſt: ſi immobilis: colorem uero habet marinae aquae uel ferri nitentis: et alacritate ſenſum aliquem fulgoris relinquit. ſpes ſuper eſt. Si magna eſt: ſi nigra pars oculi amiſſa naturali figura in aliam uertit: ſi ſuffuſioni color caeruleus eſt: aut auro ſimilis: ſi labat & hac atq; illac mouetur: uix unquam ſuccurritur. Fere uero peior eſt: quo ex grauiore morbo. maioribusue capitis doloribus: uel ictu uehementiore orta eſt. Neq; idonea curatio: ſi ſenilis aetas eſt: quae ſine nouo uicio tamen aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem: ſed inter haec media aetas. Oculus quoq; curationi neq; exiguus: neq; concavus ſatis opportunus eſt. atque ipſius ſuffuſionis quaedam maturitas eſt. Expectandum igitur eſt donec iam non fluere: ſed durities quaedam concreuiſſe uideatur. Ante curationem autem modico cibo uti: bibere a quam triduo debet: pridie ab omnibus abſtinere. Poſt haec in aduerſo ſedili collocandus eſt loco lucido: lumine aduerſo: ſic ut contra medicus paulo altius ſedeat. A poſteriore autem parte caput eius: qui curabitur: miniſter contineat: et immobile id praeter. Nam leui motu eripi acies in perpetuum poteſt. Quin etiam ipſe oculus qui curabitur: immobilior faciendus eſt: ſuper alterum lana impoſita & deligata. Curari uero ſiniſter oculus dextra manu: dexter ſiniſtra debet. Tum acus ad mouenda eſt: aut acuta: aut forte non nimium tenuis: eaq; demittenda. Sed recta eſt per ſummas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi & angulum tempori propiore e regione media ſuffuſionis: ſic nequa uena ledatur. Neque tamen timide demittenda eſt: quia inani loco excipitur. Ad quem cum uentum eſt: re mediocriter quidem peritus falli poteſt: quia prementi nihil renititur. Vbi eo uentum eſt: inclinanda acus ad ipſam ſuffuſionem eſt. leuiterq; ibi uerti & paulatim eam de



## SEPTIMVS

ducere infra regionem pupillæ debet. Vbi deinde eam transie uehementius imp: imi: ut inferiori pri insidat. Si hæsit: curatio expleta est. Si subinde redit: eadem acu magis concidenda: & in plures partes dissipanda est, quæ singulæ & facilius conduntur & minus late efficiunt. Post hæc educenda acus recta est: imponendumque est lana molli exceptum oui album: & supra quod inflammationem coerceat: atque ita deuinciendum. Post hæc opus est quiete: abstinentia: lenium medicamentorum inunctionibus: cibo: qui postero die satis mature datur: primum liquido / ne maxillæ laborent: deinde inflammatione finita tali / qualis in uulneribus propositus est. Quibus. ut a qua quoque diutius bibatur: necessario accedit.

### De pituita oculorum

**D**E pituitæ quoque tenuis cursu: qui oculos infestat: quatenus medicamentis agendum est: iam explicui. Nunc ad ea ueniam: quæ curationem ex manu postulant. Animaduertimus autem quibusdam nunquam siccescere oculos: sed semper humore tenui madere: quæ res asperitudinem continuat: ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines excitat: totam denique uitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adiuuari potest: in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est: nosse oportet: ut alteri succurratur: alteri manus non iniiciatur. Ac primum superuacua curatio est iniis: qui ab infantibus id uitium habent: quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non necessario etiam in iis: quibus non multa: sed acris pituita est. Siquidem manu nihil adiuuantur. medicamentis & uictus ratione: quæ crassiorem pituitam reddit: ad sanitatem perueniunt. Lata etiam capita uix medicinae patent. Tum interest uenae pituitam emittant: quæ inter caluariam & cutem sunt: an quæ inter membranam cerebri & caluariam. Superiores fere per tempora oculos rigant. inferiores per eas membranas: quæ ab oculis ad cerebrum tendunt.



SEPTIMVS.

Potest autem adhiberi remedium iis / quae supra os fluunt: nō potest iis / quae sub osse. Ac ne iis quidem succurritur: quibus pituita utrinq; descendit: quia leuata a tera parte nihilominus altera infestat. Quid sit autem hac ratione cognoscitur. Ratio capite ea medicamenta: quibus inlippitudine pituita suspenditur: a superciliis usq; aduerticem illini debent. Si sicci oculi esse coeperunt: apparet per eas uenas: quae sub cute sunt / irrigari. Si nihilominus madent: manifestum est sub osse descendere. Si est humor: sed leuior: duplex uitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur: quos superiores uenae exerceant ideoq; pluribus etiam opitulari licet. Idq; non ingræcia tantummodo: sed in aliis quoq; gentibus celebre est: adeo ut nulla medicinæ pars magis per nationes quoq; exposita sit. Reperi ingræcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent: duabus in occipitis rectis: una super eas transversa: dein duabus super aures: una inter eas item transversa: tribus inter uerticem & frontem rectis. Reperi sunt qui a capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cognitisq; ex motu maxillarum musculorum initiis / leuiter super eos cutem inciderent: indutisq; per retusos hamos oris insererent linamenta: ut neq; inter se cutis antiqui fines committerentur & in medio caro incretaceret: quæ uenas ex quibus humor ad oculos transiret: astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt a media aure ad mediam alteram aurem: deinde a naribus ad uerticem. Tum ubi lineæ committuntur / scalpello inciderunt / & post sanguine fusso os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & interporibus & inter frōtem atq; caluariam eminentibus uenis idem candens ferrum admouerunt. Frequens curatio est uenas interporibus aducere: quæ fere quidem in eiusmodi malo tumunt. sed tamen ut inflentur: magisq; se ostendant: ceruix ante modice deliganda est: tenuibusq; ferramentis & retusis uenæ aduendæ: donec in oculis pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum est quasi exsecutorum iterum per quæ humor ferebatur. Valentior tamen medicina est: ubi tenues conditæq; uenæ



ideoque legi non possunt. Eodem modo ceruice deligata: retentorque ab ipso spiritu quo magis uenae prodeant: atramento notare eas contra tempora & inter uerticem ac frontem. deinde ceruice resoluta qua notae sunt uenas incidere & sanguinem mittere. Vbi satis fluxit: tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem / timide: ne subiecti muscoli qui maxillas tenent sentiant. inter frontem uero & uerticem / uehementer: ut sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiam nunc est a frontum curatio: qui uerticem usque ad os adurunt: sic ut squamam remittat. Sed nihil melius est quam quod in gallia quoque comata sit. ubi uenas intemporebus & in superiore capitis parte legunt. Adusta quomodo curanda sint iam explicui. Nunc illud adiicio: neque ut crustae decidant. neque ut ulcus impleatur adustis uenis esse properandum. ne uel sanguis erumpat: uel cito pus supprimatur: cum per hoc siccescere eas partes opus sit: per illud exhauriri opus non sit. Si quando tamen sanguis eruperit: infricanda medicamenta esse: quae sic sanguinem supprimant: ne adurant. Quemadmodum autem uenae deligendae sint: quidque lectis his faciendum sit cum uenero ad exurum uarices dicam.

De aurium morbis: qui manu et / scalpello curantur.

Caput. VIII

**V**erum ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt. sic in auribus admodum pauca sunt: quae in hac medicina parte tractentur. Solet tamen euenire uel a primo natali die protinus: uel postea facta exulceratione. deinde per cicatricem aure repleta: ut foramen in ea nullum sit: ideoque audiendi usu careat. Quod ubi incidit: specillo tentandum est: alte ne id replectum: an in summo tantum glutinatum sit. Nam si alte est: prementi non cedit. Si in summo / specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet: ne sine effectus spe distantio oriatur neruorum: et ex ea mortis periculum sit. Hoc facile curatur. Nam qua cauum esse debet: uel medicamentum a



liquod imponendum est exaurentibus uel candente ferro aperiendum. uel etiam scalpello incidendum. Cumq; id patefactum. & iam ulcus purum est: coicienda eo pinna est illita medicamento cicatricem inducente: circaq; idem medicamentum dandum: ut cutis circa pinnam sanescat. quo fit ut ea remota postea facultas audiendi sit. At ubi aures, inuiro puta: perforatae sunt & offendunt: traicere id cauum celeriter candente acu satis est: ut leniter eius ora exulcerentur: aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget: tum quod eum locum repleat. et sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est: sicut solet esse in iis: qui maiora pondera auribus gesserunt: incidere quod superest ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare: & postea suere: ac medicamentum: quo id glutinetur: imponere. tertium est: siquid ibi curti est: sarcire. quae res cum in labris quoq; & naribus fieri possit: eandem etiam rationem habeat: simul explicanda est.

Curta in auribus labrisq; ac naribus quomodo sarciri & curari possint.

Caput. IX

**C**urta igitur in his tribus: ac si quapua paria sunt: curari possunt. Siqua maiora sunt aut non recipiunt curationem: aut ita per hanc ipsam deformantur: ut minus indecora ante fuerint. Atq; in aue quidem & naribus deformitas sola timeri potest. In labris uero si nimium contracta sunt: usus quoque necessarii iactura fit: quia minus facile & cibis assumitur & sermo explicatur. Neq; enim creatur ibi corpus: sed ex uicino adducitur. quod inleui mutatione & nihil eripere & fallere oculum potest. in magna non potest. Neq; senile autem corpus: neque quod mali habitus est: neque in quo difficulter ulcera sanescunt: huic medicinae idoneum est. quia nusquam celerius cancer occupat: aut difficiliter tollitur. Ratio curationis eiusmodi est. Id quod curatum est in quadratum redigere: ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere: quae citiorē praeabulteriore extoto diducant: deinde ea quae sic resoluiamus in

.bb.i.

unū adducere.



Si non satis iunguntur: ultra lineas quas ante fecimus / alias duas lunatas & ad plagam conuersas immittere: quibus summa tantum cutis diducatur. sic enim fit ut facilius quod adducitur sequi possit. quod non ui cogendum est: sed ita adducendum: ut ex facili subsequatur: et dimissum non multum rece-dat. Interdum autem ab altera parte cutis haud omnino adducta: deformem quem reliquit locum: reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda: altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus: neque ex medio naso imis uenarum partibus: neque ex angulis labrorum quicquā attrahere tentabimus. Vtrinque autem petemus: siquid summis auribus: siquid imis: siquid aut medio naso: aut medijs naribus. aut medijs labris deest. Quae tamen interdum etiam duobus locis curata esse consue-runt. Sed eadem ratio curandi est: si cartilago in eo quod inci-sum est eminet: excidenda est. Neque enim aut glutinatur. aut a acu tuto traiecitur. Neque longe tamen excidi debet: ne inter duas oras liberae cutis / utrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctae orae inter se suendae sunt utrinque cute apprehensa: & quae priores lineae sunt: ea quoque suturae iniiciendae sunt. Siccis locis / ut in naribus / illita spuma argenti satis proficit. In ulterio-res uero lunatasque plagas linamentum dandum est: ut caro in-crescens / uulnus impleat. Summaque cura quod ita sutum est: tu-endum esse: apparere ex eo potest: quod decanero supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit uapore aquae cali-dae. rursusque idem medicamentum iniiciendum: fereque septi-mo die glutinatum est. Tum suturae eximi: & ulcus ad sanita-tem perducere debent.

De polypi curatione per ferrum.

Caput. X.

**P**olypum uero: qui in naribus nascitur: praecipue ferro cura-ri iam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acu-to in modum spathae facto resolvere abesse oportet adhibita diligentia ne infra cartilago laedatur: iqua difficilis curatio ē



Vbi abscissus est: unco ferramento extrahendus est. Tum in-  
plicitum linamentum: uel aliquid ex penicillo respergendū est  
medicamento: quo sanguis supprimitur: eoque nares leniter  
implendæ. Sanguine suppresso: linamento uulnus purgandum  
est. Vbi purum est. eo pinna eodem modo quo in aure suprapo-  
situm est: medicamento illita: quo cicatrix inducitur: incus de-  
mittenda: donec ex toto id sanescat.

De ozena.

Caput. XI

**I**D autem uirium: quod ozena agræcis uocatur: si medica-  
mentis non cederet: quemadmodum manu curandū esset  
apud magnos chirurgos non repperi. Credo quia res raro ad  
sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormen-  
tum habeat. Apud quosdam tamen positum est uel sutilem fili-  
culam: uel enodem scriptorium calamum innarem esse coicien-  
dum donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramen-  
tum candens dandum esse ad ipsum os. deinde adustum locum  
purgandum esse æruginē & melle. Vbi purus est: lycio ad sa-  
nitatem perducendum. Vel nares incidendam esse ab una par-  
te ad os: ut & conspici locus possit & facilius candens ferra-  
mentum admoueri. Tum sui nares debere. & adustum quidē  
ulcus eadem ratione curari. Suturam uero illini uel spuma ar-  
genti uel alio glutinante.

De ori & uitiis quæ manu & ferro curantur. Caput. XII.

De dentibus.

**I**N ore quoque quædam manu curantur. Vbi in primis de-  
ntes non nunquam mouentur: modo propter radicū im-  
becillitatem: modo propter gingiuarum arescentium uicium.  
Oporteret in utrolibet candens ferramentum gingiuis admouere  
ut leuiter attingat: non ut insidat. Adustæ gingiuae melle illi-  
nendæ & mulso eluendæ sunt. Ut pura ulcera esse coeperint  
arida medicamēta infricāda sunt ex iisq; reprimūt. Si uero dēs  
dolores mouet. eximiq; eū: quia medicamenta nihil adiuuāt: placu-  
it: circumradi debet. ut gignua ab eo resoluatur. Tum is concuti-  
endus est.

.bb. iiii



Eaꝓ facienda donec bene moueatur. Nam dens hærens cum  
 summo periculo euellitur: ac nonnunquam maxilla loco moue-  
 tur. Idꝓ etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit:   
 quia potest tempora oculosꝓ concutere. Tum si fieri potest  
 manu: si minus, forfice dens excipiendus. Ac si exesus est: an-  
 te id foramen uel linamento/uel bene accommodato plumbo  
 replendum est: ne sub forfice confringatur. recta uero forfex  
 ducenda est: ne inflexis radicibus/os earum: cui dens inhæret  
 parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum eius rei periculum  
 est: utique in dentibus breuibus qui fere longiores radices ha-  
 bent. Sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non pos-  
 sit: aut frustra comprehendat: os gingiuarꝓ prehendit & fran-  
 git. Protinus autem ubi plus sanguinis profluit: scire licet ali-  
 quid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est res-  
 ta quæ recessit & uulsella protrahenda est. Si non sequitur in-  
 cidi gingiua debet: donec labans ossis resta recipiatur. Quod  
 si factum statim non est: indurescit extrinsecus maxilla / ut  
 is hiare non possit. Sed imponendum calidum ex farina & fi-  
 co cataplasma est donec ibi pus moueatur. Tum incidi gingi-  
 ua debet. Pus quoꝓ multum profluens ossis fracti nota est.  
 Itaqꝓ etiam tum id extrahi conuenit. Non nunquam etiam eo  
 lasso fistula fit: quæ eradi debet. Dens autem scaber qua parte  
 niger est: radendus est: illinendusꝓ rosæ flore contrito: cui  
 gallæ quarta pars & altera myrræ sit adiecta. Continendum  
 que ore crebro uinum meracum. Atque in eo casu uelandum ca-  
 put: ambulatione multa: frictione capitis: cibo non acri uten-  
 dum est. At si exitu uel alio casu aliqui labant dentes: auro  
 cum iis qui bene hærent uinciendi sunt. Continendaꝓ ore repri-  
 mentia: ut uinum in quo malicorium decoctum aut in quo gal-  
 la candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens  
 nascitur quam prior excidat: is qui cadere debuit circum pur-  
 gandus & euellendus est. is qui natus est in locum prioris quo-  
 tidie digito adurgendus donec adiustam magnitudinẽ pueniat  
 Quoriscunꝓ dente exempto radix relicta ẽ: protinus ea quoꝓ  
 adid facta forfice: quam rizan græci uocant: eximenda est.



## SEPTIMVS

Tonsillas autem quæ post inflammationes induruerunt: antidyades autem agræcis appellantur: cum sub leui tunica sint: oportet digito circumradere & euellere. si ne sic quidem resoluuntur: hamulo excipere: & scalpello excidere: cum ulcus aceto eluere: & illinire uulnus medicamento: quo sanguis suppressimatur.

## De uua.

**V**ua si cum inflammatione descendit: doloriq; est & sub rubicundi coloris: præcidi sine periculo non potest. Solite enim multum sanguinem effundere. Itaq; melius est iis uti: quæ alias proposita sunt. Si uero inflammatio quidem nulla est. nihilominus autem ea ultra iustum modum apicuita deducta est: & est tenuis: acuta, alba: præcidi debet. Itemque si imma, liuida & crassa: summa, tenuis est. Neq; quicquam commodius est q̃ uulsella prebendere: sub eaq; quod uolumus excidere. Neq; enim ullum periculum est: ne plus minusue præcideretur: cum liceat tantum infra uulsellam relinquere: quantum inutile esse manifestum est. idq; præcidere quo longior uua est q̃ esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt: quæ in tonsillis proxime posui.

## De lingua.

**L**ingua uero quibusdam cum subiecta parte a primo natali die iuncta est: qui ob id ne loqui quidem possunt: horum extrema lingua uulsella prehendenda est: sub eaq; membrana incidenda: magna cura habita: ne uenæ quæ iuxta sunt: uiolenter: & profusione sanguinis noceant. Reliqua curatio uulne oris in prioribus posita est. Et pleriq; quidem ubi confluuerunt inloquuntur. Ego autem cognoui qui succisa lingua cum abunde superdentes eam præmeret: non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina etiam ubi perpetuum est quod fieri debet: non tamen perpetuum est id quod sequi conuenit.

## De abscessu sub lingua.

**S**ub lingua quoq; interdum aliquid abicedit: quod fere consistit in tunica: doloresq; magnos mouet. quod si exiguum ē



incidi semel satis est. si maius: summa cutis usque ad tunicam excidenda est. deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ: & tunica undique circumdata liberanda est. magna diligentia per omnem curationem habita: nequa maior uena incidatur.

De labris.

**L**abra autem sæpe finduntur: eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam: quod sermo prohibetur. qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has si in summo sunt medicamentis curare commodius est. quæ ad ulcera oris fiunt. Si uero altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere: quod spathe simile quasi transcurrere non imprimi debet. Postea facienda eadem sunt quæ in auribus adultis exposita sunt.

De ceruicis uitii & curatione.

Caput. XIII.

**A**t in ceruice inter cutem & asperam arteriam tumor increscit. brochocelen græci uocant. quo modo caro hebes: modo humor aliquis melli aquæ uel similis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili inmixti. Ex quibus quicquid est quod tunica continetur: potest adurentibus medicamentis curari quibus summa cutis cum superiecta tunica exeritur. Quo facto siue humor est: profluit. siue quid densius: digitis educitur. tum ulcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur usque ad tunicam. Deinde uitiosus sinus ab integro corpore digito separatur: totusque cum uelamento suo eximitur. Tum aceto: cui uel salem uel nitrum aliquis adiecit: eluitur. oræ puna sutura iunguntur cæteraque eadem quæ in aliis futuris super iniiciuntur. Leniter deinde ne fauces urgeat: deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit: intus inspergenda: adurentia: linamentis quæ id curandum est cæteris pus mouentibus

De umbilici uitii.

Caput. XIII.



150  
SEPTIMVS.

**S**unt etiam circa umbilicum plura vitia. de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. Verisimile est autem id a quoque prætermisum quod ipse non cognouerat: a nullo id quod non uiderat, fictum. Commune omnibus est umbilicum indecore prominere. Causae requiruntur. Meges tres has posuit. Modo intestinum eo irrumperet. modo omentum. modo tumorem. Sostratus nihil de omento dixit. Duo bus hisdem adiecit: carnem ibi interdum increfcere: eamque modo integram esse: modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. Sed eadem tria causatus spiritum quoque interdum eo dixit irrumperet. Heron omnibus his quattuor positus & omenti mentionem habuit & eius quod simul & omentum & intestinum habuerit. Quid autem horum sit: his inditiis cognoscitur. Vbi intestinum prolapsu est: tumor neque durus neque mollis est. omni frigore comminuitur: non solum sub omni calore: sed etiam retento spiritu crescit. Sonat interdum: atque ubi resupinatus est aliquis de lapso intestino ipse desidit. Vbi uero omentum est: caetera similia sunt. tumor mollior & ab ima parte latus: extenuatus in uerticem est. si quis apprehendit: elabatur. Vbi utrumque est: inditia quoque mixta sunt: & inter utrumque mollicies. At caro durior est: semper que etiam resupinato corpore tumet: præmentique non cedit: prioribus facile cedentibus. Si uitiosa est easdem notas habet: quas in carcinomate exposui. Humor autem si premitur. circumfluit. At spiritus pressus cedit: sed protinus redit: resupinato quoque corpore: tumorem in eadem figura tenet. Ex his id quod ex spiritu uitium est: medicinam non admittit. Caro quoque carcinomati similis cum periculo tractatur. Itaque omittenda est. Sana excidi debet. idque uulnus linamentis curari. Humorem quidam uel inciso summo tumore effundunt: et uulnus hisdem linamentis curant. In reliquis uariæ sententiæ sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur: ut in utero: siue intestinum: siue omentum est: delabatur. Sinus uero umbilici tum uacuis a quibusdam du



bus regulis exceptus est: uehementerq; earum capitibus deligatis ibi emoritur. A quibusdam ad imum acu traiecitatur duo linea ducente. deinde utriusq; lini duobus capitibus diuersæ partes astringuntur. Quod in uua quoq; oculi fit. Nam sic id quod supra uinculum est: moritur. Adiecerunt quidam ut ante q̄ uincerent: summum una linea inciderent: exciderentq; quo facilius digito demisso quod illuc irrupisset: depellerent. tum deinde uinxerunt. Sed abunde est: iubere spiritum continere: ut tumor quantus maximus esse potest / se ostendat. tum imā basim eius atramento notare: resupinatoq; homine: <sup>B</sup> digitis tumorem eum premere: ut siquid delapsum non est / manu cogatur. Post hæc umbilicum attrahere: & qua nota atramenti est lino uehementer astringere. Deinde partem superiorem aut medicamentis aut ferro adurere donec emoriatur. Atq; ut cætera uista ulcus nurrere. Idq; non solum ubi intestinum uel omentum uel utrunq; est: sed etiam ubi humor est: optime proficit. Sed æte quædam uisæda sunt: nequod ex uinculo periculum sit. Nam curationi neq; infans: neq; aut robustus annis / aut senex aptus est: sed a septimo fere a<sup>n</sup>no ad quartumdecimū Deinde ei corpus idoneum est id / quod integrum est. Atquod mali habitus est: quodq; papulas: impetigines: similiaq; habet idoneum non est. Leuib; quoq; tumoribus facile subuenitur. At ineorum qui nimis magni sunt curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale & hibernum uitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet. Neque id satis est. Sed alius quoque ei ducenda est: quo facilius omnia quæ excesserūt: intra aluum confidant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur

Caput XV.

**A** Quam iis qui hydropici sunt emitti oportere alias dixi. Nunc quemadmodum id fiat dicendum est. Quidam autem qui subumbilico fere qua tuor interpositis digitis asin-



stra parte. Quidam ipso umbilico perforato facere consue-  
runt. Quidam cute primum adusta: deinde interiore abdomi-  
ne inciso. quia quod per ignem diuisum est / minus celeriter  
coit. Ferramentum autem demittitur: magna cura habita ne  
qua uena incidatur. Id tale esse debet: ut fere tertiam digiti  
partem latitudo mucronis impleat. Demittendumq; ita est.  
ut membranam quoq; transeat. qua caro ab interiore parte fi-  
nitur. eo tum plumbea aut aenea fistula coicienda est: uel recu-  
ruatis inexteriorem partem labris: uel in media circum surgen-  
te: quadam mora / ne tota intus delabi possit. huius ea pars quae  
ae intra paulo longior esse debet q̄ quae extra: ut ultra ulcerio-  
rem membranam procedat: per hanc effundendus humor est.  
Atque ubi maior pars eius euocata est: cludenda demisso lin-  
teolo fistula est. & inuulnere / si id uisum non est: relinquen-  
da. Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emit-  
tendum: donec nullum aquae uestigium appareat. Quidam ta-  
men etiam non uisita cute protinus fistulam recipiunt & super  
uulnus spongiam expressam deligant. Deinde postero die ru-  
rus fistulam demittunt quod recens uulnus paulum diductum  
paritur: ut siquid humoris superest. emittatur. Idque bis ita  
fecisse contenti sunt:

De intestinorum uulneratorum curationibus.

Caput. XVI

**N**on nunquam autem uenter ictu aliquo perforatur: sequi-  
turque ut intestina euoluantur. Quod ubi incidit: proti-  
nus considerandum est: an integra ea sint: deinde an iis color  
suis maneat. Si tenuius intestinum perforatum est: nihil pro-  
fici posse iam retuli. Latius intestinum sui potest: non quod  
certa fiducia sit: sed quod dubia spes: certa desperatione sit  
potior. Interdum enim glutinatur. Tum si utrunlibet intesti-  
num liuidum aut pallidum aut nigrum est. quibus illud quoq;  
necessario accedit: ut sensu careat: medicina omnis inanis est.  
Si uero adhuc ea sui coloris sunt: cum magna festinatione suc-



currendum est. Memento enim alienantur externo & insueto  
 spiritu circundata. Resupinandus autem homo est coxis erec-  
 toribus. Et si angustius uulnus est: q̄ ut intestina commodè  
 refundantur: incidendum est donec satis pateat. Ac si iam sic-  
 ciora intestina sunt: perluenda aqua sunt: cui paulum admo-  
 dum olei sit adiectum. Tum minister oras uulneris leuiter di-  
 ducere manibus suis uel etiam duobus hamis membranae inte-  
 riori iniectis debet. medicus priora semper intestina quae po-  
 steriora prolapsa sunt: condere. Sic ut orbium singulorum lo-  
 cum seruet. Repositis omnibus: leuiter homo concutiendus ē.  
 Quo fit ut per se singula intestina in suas sedes diducantur  
 et inibi confidant. His conditis omentum quoq̄ considerandū  
 est. ex quo siquid iam nigri & emortui est: forfice excidi de-  
 bet. Siquid integrum est leuiter super intestina diduci. Sutura  
 autem neque summae cutis: neque interioris membranae per se  
 satis proficit: sed utriusque. Et quidem duobus laniis uincien-  
 da est spissior quam alibi. quia & rumpi facilius motu uentris  
 potest: et nō aequè magnis inflammationibus pars ea exposita  
 est. Igitur induabus acus fila coicienda eaque duabus manibus  
 tenenda: & prius interiori membranae sutura iniicienda est:  
 sic ut sinistra manus inexteriore ora: dextra in sinistiore  
 a principio uulneris orsa / ab interiori parte in exteriorem / acū  
 immittat. Quo fit ut ab intestinis ea pars semper acuum lon-  
 ge sit: quae retusa est. semel utraque parte traiecta permutan-  
 dæ acus inter manus sunt: ut ea sit in dextra quæ fuit in sinistra  
 ea ueniat in sinistram / quam dextra continuit. Iterumq̄ eodem  
 modo per oras immittendæ sunt. Atq̄ ita tertio et quarto: de  
 inceptisq̄ permutatis inter manus acubus includenda plaga. Po-  
 st hæc eadem fila eademq̄ acus ad cutem transferendæ. Si-  
 miliq̄ ratione ei quoq̄ parti utraq̄ sutura iniicienda: semper  
 ab interiori parte acubus uenientibus: semper inter manus traie-  
 ctis. Dein glutinantia iniicienda. Quibus aut spongiam aut  
 fucidam lanam ex aceto impressam accedere debere manifestū  
 est / quam ut semper dicendum sit. Impositis his leuiter deli-



gari uenter debet.

De interiore parte abdominis rupta: & qua ratione curanda sit. Caput. XVII

**I**nterdum tamen uel exitu aliquo: uel retento diutius spiritu: uel sub graui fasce interior abdominis membrana / superiore cute integra rumpitur. Quod foeminis quoque ex utero saepe euenire consuevit: fitque praecipue circa lia. sequitur autem cum superior caro mollis sit: ut non satis intestina contineat: hisque intenta cutis / indecora intumescat. Atque id quoque aliter ab aliis curatur. Quidam enim per acum duobus lineis ad imam basin immissis / sic utrinque deuinciunt: quemadmodum & in umbilico et in uena positum est: ut quicquid super uinculum est: emoriatur. quidam medium tumorem excidunt ad similitudinem myrtacei folii. quod semper eodem modo seruandum esse iam posui: & tum oras futura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore: experiri manu qua parte is tumor maxime cedat. quia necesse est ea parte rupta membrana sit: qua que integra est / ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur. immittendae scalpello duae lineae sunt. ut exciso medio interior membrana utrinque recentem plagam habeat. quia quod uetus est: sutura non coit loco patefacto. Si qua parte membrana non nouam plagam / sed ueterem habet: tenuis excidenda habena est: quae tantum ora eius exulceret. Caetera: quae ad suturae reliquam curationem pertinent: supra comprehensa sunt.

De uaricibus uentris.

**P**raeter haec euenit: ut in quorundam uentribus uarices sint. quarum quia nulla alia curatio est. quam quae in crucibus esse consuevit. tamen eam partem explanaturus / hanc quoque eo differo.



De testicularum natura &amp; morbis eorum.

.Caput. XVIII.

**V**enio autem ad ea . quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent . quæ quo facilius explicem : prius ipsius loci natura paucis proponenda est . Igitur testiculi simile quiddam medullis habent . Nam sanguinem non emittunt & omni sensu carent . Dolent autem in ictibus & inflammationsibus quibus hi continentur . Dependunt uero ab inguinibus per singulos neruos . quos cremasteras græci nominant cum quorum utroque binæ descendunt & uenæ & arteriæ . Hæ autem tunica conteguntur tenui : nervosa : sine sanguine alba : quæ ægytroides a græcis nominatur . Super eam ualentior tunica est quæ interiori uehementer ima parte inhæret . dæmon græci uocant : Multæ deinde membranulae uenas & arterias eosque neruos comprehendunt . Atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus laeues / paruulæque sunt . Hæ tamen propria utriusque testiculo & uelamenta & auxilia sunt . Communis deinde utriusque omnibusque interioribus sinus est : qui iam conspicitur a nobis . osccheon græci : scrotum nostri uocant . isque ab ima parte mediis tunicis leuiter innexus est : a superiore tantum circumdatus est . Sub hoc igitur plura uicia esse consueverunt . Quæmodo ruptis tunicis : quas ab inguinibus incipere proposui : modo his integris fiunt . siquidem interdum uel ex morbo primum inflammatur . deinde postea pondere abruptitur . uel exitu aliquo protinus rumpitur tunica : quæ diducere ab inferioribus partibus intestina debuit . tum pondere eo deuoluitur aut omentum aut etiam intestinum . Atque ibi reperta uia / paulatim aut ab inguinibusque inferiores quoque partes missum sub inde nervosas tunicas : et ob id eius rei patientes diducit . entero coelen & epiplocoelen græci uocant : apud nos indecorum : sed commune his hirnæ nomen est . Deinde si descendit omentum : nunquam in scroto tumor tollitur : siue inedia fuit : siue corpus huc illuc re conuersum : aut aliquo modo collocatum . Itemque si retentus est spiritus / non magno opere increscit . tætu uero inequalis est



& mollis & lubricus. At si intestinum quoque descendit: humor is sine inflammatione modo minuitur: modo increfcit. estque fere sine dolore. & cum conquiescit aliquis aut iacet: interdum extoto desidit: interdum sic liuiditur: ut in scroto exiguae reliquiae maneant. At si clamore & satietate & si sub aliquo pondere is homo nixus est: crescit: frigore omni contrahitur: calore diffunditur. Estque tum scrotum & rotundum & taetu laeue. idque quod subest / lubricum est: si pressum est / ad inguen reuertitur. dimissumque iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur. Et id quidem in leuioribus malis euenit. Non nunquam autem stercore accepto uastius tumet: retroque compelli non potest: affertque tum dolorem & scroto & inguinibus & abdomini. non nuq̃ stomachus quoque affectus / primum ruffam bilem per os reddit: deinde uiridem: quibusdam etiam nigram. Integris uero membranis interdum eam partem humor dstringit. Atque eius quoque species duae sunt. Nam uel inter tunicas is increfcit: uel in membranis quae ibi circa uenas & arterias sunt: ubi hae grauitate occaluerunt. Ac ne ei quidem humori: qui inter tunicas est: una sedes est. Nam modo inter summam & mediam: modo inter mediam & imam consistit: Graeci communi nomine quicquid est hydrocoelen. appellant. nostri: ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis: haec quoque subeodem nomine / quo priora habent. Signa autem quaedam communia sunt: quaedam propria. Communia quibus humor deprehenditur. Propria: quibus locis humorem subesse dicimus. Si tumor est nuq̃ extoto se remittens: sed interdum leuior / aut propter famem / aut propter febriculam maximeque in pueris: isque mollis est / si non nimis humor subest. At si is uehementer increuit: renititur sic ut uter repletus & arte astrictus. Venae quoque in scroto inflantur: & si digito pressimus: cedit humor: circumfususque id quod non premitur / attollit & tanquam in uitro cornu ue per scrotum apparet. isque quantum in ipso est: sine dolore est. Sedes autem eius sic deprehenditur. si inter summam mediamque tunicam est:



cum digitis duobus pressimus: paulatim humor inter eos reuer-  
rens subit. Scrotum ipsius albidius est. Si ducitur: aut nihil a-  
ut parvulum intenditur. testiculus ea parte neq. visu neq. tactu  
sentitur. At si sub media tunica est: intumescit scrotum magis  
se attollit: adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat.  
Præter hæc æque integris tunicis ramex innascitur: cyrtocoe-  
len græci appellant. Venæ intumescunt. hæ quoq. intortæ con-  
glomeratæq. ad superiorem partem: uel ipsum scrotum implēt  
uel mediam tunicam uel imam. Interdum etiam sub ima tuni-  
ca circa ipsum testiculū neruumq. eius increscunt. Ex his ea  
quæ in ipso scroto sunt: oculis parent. hæ uero quæ mediæ imæ  
ue tunicæ insident: ut magis conditæ: non æque quidem cernun-  
tur: sed tamen etiam uisui subiectæ sunt: præterquam quod &  
tumoris aliquid est pro uenarum magnitudine & modo & id  
prementi magis renititur: ac per ipsos uenarum toros inæqua-  
le est: & qua parte id est: testiculus magis iusto dependet. Cū  
uero etiam super ipsum testiculū neruumq. eius id malum in-  
creuit: aliquanto longius testiculus ipse descendit: minorq. al-  
tero fit: ut pote alimento amisso. Raro sed aliquando caro  
quoq. inter tunicas increscit. sarcocoelelen græci uocant. Inter-  
dum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus: ac febres  
quoq. affert: & nisi celeriter ea inflammatio cōquieuit: dolor  
ad inguina atq. ilia peruenit. partesque hæ intumescunt. ner-  
uus ex quo testiculus dependet: plenior fit: & multo indurescit  
super hæc: inguen quoque non nunquam uarices implent. bu-  
bonocoelelen appellant.

De testiculorum curationibus communibus & primo de inci-  
sione & curatione inguinis uel scroti. Caput. XIX.

**H**is cognitis decuratione dicendum est: in qua quaedam co-  
munia omnium sunt: quaedam propria singulorum. Pri-  
us de communibus dicam. Loquar autem nunc de his quæ scal-  
pellum desiderant. Nam quæ uel sanari non possint: uel ali-  
ter nutrirī debeant: dicendum erit simul ad species singulas ue-  
nero. Incidunt autem interdum inguen: interdum scrotum,



Intraque curatione homo ante triduum bibere aquam: pridie  
abstinere etiam acibo debet. ipso autem die collocari supinus  
deinde si inguen incidendum est, idque iam pube contegitur:  
ante radendum est: et tum extento scroto: ut cutis inguinis in  
tenta sit: id incidendum subimo uentre: qua cum abdomine tu  
nicae inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter  
est donec summa tunica / quae ipsius scroti est incidatur / per  
ueniaturque adeam / qua media est plaga facta. Foramen deor  
sum uersus subest. In id demittendus est sinistrae manus digi  
tus index / ut diductis interuenientibus membranulis simul sa  
xet. Minister autem sinistra manu comprehenso scroto sursum  
uersus eum debet extendere. & quam maxime ab inguinibus  
abducere: primum cum ipso testiculo: dum medicus omnes mem  
branulas quae super mediam tunicam sunt / si digito de ducere  
non potest: scalpello abscidat: Deinde sine eo ut is delapsus  
ipsi plagae iungatur: digitoque inde promatur / et super uen  
trem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua uitiosa sunt  
circuncidenda sunt. In quibus cum muleae uenae discurrant: te  
nuiores quidem praecidi protinus possunt. Maiores uero ante  
longiore lino deligandae sunt: ne periculose sanguinem fun  
dant. Sin media tunica uexata erit: aut sub ea malum increue  
rit: excidenda erit sic / ut alte ad ipsum inguen praecidatur. In  
fra tamen non tota demenda est. Nam quod ad basim testicu  
li uehementer cum ima tunica connexum est: excidi sine sum  
mo periculo non potest. Itaque ibi relinquendum est. Idem in  
ima quoque tunica / si laesa est: faciendum est. Sed non a summa  
inguinis plaga: uerum infra paulum ea abscidenda: ne laesa ab  
dominis membrana inflammationes moueat. Neque tamen ni  
mium ex ea sursum relinquendum est: ne postea sinuetur & se  
dem eidem malo praestet. Purgatus ita testiculus per ipsam  
plagā cū uenis & arteriis & neruo suo leuiter demittendus ē uidē  
dū & nē sanguis ī scrotū descendat: ne uē concretus aliquo loco  
maneat.



Quae ita fient: si uenis uinciendo medicus prospexerit: Lina quibus capita earum continebuntur: extra plagam dependere debebunt. quae pure orto sine ullo dolore excident. Ipsi autē plagae iniiciendae duae fibulae sunt: & insuper medicamentū quo glutinentur. Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi: ut cicatrix maior & latior fiat. Quod ubi incidit: linamenta super non sulcienda: sed leuiter tantūponenda sunt: supraque ea quae inflammationem repellant: id est ex aceto uel lana sucida uel spongia. Caetera eadem quae ubi pus moueri debet: adhibenda sunt. At cum infra incidi oportet: resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est deinde id uehementer apprehendendum et incidendum. Si paruum est quod nocet: modice: ut tertia pars integra ad sustinendum testiculum infra relinquatur. Si maius est: etiam amplius: ut paulum tantummodo ad imum: cui testiculus insidere possit: integrum maneat. Sed primo resuscalpellusquam leuissima manu teneri debet: donec scrotum ipsum diducat. Tum inclinandus mucro est: ut transuersa membrana secet: quae inter summam mediamque tunicam sunt. At si uicium in proximo est. mediā tunicam attingi non oportet. Si sub illa quoque conditur: etiam illa incidenda est: sic: ut tertia quoque: si illa uicium regit. Vbiunque repertum malum est: ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicū digito: manubriolo: uel scalpello diductam inferiorem partē tunica extra collocare. deinde eam ferramentoquo ad similitudinem curuum uocant: incidere: sic ut intrare duo digiti. index & medius possint. His deinde coniectis excipienda reliqua pars tunicae: & inter digitos scalpellus immittendus est. eximendumque aut effundendum quicquid est noxium. quancunque autē tunicam quis uiolauit: illam quoque debet excidere. ac mediam quidem. ut supra dixi: quam altissime abinguine imam autem paulo infra. Caeterum ante quā excidantur hae quoque uinciri lino sume debet. & eius lini capita extra plagā relinquenda sunt:



sicut in aliis quorū uenis: quae id requisierint: Eo facto testicu-  
lus intus reponendus est: oraeque scroto futuris inter se commit-  
tendae: neque paucis/ ne parum glutinentur & longior fiat cura-  
tio: neque multis/ ne inflammationem augeant. Atque hic quo-  
que uidendum est: nequid in scroto sanguinis maneat. Tum  
imponenda glutinacea sunt. Si quando autē scroto sanguis  
defluxit: aliquidue concretum ex eo decedit: incidi subter id  
debet: purgatoque eo spongia acri aceto madens circumdari.  
Deligatur autem uulnus omne: quod ex his causis factum est.  
Si dolor nullus est: quinque primis diebus non est resolu-  
dum: sed his die tantum aceto irroranda lana uel spongia. Si  
dolor est: tertia die resoluendum: & ubi fibulae sunt/ hae inci-  
dendae: ubi linamentum/ id immutandum est: rosaque & uino  
madefaciendum id/ quod imponitur. Si inflammatio incre-  
uit: addiendum prioribus cataplasma ex lenticula & melle:  
uel ex malicorio: quod in aule: ro uino coctum sit/ uel ex his  
mixtis. Si sub his inflammatio non coquirit post diem qui-  
tum multa calida aqua uulnus fouendum: donec scroto ipsū  
& extenuetur et rugosius fiat. Tum imponendum cataplasma  
ex triticea farina: cui resina pinea adiecta sit. Quae ipsa si ro-  
bustus curatur: ex aceto. si tener: ex melle coquenda sunt. Ne-  
que dubium est quodcunque initium fuit. si magna inflamma-  
tio est: quin ea/ quae pus mouent/ imponenda sint. Quod si  
pus in ipso scroto ortum est: paulum id incidi debet: ut exitus  
detur. Linamentumque eatenus imponendum est: ut foramen  
tegat. Inflammatione finita: propter neruos priore cataplas-  
mate: dein caerato utendum est. Haec proprie ad eiusmodi uul-  
nera pertinent. Caetera & incuratione & in uictu similia his es-  
se debent: quae in alio quoque uulnerum genere praecepimus.  
De intestini curatione. Caput. XX.

**H**is propositis ad singulas species ueniendum est: ac sicui  
paruulo puero intestinum descendit: ante scalpellum ex-  
perienda iunctura est. Fascia eius rei causa fit: cui imo  
.cc.iii.



loco pila affuta est ex panniculis facta: quæ ad repellendum  
 intestinū ipsi illi subiicitur: deinde reliqua fasciæ pars arcte  
 circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum: &  
 inter se tunicæ glutinantur. Rursus si ætas processit: multum  
 q̃ intestini descendisse extumore magno patet: adiciunturq;  
 dolor & uomitus quæ exstercore & ex cruditate eo delapso fe  
 re accidunt: scalpellum adhiberi sine perniciē non posse mani  
 festum est. Leuandum tantummodo malum & per alias curati  
 ones extrahendum est. Sanguis mitti ex brachio debet. dein  
 de si uires patiuntur imperanda tridui abstinētia est. si mi  
 nus certe pro ui corporis q̃ longissima. Eodem uero tempore  
 super habendum cataplasma ex lini semine: quod ante aliq̃s  
 ex mulso decoxerit. Post hæc & farina hordeacea cum resina  
 iniicienda: et is demittendus in solum aquæ calidæ: cui oleum  
 quoq; adiectum sit: dandumq; aliquid cibi lenis calidi. Qui  
 dam etiam aluum ducunt. Id deducere aliquid in scrotum po  
 test: educere ex eo non potest. Per ea uero quæ supra scripta  
 sunt: leuato malo si quando alias dolor reuēterit. eadem erūt  
 facienda. Sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa sunt:  
 secari super uacuum est. non quo non excludi a scroto possint  
 nisi tamen id inflammatio prohibuit. sed quo repulsa inguini  
 bus inmorentur: ibiq; tumorem excitent. atq; ita fiat mali non  
 finis sed mutatio. At in eo quem scalpello curari oportebit:  
 simul atq; ad mediam tunicam uulnus in inguine factum perue  
 nerit: duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet  
 dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Ne  
 q̃ enim cum periculo læditur: quæ excidenda est: cum intesti  
 num esse nisi sub ea non possit. Vbi deducta autem erit ab in  
 guine usq; ad testiculum incidi debet: sic ne is ipse lædatur.  
 tum excidi. Fere tamen hanc curationem puerilis ætas & modi  
 cum malum recipit. Si uir robustus est: maiusq; id uicium est:  
 extrahi testiculum non debet: sed in sua sede permanere. Id  
 hoc modo fit: Inguen eadem ratione usq; ad mediam tunicam  
 scalpello aperitur. eaq; tunica eodem modo duobus hamis ex



capitur: sic ut a ministro testiculus eatenus contineatur / ne per  
vulnus exeat. tum ea tunica deorsum uersus scalpello incidi-  
tur: subeaque index digitus sinistrae manus adimum testicu-  
lum demittitur: eumque ad plagam compellit. Deinde dextrae  
manus duo digiti pollex atque index uenam & arteriam & ner-  
uum tunicamque eorum a superiore tunica diducunt. Quod si  
aliqua membranula prohibent / scalpello resoluantur: donec  
ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quae excidenda sunt:  
repositoque testiculo ab ora quoque eius vulneris: quod in in-  
guine est. demenda habenula paulo latior est: quo maior pla-  
ga sit & plus creare carnis possit.

De omenti curatione.

Caput XXI

**A** T si omentum descendit. eodem quidem modo: quo su-  
pra scriptum est: aperiendum inguen: diducendaeque tuni-  
cae sunt. Considerandum autem est: maior ne is modus, an ex-  
iguus sit. Nam quod paruum est: super inguen in alium uel  
digito uel auerso specillo repellendum est. Si plus est: sinere  
oportet dependere quantum ex utero prolapsum est: idque ad  
urentibus medicamentis illinere: donec emoriatur et excidat.  
Quidam hic quoque duo lina acu traiciunt: binisque singu-  
lorum capitibus diuersas partes astringunt. Sub quo & que: sed  
tardius emoriatur. Adiicitur tamen hic quoque celeritati. si o-  
mentum super uinculum illinitur medicamentis quae sic exedunt  
ne erodant: sepsa graeci uocant. Fuerunt etiam qui omentum  
forfice praeciderent: quod in paruulo non est necessarium: Si  
maius est / potest profusionem sanguinis facere. Siquidem o-  
mentum quoque uenis quibusdam etiam maioribus illigatum  
est. Neque uero si discussio uentre id prolapsum forbice praeci-  
ditur: cum & mortuum sit & aliter tutius auelli non possit: in  
de huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari. si  
relictum omentum est: futura debet. Si id amplius fuit: & ex-  
tra mortuum est: excisis oris / sicut supra propositum est. Si



uero humor intus est / incidendum est / in pueris quidem ingue  
nisi in his quoque liquoris eius maior modus prohibet / in uilis  
uero & ubique multus humor subest / scrotum. Deinde si in  
guen incisum est / eo protactis tunicis humor effundi debet.  
Si scrotum: et sub hoc protinus uicium est / nihil aliud q̄ hu  
mor est effundendus: abscidendaeque membrane sunt: si quae  
eum continuerunt: deinde eluendum id ex aqua: quae uel salem  
adiectum uel nitrum habeat. Si sub media / ima ue tunica: co  
tae hae extra scrotum collocandae / excidendaeque sunt.

## De ramicis curatione.

## Caput. XXII.

**R**amex autem si super ipsum scrotum est: adurendus est te  
nuibus & acutis ferramentis: quae ipsis uenis infigantur:  
cum eo ne amplius quam has urant: maximeque ubi inter se im  
plicate glomerantur: eo ferrum id admoendum est. tum sup  
farina ex aqua frigida subacta iniicienda est: utendumque eo  
uinculo / quod idoneum esse ani curationibus posui. Tertio  
die lenticula cum melle imponenda est: post electis crustis ul  
cera melle purganda: rosa implenda: ad cicatricem aridis lina  
mentis perducenda sunt. Quibus uero super mediam tunicam  
uenae tument: incidendam inguen est: atque tunica promouen  
da: ab eaque uenae digito uel manubriolo scalpelli separandae.  
Qua parte uero inhaerebunt: & ab superiore & ab inferiore par  
te lino uinciendae: tum sub ipsis uinculis praecidendae:  
reponendusque testiculus est. At ubi supra tertiam tunicam  
ramex insedit: mediam excidi necesse est. Deinde si duae / tres  
ue uenae tument: & ita pars aliqua obsidetur: ut maiore uitio  
uacet: idem faciendum quod supra scriptum est: ut ab inguine  
& a testiculo delegatae uenae praecidantur: isque condatur. Sin  
totum id ramex obsederit: per plagam idemittendus digitis in  
dex erit: subiiciendusque uenis: sic ut paulatim protrahat: & que  
adducendo / donec is testiculus par alteri fiat. Tum fibula o  
ris sic incidenda ut simul eas quoque uenas comprehendant. Id



hoc modo fit. Acus abexteriore partē oram uulneris perforat. Tum non per ipsam uenam: sed per membranam eius immittitur/per eamq; in alteram oram compellitur. Venae uulnerari non debent: ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has uenas est: ac neque periculum affert: & filo comprehensas illas abunde tenet. Itaque etiam satis est duas fibulas esse. tū uenae quaecunque protrahae sunt in ipsum inguen aduerso specillo comprehendī debent. Soluendi fibulas tempus inflammatione finita & purgato uulnere est: ut una simul & oras & uenas cicatrix deuinciat. Vbi uero inter imam tunicam & ipsum testiculum neruumque eius ramex ortus est: una curatio est quae totum testiculum abscidit. Nam neque ad generationem quicquam is confert & omnibus indecore: quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed cum quoque inguē incidendum media tunica promenda atque excidenda est. idem inima faciendum: neruusque ex quo testiculus dependet praecidendus. Post id uenae & arteriae ad inguen lino deligandae & infra uinculum abscidendae sunt.

De carne quae inter tunicas testiculorum conueruit & de neruo indurato.

Caput. XXIII.

**C**aro quoq; siq̃do inter tunicas cōcreuit nihil dubi ē: quin eximenda sit. sed id ipso scroto inciso fieri commodius est. At si neruus induruit: curari res neque manu neque medicamento potest. Vrguent enim febres ardentes: & aut uirides aut nigri uomitus: praeter hęc ingens sitis & linguae asperitudo fereque adie tertio spumans bilis aluo cum rosione redditur. Atque neque assumi facile cibus neque contineri potest: neq; multo post extremæ partes frigesunt. tremor oritur. manus sine ratione extenduntur, deinde infronte frigidus sudor: eumque mors sequitur.

De ramice inguinis.

Caput. XXIII.



**V**bi uero in ipso inguine ramex est: si tumor modicus est: semel incidi. si maior: duabus lineis debet: ut medium excidatur. deinde non extracto testiculo. sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui: colligendae uenae uinciendae quae ubi tunicis inhaerebunt & sub his modis praecidendae sunt. Neque quicquam noui curatio uulneris eius requirit

Ad regendam glandem colis si nuda est. Caput. XXV

**A**b his ad ea transeundum est: quae in cole ipso fiunt: in quo si glans nuda est: uultque aliquis eam decoris causa tegere: fieri potest: sed expeditius in puero quam in uiro: In eo cui id naturale est: quam in eo / cui quorundam gentium more circumcissus est: In eo / cui glans parua: iuxtaque eam cutis: spaciosior uero ipse coles est: quam in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum / quibus id naturale est: eiusmodi est. Cutis circa glandem apprehenditur & extenditur: donec illam ipsam condat: ibique deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergus inciditur. donec coles nudetur: magnaue cura cauetur ne uel urina iter: uel uenae / quae ibi sunt: incidantur. Eo facto cutis aduinculum inclinatur: nudaturque circa pubem uelut circulus. eoque linamenta dantur: ut caro iacrescat & id impleat: satisque uelamenti supra latitudo plagae praestet. Sed / donec cicatrix sit, uinctum esse id debet: in medio tantum relicto exiguuo urinae itinere. At in eo qui circumcissus est: subcirculo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet: quia summo soluto / deduci deorsum usque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. Tum multa frigida aqua fouetur: emplastrumque circa datur: quod ualentem inflammationem reprimat. Proximisque diebus ut prope a fame uictus est: ne forte eam partem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est: deligari debet a pube usque circulum. Super glandem autem



aduerso emplastro imposito induci. Sic enim fit: ut inferior pars glutinetur: superior ita sanescat: ne inhaereat.

Quomodo glans penis contestata aperiri possit.

**C**ontra si glans ita contestata est: ut nudari non possit: Quod uitiū græci phymosin appellant: aperienda est. Quod hoc modo fit. Subter a summa ora cutis inciditur recta linea usque ad frenum. atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est: aut propter angustias: aut propter duritiem tergoris: protinus triangulari forma cutis ab inferiore parte excidenda est: sic ut uertex eius ad frenum basis intergo extremo sit. Tum super danda linamenta sunt: aliisque medicamenta: quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est: donec cicatrix sit: conualescere. Nam ambulatio atterendo: ulcus sordidum reddit.

#### Infibulandi ratio

**I**nfibulare quoque adolescentulos interdum ualitudinis causa quidam consueverunt. Eiusque hæc ratio est. Cutis quæ super glandem est: extenditur. notaturque utrinque alteribus atramento qua perforatur: deinde remittitur. Si super glandem notæ reuertuntur: nimis apprehensum est: & cultra notari debet. Si glans ab his libera est: is locus idoneus fibulæ est. Tum quæ notæ sunt: cutis acu filum ducente transitur: eiusque filii capita inter se deligantur: quotidieque id mouetur donec circa foramina cicatriculæ fiant. Vbi hæ confirmatæ sunt: ex emplo filo fibula additur. quæ quo melior / eo lenior est. Sed hoc quidem sæpius inter superuacua / quam inter necessaria est.

De urinæ reddendæ difficultate & decalculo: curationibusque eorum.

Caput. XXVI.

**R**es uero interdum cogit emoliri manu urinam: cum illa non



redditur: aut quia senectute iter eius collapsum est: aut quia calculus/uel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. Ac mediocri quoque inflammatio saepe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in uiris tantummodo: sed in foeminis quoque interdum necessarium est. Ergo beneae fistulae fiunt: quae ut omni corpori ampliori minorique sufficiant. Admares tres: ad foeminas duae medico habendae sunt. Ex uirilibus maxima decem & quinque est digitorum. media duodecim. minima nouem. Ex muliebribus maior nouem: minor sex. Incuruas uero esse eas paulum: sed magis uiriles oportet: leuesque admodum ac neque nimis plenas: neque nimis tenues. Homo tum resupinus/eo modo: quo incuruatione ani figuratur: super subsellum aut lectum collocandus est. Medicus autem a dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere: dextra uero fistulam demittere in iter urinae debet. Atque ubi ad ceruicem uesicae uentum est: simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam uesicam compellere: eamque urina reddita recipere. Foemina breuius urinae similiter & rectius iter habet. quod mammae simile inter imas oras super naturale positum non minus saepe auxilio eget. aliquanto minus difficultatis exigit. Non nunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus: qui subinde ea extenuatur: non longe ab exitu inhaerescit. Eum si fieri potest: oportet uellere: uel oriculario specillo uel eo ferramento: quo infectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit: cutis extrema quam plurimum attrahenda & condita glâ de lino uincienda est. deinde a latere recta plaga coles incidendus & calculus eximendus est: Tum cutis remittenda. Sic enim fit: ut incisum colem integra pars cutis contegat: & urina naturaliter profluat.

Quae curatio calculosis adhibeatur

**C**um uesicae uero/calculique facta mentio sit: locus ipse exigere uidetur. ut subiciam: quae curatio calculosis: cum aliter succurri non potest: adhibeatur. Ad quam festina



re: cum præceptis sit, nullo modo conuenit. Ac neq; omni tem-  
pore: neq; in omni ætate: neque in omni uitio id experiendum  
est: sed solo uere: in eo corpore: quod iam nouem annos: non  
dum quatuordecim excessit. & si tantum mali subest. ut ne-  
q; medicamentis uinci possit: neq; etiam trahi posse uideatur  
quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non  
interdum etiam temeraria medicina proficiat: sed quo sæpius  
utiq; in hoc fallat. in quo plura & genera & tempora periculi  
sunt. Quæ simul cum ipsa curatione proponam. Igitur ubi ul-  
tima experiri statutum est: ante aliquot diebus uictu corpus  
preparandum est. ut modicos: ut salubres cibos: ut minime glu-  
tinosos assumat: ut aquam bibat. Ambulandi uero inter hæc  
exercitatione utatur: quo magis calculus ad uesicæ cer-  
uicem descendat. Quod an inciderit: digitis quoq; sicut incu-  
ratione docebo: demissis cognoscitur. Vbi eius rei fides est:  
pridie is puer in ieiunio continendus est. & tum loco calido cu-  
ratio adhibenda. quæ hoc modo ordinatur. Homo præualens  
& peritus in sedili alto confidit: supinumq; eum & aduersum  
super genua sua coxis eius collocatis comprehendit: reductis  
que eius cruribus ipsum quoq; iubet manibus ad suos, poplites  
datis: eos quam maxime possit attrahere: simulq; ipse sic eos  
continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur: duo  
bus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt: quo & sedilia & in-  
teriora cura inter se deligantur: ne diduci possint. Tum is su-  
per duorum genua eodem modo collocatur: atq; alter pro ut  
confedit sinistrum crus eius: alter dextrum: simulq; ipse popli-  
tes suos attrahit. Siue autem unus siue duo continent: super hu-  
meros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit ut in-  
ter illa sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus: & inan-  
gustum compulsa uesica facilius calculus capi possit. Præter  
hæc etiam num aliteribus duo ualentes obiciuntur: qui circun-  
stantes leuare uel unum uel duos: qui puerum continent non si-  
nunt. Medicus deinde diligenter unguibus circuncisis atque si-  
nistra manu duos eius digitos indicem & medium leniter pri-  
us unum deinde alterum in anum eius demittit: .dd. i.



dextræq; digitos super inum, abdomen leniter imponit: ne si intrinque digiti circa calculum uehementer concurrerint: uesicam laedant. Neque uero festinanter in hac re ut in plerisque agendum est. sed ita ut quam maxime id tuto fiat. nam laesa uesica neruorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa ceruicem quaeritur calculus. Ibi repertus minore negotio expellitur. Et ideo dixi ne curandum quidem: nisi cum in hoc inditiis suis cognitum est. si uero aut ibi non fuit: aut recessit retro: digiti ad ultimam uesicam dantur: paulatimque dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. Atque ubi repertus est calculus: qui necesse est in manus incidat: eo curiosius deducitur. quo minor lauiorque est: ne effugiat: id est ne facilius agitanda uesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur: sinistrae digiti deorsum eum compellunt donec ad ceruicem peruenitur. In quam si oblongus est. sic compellendus est ut pronus exeat. si planus: sic ut transuersus sit. si quadratus: ut duobus angulis sedeat. si altera parte plenior sic ut prius ea qua tenuior sit: euadat. In rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet: nisi si lauior altera parte est: ut ea ante cedat. Cum iam eo uenit: ut incidit super uesicae ceruicem iuxta anum cutis/plaga lunata usque ad ceruicem uesicae debeat cornibus ad coxas spectantibus paulum: deinde ea parte qua strictior ima plaga est etiam nunc sub cute altera transuersa plaga facienda est. qua ceruix aperiatur donec urinae iter pateat: sic ut plaga paulo maior quam calculus sit. nam qui metu fistulae: quam illo loco corhyada graeci uocant: parum patefaciunt: cum maiore eodem periculo reuoluuntur. quia calculus iter: cum ui promitur. facit: nisi accipit. Idque etiam perniciosius est: si figura quoque calculi uel asperitudo aliquid eo contulit. Ex quo & sanguis profusio & distentio neruorum fieri potest. Quae si quis euasit: multo tamen patientiorem fistulam habiturus est rupta ceruice quam habuisset incisa: Cum uero patefacta est: in conspectum calculus uenit: incurus corpe nullum discrimen est. Ipse si exiguus est: digitis ab altera parte propelli



ab altera protrahi potest. Si maior: iniciendus a superiore ei  
parte uncus est eius rei causa factus. Is est ad extremum tenu  
is: in semicirculi specie reclusa latitudinis: ab exteriori parte  
latus: qui corpori iungitur: ab interiori asper: qua calculum at  
tingit. Isque longior potius esse debet. Nam brevis extrahen  
di vim habet. Vbi iniectus est: in utrunque latus inclinatus est  
ut appareat calculus & teneatur: quia si apprehensus est: ille si  
mul inclinatur. Ideoque eo minimo opus est: ne cum adduci  
uncus coeperit: calculus intus effugiat: hic in oram vulneris in  
cidat: eamque conuulneret. In qua re quod periculum esset iam  
supra posui. Vbi satis teneri calculum patet: eodem pene mo  
mento triplex motus adhibendus est: in utrunque latus: deinde  
extra: sic tamen ut leniter id fiat: paulumque primo calculus  
attrahatur. quo facto attollendus uncus extremus est: uti in  
tus magis maneat: faciliusque illum pducatur. Quod si aliqua  
do a superiore parte calculus parum commode comprehende  
tur: a latere erit apprehendendus. Haec est simplicissima cura  
tio. Sed uarietas rerum quasdam etiam num animaduersiones  
desiderat. sunt enim quidam non asperi tantummodo sed spi  
nosi quoque calculi: qui per se quidem delapsi in ceruicem sine  
ullo periculo eximuntur. In uesica utro non tuto uel hi conqui  
runtur uel attrahuntur. quoniam ubi illam conuulnerant: ex  
distentione neruorum mortem maturant: multoque magis si  
spina aliqua uesicae inhaeret. eamque cum duceretur: duplica  
uit. Colligitur autem eo quod difficilius urina redditur: in cer  
uice calculum esse: eo quod cruenta destillat: illum esse spino  
sum. maxime que id sub digitis quoque experiundum est: ne  
que adhibenda manus: nisi id constitit. Actum quoque leni  
ter intus digiti obiciendi: ne uiolenter promouendo conuulne  
rent. tum incidendum. Multi hic quoque scalpello usi sunt.  
Meges quoniam is infirmior est: potestque in aliqua promine  
tia incidere: incisoque super illam corpore / qua cauum subest  
non secare: sed reliquere: quod iterum incidi necesse sit: ferrame  
ntum fecit rectum in sumam parte labrosu: in ima semicirculatu acutum  
.dd. ii.



Id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat. ut simul cum carne siquid ex calculo prominebat. incideret. Quo cum sequebatur: ut semel quārum satis esset. aperiret. Quocumq; autem modo ceruix ea prefacta est: leniter extrahi quod asperum est: debet. nulla propter festinationem ui admota.

Signa calculorum uel harenosorum uel mollium.

**A**lcalculus harenosus: & ante manifestus est. quoniam & urina quæ redditur harenosa est: & in ipsa curatione quoniam inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur: & insuper dilacatur. Item mollis calculus & ex pluribus minutisq; sed inter se parum astrictis compositus in dicatur: in se atcrabens quasdam quasi squamulas. Hos omnis leniter permutatis subinde digitorum uicibus sic oportet abducere: ne uesicam lædant. ne ue intus aliqua dissipata reliquia maneat. quæ postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum uenit uel digitis uel unco eximendum est. At si plures calculi sunt: singuli protrahi debent: sic tamen ut si quis exiguus superent: potius relinquantur. Siquidem in uesica difficulter inueniatur. inuentusq; celeriter effugit. Ita longa inquisitione uesica læditur: excitatq; inflammationes mortiferas adeo ut quidam se et cum diu frustra per digitos uesica esset agitata decesserint. Quibus accedit etiam quod exiguus calculus ad plagam urina postea promouente excidit. Si quando autem is maior non uidetur nisi rupta ceruice extrahi posse findendus est. Cuius repertor Ammonius ob id lithotomos cognominatus est. Id hoc modo fit. Vncus in iicitur calculo: sic ut facile eum concussum quoq; teneat: ne is retro reuoluatur. Tum ferramentum adhibetur. crassitudinis modica prima parte tenui: sed retusa: quod admodum caliculum ex altera parte ictum findit. magna cura habita: ne aut ad ipsam uesicam per ferramentum perueniat: aut calculi fractura nequid incidat.

De calculis foeminarum.



**H**ae uero curationes in foeminis quoque similes sunt: de quibus tamen parum proprie quaedam dicenda sunt: Siquidem in his ubi paruulus calculus est: scalpellus superuacuuus est quia is urinam in ceruicem non compellit, quae & breuior quàm in maribus & laxior est. Ergo & per se saepe excidit: & si in primo quod est angustius inhaeret: eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed uirgini subitici digiti tanquam masculo mulieri per naturalia eius debent. Tum uirgini quidem sub ima sinisteriore ora. Mulieri uero inter urinae iter & os pubis incidendum est sic ut utroque loco plaga transuersa sit: neque terreat conuenit si plus ex muliebili corpore sanguinis profuit.

Quae curatio calculo euulso habenda sit.

**C**alculo euulso si uulens corpus est: neque magnopere uexatum: sinere oportet sanguinem fluere: quo minor inflammatio oritur. Atque ingredi quoque eum paulum non alienum est, ut excidat siquid intus concreti sanguinis mansit. Quod si perire non destitit: rursus ne uis omnis intereat suppressi debet. Idque protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem ut distentione nervorum periclitatur aliquis dum uesica eius agitur: sic alter merus excipitur remotis medicamentis ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat: desidere is debet in acre acetum: cui aliquantum salis sit adiectum. Sub quo & sanguis fere conquiescit & astringitur uesica: ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit: agglutinanda cucurbitula est ex inguinibus & coxis & super pubem. Vbi iam satis uelocatus est sanguis uel prohibitus: resupinus collocandus est: sic ut caput humile sit: coxa paulum excitetur, ac super ulcus imponendum est duplex aut triplex linteolum aceto madens: Deinde interpositis duabus horis in solium is aquae calidae resupinus demittendus est: sic ut agnibus adubili uel aqua teneat: cetera uestimentis circumda

.dd.iii.

ra sint/



manibus tantummodo pedibusque nudatis: ut & minus digera-  
tur: et ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet: quo  
spongia subinde facile detergendum est. finisque eius fomen-  
ti est donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perun-  
guendus: induendusque hapsus lanae mollis tepido oleo reple-  
tus: qui pubem & coxas & inguina & plagam ipsam contectā  
eodem ante se linteolo protegat. isque subinde oleo tepido  
malesaciendus est: ut neque frigus ad uesicam admittat: & ner-  
uos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus u-  
tuntur. Ea plus pondere nocent: quae uesicam urgendo uulnus  
irritant: quod calore proficiunt. Ergo ne uinculum quidem ullum  
necessarium est. Proximo die si spiritus difficiliter redditur:  
si urina non excedit: si locus circa pubem mature intumuit: sci-  
re licet in uesica sanguinem concretum remansisse. Igitur de-  
missis eodem modo digitis leuiter pertractanda uesica est &  
discutienda si qua coierunt. Quo fit ut per uulnus postea pro-  
cedant. Non alienum etiam est oriculario clystere acetum ni-  
tro mixtum per plagam in uesicam compellere. Nam sic quo-  
que discutiuntur si qua cruenta coierunt. Eaque facere etiā primo  
die conuenit. Si timemus nequid intus sit. maximeque ubi ambu-  
lando id elicere imbecillitas prohibuit: cetera eadem facienda  
sunt: ut demittatur insolium / ut eodem modo panniculus eadē  
lana super iniiciatur. Sed neque saepe / neque tandiu in aqua calida  
puer habendus / quam adolescens est: infirmus / quam ualens: le-  
ui quam grauiore inflammatione affectus: is cuius corpus dige-  
ritur / quam is cuius astrictum est. Inter haec uero si somnus est  
& qualis spiritus & madens lingua & sitis modica & uenter i-  
mus: sed et mediocris est cum febre modica dolor: scire licet  
recte procedere curationem. Atque in his inflammatio fere quin-  
to uel septimo die finitur. Qua leuata solium superuacuum est.  
Supini tantummodo uulnus aqua calida fouendum est: ut si  
quid urinae rodet: abluatur. Imponenda autem medicamenta  
sunt pus mouentia: et si purgandum ulcus uideatur: melle li-



nendum. Id si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum uidetur enneapharmacum emplastrum. Nam & seuum habet ad pus mouendum, & mel ad uiscus repurgandum: medulla etiam maximeq; uiculina, quod in id ne fistula relinquitur, precipue proficit. Linamenta uero cum super ulcus non sunt necessaria: super medicamentum ad id continendum recte imponuntur. At ubi ulcus purgatum est: puro linamento ad cicatricem perducendum est. Quibus temporibus tamen si felix curatione non fuit: uaria circa periculi oriuntur. Quae praesagire protinus licet: si continua uigilia est: si spiritus difficultas: si lingua arida est: si sitis uehemens: si uenter imus tumet: si uulnus hiat: si transiluens urina id non rodit: si similiter ante tertium diem quaedam liuida excidunt: si is aut nihil aut caute de respondet: si uehementes dolores sunt: si post diem quintum magnae febres urgent: & fastidium cibi permanet. si cubare in uentrem iocundius est. Nihil tamen prius est distentione nerborum: & ante nonum diem uomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus: succuri abstinencia modicis et tempestiuis cibis, inter haec fomentis: de quibus supra scripsimus, oportet.

De cancro qui excisa uesica nascitur: et qua curatione uti debeat. Caput. XXVII.

**P**roximus canceri metus est. Is cognoscitur: si et per uulnus et per ipsum colem fluit sanies mali odoris: cum quo quaedam accretio sanguine non abhorrentia: tenuesq; carunculae lanulis similes. praeter haec si ora uulneris arida sunt. si dolent inguina. si febris non defuit: eaq; in noctem augetur: si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est: inquam parte cancer is tendat. Si ad colem: indurescit is locus & erubet & tactu dolorem excitat: testiculiq; intumescunt. Si in ipsam uesicam: ani dolor sequitur: coxae durescunt: non facile crura extendi possunt. At si in alterutrum latus: oculis id



## LIBER SEPTIMVS

expositum est: paresq; utrinq; easdem notas sed minores habet. Primum autem ad rem pertinet corpus recte iacere: uesicæ superior pars semper eadem sit inquam uitium fertur. ita si ad colem it: supinus is collocari debet. Si ad uesicam: inuentrem. Si in latus: in id quod integrius est. Deinde ubi uentum fuerit ad curationem: homo in aquam demittetur. in qua martubium decoctum sit aut cupressus aut myrtus. idemq; humor clystere intus adicietur. Tum super ponetur lenticula cum malicorio mixta. quæ utraq; ex uino decocta sint: uel rubus aut oleæ folia eodem modo decocta. aliq; medicamenta: quæ ad cohibendos purgandosq; caneros proposuimus. ex quibus si quæ erunt arida per scriptorium calanum inspirabuntur. Vbi stare coeperit cancer: nullo uulnus eluetur. Vitabiturq; eo tempore ceratum quod ad recipiendum id malum corpus emolliat: potius plumbum elotum cum uino inunguetur. Super quæ idẽ linteolo illitum imponetur. Sub quibus perueniri ad sanitatem potest. cum eo tamen quod non ignoremus orro cancro sæpe affici si machum cui cum uesica quoddam consortium est. ex quo fieri ut neque retineatur cibus: neque si quis retentus est: concoquatur: neque corpus alatur. ideoq; ne uulnus quidem aut purgari aut ali possit: quæ necessario mortem maturant. sed ut his succurri nullo modo potest: sic a primo tamen diuturna ratio curationis est. In qua quædam observatio ad cibum quoque portionemque pertinens necessaria est. nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. Vbi ulcus purgarum est: ex media materia olera & salsamenta semper aliena sunt. Portione opus est non modica. nam si parum bibitur: accedit uultus: et uigilia urget: et uis corporis minuitur. Si plus æquo assumitur: subinde uesica impletur. eoq; irritatur. non nisi aquam autem bibendam esse manifestius est: quam ut subinde dicendum sit. Solet uero sub eiusmodi uictu uenire ut aluus non reddatur. Hæc aqua danda est: in qua uel foenum græcum uel malua decocta sit. Idem humor rosa mixtus in p



sum uulnus oriculario clystere agendus est: ubi id rodit urina neq; purgari patitur. Fere uero primo per uulnus exit. hęc de inde eo sanescente diuiditur: & pars per colen descendere incipit: donec extot: plaga claudatur. quod interdum tertio mēse: interdum non ante sextum: non nunquam exacto quoque anno fit. Neq; desperari debet solida glutinatio uulneris: nisi ubi aut uehementer rupta ceruix est: aut ex cancro multę magnęq; carunculę: simulq; neruosa aliqua exciderunt. Sed ut uel nulla ibi fistula uel exigua admodum relinquatur: summa cura prouidendum est. Ergo cum iam ad cicatricem uulnus intendit: extentis iacere feminibus & cruribus oportet: nisi tamen molles/harenosiue calculi fuerūt. Subhis enim tardius uesica purgatur. Ideoq; diutius plagam patere necessarium est: & tum demum ubi iam nihil tale extra fertur ad cicatricem per duci. quod si ante quam uesica purgata est, orę se glutinatur dolorq; & inflāmatō redierunt: uulnus digitis uel aduerso specillo diducendum est. ut torquentibus exitusderur: hisque effusis tum diutius pura urina descendat. Tum demum quę cicatricem inducant imponenda sunt. extendiq; ut supra docui pedes quam maxime iuncti. quod si fistulę metus ex his causis quas proposui subesse uidebitur: quo facilius claudatur. eaq; certe coangustetur: inanum quoque danda plumbea fistula est extentisque cruribus femina talique inter se deliganda sunt donec qualis futura est cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus nō admittunt quo modo curari conueniat.

Caput. XXVIII.

**E**t hoc quidem commune esse maribus & foeminis potest. Proprie uero quędam ad foeminas pertinent. ut in primis: quod earum naturalia non nunquam inter se glutinatis oris concubitus non admittunt. Idque interdum euenit protinus in utero matris: interdum exulceratione in his partibus facta: & per malā curatōnem his oris sanescendo iunctis. Si ex



utero est: membrana ori uulue opposita est. Si exulcere: caro id repleuit. Oportet autem membranam duabus lineis inter se transuersis incidere ad similitudinem litteræ .X. magna cura habita: ne urina iter uoletur. Deinde undique eam membranam excidere: ac si caro increuit necessarium est recta linea patefacere. Tum ab ora uel uulsella uel hamo apprehensam tanquam habenulam excidere: & intus implicitum in longitudinem linamentum: lemniscum graeci uocant: in aceto tinctum demittere. supraque fucidam lanam aceto madentem deligare. Tercio die soluere ulcus & si cut alia ulcera curare. Cumque iam ad sanitatem tendet: plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinire: eamque intus dare. Supraque idem medicamentum iniicere: donec ad cicatricem plaga perueniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero excutitur.

Caput. XXIX.

**V**bi concipit autem aliqua si iam prope maturus partus intus emortuus est: neque excidere per se potest: adhibenda curatio est: quæ numerari inter difficillimas potest. Nam & summam prudentiam moderationemque desiderat & maximum periculum affert. Sed ante omnia uulue natura mirabilis: cum in multis aliis: tum in hac re quoque facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare: ut feminibus eius ipsius ilia comprimantur. Quofit ut & intus uenter in conspectu medici sit & infans ad os uulue compellatur: quæ emortuo partu id comprimere: ex intervallo uero paulum debiscere. Hac occasione usus medicus unctæ manus indicem digitum primum debet inserere atque ibi contrahere: donec iterum id os aperiatur. rursusque alterum digitum demittere debet: & per easdem occasiones alios: donec tota esse intus manus possit. Ad cuius rei facultatem multum confert & magnitudo uulue & uis nervorum eius & corporis totius habitus & mentis etiam robur: cum præsertim intus non nunquam etiam duæ manus dari debeant. Pertinet etiam ad



rem quam calidissimum esse intum uentrem : & extrema corporis : neq; dum inflammationem coepisse : sed recenti re procius adhiberi medicinam . nam si corpus iam intumuit : neque demitti manus : neque educi infans / nisi aegerime potest : sequiturq; saepe cum uomitu & cum tremore mortifera neruorum distentio . Verum intus emortuo corpori manus iniecta protinus habitum eius sentit . Nam aut in caput : aut in pedes conuersum est : aut intransuersum iacet : fere tamen sic : ut uel manus eius / uel pes inpropinquo sit . Medici uero propositum est : ut eum manu dirigat uel in caput / uel etiam in pedes . Si forte aliter conpositus est : ac si nihil aliud est : manus uel pes apprehensus / corpus rectius reddit : nam manus in caput : pes in pedes eum conuertet . Tum si caput proximum est : demitti debet uncus undiq; laeuis acuminis breuis : qui uel oculo : uel auri : uel ori : interdum etiam fronti recte iniicitur : deinde attractus infantem educit : neq; tamen quolibet is tempore extrahi debet . nam si compresso uulue ore id tentatum est : non emittente eo infans abruptitur : & uoci acumen in ipsum os uulue delabitur : sequiturq; neruorum distentio & ingens periculum mortis . Igitur compressa uulua : conuiescere . hianter : leniter trahere oportet & per has occasiones paulatim eum educere . Trahere autem dextra manus uncum : sinistra intus posita infantem ipsum : simulq; dirigere eum debet . Solet etiam euenire : ut is infans humore distendatur : exque eo profluat foedi odoris sanies . Quod si tale est : indice digito corpus illud forandum est : ut effuso humore extenuetur . Tum id leniter per ipsas manus recipiendum est . nam uncus iniectus facile hebeti corpusculo eleuabitur . In quo quid periculi sit / supra positum . Sed in pedes quoq; conuersus infans non difficulter extrahitur . qbus apprehensis ipsas manus comode educitur . Si uero transuersus est : neque dirigi potuit : uncus alae iniiciendus / paulatimq; attrahendus est . Sub quo fere ceruix replicatur : retroq; caput ac reliquum corpus spectat . Remedio est ceruix praecisa . ut separatim utraque pars auferatur . Id unco fit : qui priori similis in inte



riorem tantum partem per totam aciem exaquitur. Tum id agendum est: ut ante caput: deinde reliqua pars auferatur: quia fere maiore parte extracta / caput in uacuā uulua[m] prolabitur: extrahiq[ue] sine summo piculo nō potest. si tamen id incidit: super uentrem mulieris duplici panniculo inuictō: ualens homo non imperitus a sinistro latere eius debet assistere: & super inuēntrem eius duas manus imponere: alteraque alteram premere. Quo fit ut illud caput ad os uulue compellatur. Idque eadem ratione quæ supra posita est: unco extrahitur. At si pes alter iuxta repertus est: alter retro cum corpore est. quicquid protractum est / paulatim abscidendū est. et si clunes os uulue urgere coeperunt: iterum retro repellendæ sunt. conquisiti u[er]o pes eius adducendus. Aliæq[ue] etiam nūm difficultates faciunt: ut qui solidus non exit: concisus eximi debeat. Quotiens autem infans protractus est: tradendus ministro est. Is eum supinis manibus sustinere: medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet / ita ne abruptat: dextraq[ue] eum sequi usque ad eas: quas secundas uocant. quod uelamentum infantis intus fuit. isq[ue] ultimis apprehensis uenulas membranulasq[ue] omnes eadem ratione manu diducere a uulua: totumq[ue] illud extrahere: & siquid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus / illa conclau[i] collocanda est modicū calorem sine ullo preflatu habente. Super inuēntrem eius imponēda lana succida in aceto & rosa tincta: Reliqua curatio talis esse debet: qualis in inflammationibus & inijs uulneribus: quæ in nervosis locis sunt: adhibeatur.

De ani uitiiis &amp; eorum curatione.

Caput. XXX.

**A**Ni quoq[ue] uitia ubi medicamentis non uincuntur / manus auxilium desiderant. Ergo si qua scissa in eo uetustate induruerunt: iamq[ue] callum habent: commodissimum est ducere aluum. tum spongiā calidā admouere: ut relaxentur illa & foras prodeant. Vbi in conspectu sunt: scalpello singula ex



cidere & ulcera renouare. deinde imponere linamentum molle & super linteolum illitum melle: locumque eum molli lana implere & ita uincire. altero die / deincepsque cæteris lenibus medicamentis uti: quæ adrecentia eadem uicia necessaria esse alias proposui. & utique per primos dies sorbitionibus eum sustinere: paulatim deinde cibus adicere aliquid: generis tamen eius. quod eodem locopræceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his "oritur ubi primum id apparuit: incidendum est. ne anus ipse suppuret". Neque tamen ante properandum est. nam si crudum incisum est: inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus / lenibus cibus hisdemque medicamentis opus est.

De condilomatum curatione.

**A**T tubercula: quæ condilomata appellantur: ubi induruerunt hac ratione curantur. alius ante omnia ducitur. cum uulsellâ tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. Quod ubi factum est: eadem sequitur: quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. Tantummodo si quid incresecit squama æris coercendum est. Ora etiam uenarum fundentia sanguinem sic tolluntur. Vbi sanguini: qui effluit. sanies adicitur: alius actius ducitur: quo magis oræ promoueantur. Eoque fit: ut omnia uela / quasi capitula conspicua sint. Tum si capitulum exiguum est: basimque tenuem habet: astringendum lino paulum supra est / quam ubi cum ano committitur. Imponenda spongia aqua calida est. donec id libeat. Deinde aut ungue / aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est: magni dolores subsequuntur. interdum etiam urinæ difficultas. si id maius est: & basis latior: hamulo uno aut altero excipiendum est: paulum que supra basim incidendum: neque relinquendum quicquam ex eo capitulo. neque quicquam ex ano demendum est: Quod consequitur is: quæ neque nimium / neque parum hamos ducit. Qua incisum est / acus debet immitti: infraque eam lino id capitulum alligari: si duo tria ue sunt: imum quodque primum curandum est.

.cc.i.



Si plura: non omnia simul: ne tempore eodem undiq; teneræ cicatrices sint. Si sanguis profluit: excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum. Vnguenda femina & inguina & quicquid iuxta ulcus est. catartumq; super dandum est. Farina hordeacea calida implendusq; is locus est. Sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet: eodemq; cataplasmate foveri. Ac bis die & ante curationem & post eā ceruices ac femina liquido catrato perunguenda sunt: tepidoq; is loco continendus. Interpositis quoq; aut sex diebus oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt: digito promouenda. Tum lenibus medicamentis iisdemq; / quae alibi posui: ulcera ad sanitatem perducenda. finito uitio quemadmodum agendum esset iam alias superius exposui.

De uaricum curatione. Caput. XXXI.

**A** B his ad crura proximus transitus est. In quibus orti uarices non difficili ratione tolluntur. Flucautem & earum uenularum: quae in capite nocent. et eorū uaricum: qui in uentre sunt: curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. Igitur uena omnis: quae noxia est. aut adusta tabescit. aut manu exciditur. Si recta est: si quauis transversa / tamen simplex: si modica est: melius aduritur. Si curua est & uelut in orbes quosdam implicatur. pluresq; inter se inuoluuntur: utilius eximere est: Adurendi ratio haec est. Cutis super inciditur. cum patefacta uena tenui & retuso ferramento candente modice premittitur: uicaturq; ne plagae ipsius orae adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum uaricem fit: & tum super imponitur medicamentum: quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super uenam incisa hamulo orae excipiuntur: scalpelloq; undiq; a corpore uena diducitur: caueturq; ne inter haec ipsa laedatur: eique retusus hamulus subiicitur: interpositoque eodem fere spatio: quod supra positum est: in eadem uena idem fit: quae quo tendat facile hamulo extento cognoscitur.



Vbi iam idem / quacumq; uarices sunt / factum est: uno loco adducta per hamulum uena praeciditur. deinde qua proximus hamus est. attrahitur & euellitur: ibi rursus absciditur. Ac sic undique uaricibus crure liberato: tum plagarum orae committuntur: & super emplastrum glutinosum iniicitur.

Curatio digitorum coherentium. Caput. XXXII.

**A** T si digiti uel inuicem o protinus: uel propter communem exulcerationem postea cohaeserunt: scalpello diducuntur. dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur. Atque ita perse uterque sanescit. Si uero sit clausus in digito. posteaque male indurata cicatrix curuum eum reddit: primum malagma tentandum est: Dein si id nihil prodest: quod & in ueteri cicatrice / & ubi nervi laesi sunt evenire consuevit. uidere oportet nervi ne id uicium / an cutis sit. Si nervus est: attingi non debet. Neque enim sanabile est. Si cutis: tota cicatrix excidenda est. quae ferax callosa efficit / ut extendi digitum non patiarur. tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

De gangrenae curatione.

Caput. XXXIII.

**C** Aangrena inter ungues alasque aut inguina nasci. & quando medicamenta uincuntur membrum praecidi oportere. alio loco mihi dictum est. Sed id quoque cum periculo summo fit. Nam saepe in ipso opere / uel profusione sanguinis uel animae defectione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest: an satis tutum praesidium sit. quod unicum est. Igitur inter sanam uitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est: sic ut neque contra ipsum articulum id fiat. & potius ex sana parte aliquid excidatur / quam ex aegra relinquatur. Vbi ad os uentum est. reducenda ab eo sana caro & circa os subsaecanda est: ut ea quoque parte aliquid / os nudetur. dein id ferrula praecidendum est quae proxime sanae carni etiam inhaerenti. ac tum frons ossis: quam ferrula exasperauit. leuanda est. supraque inducenda cutis: quae sub eiusmodi curatione laxa esse debet ut quam maxime undique os contegat.

.cc. iij.



## •OCTAVVS.

Quo cutis inducta non fuerit id linamentis erit cōtegendum  
& super id spongia ex aceto deliganda. Cætera postea sic faci  
enda. ut in vulneribus; in quibus pus moueri debet: præceptum  
est:

### CORNELII CELSI DE MEDICINA

#### •LIBER OCTAVVS.

##### Depositu & figura totius humani corporis. Caput. I.

**S**Vperest ea pars: quæ ad ossa pertinet. quæ  
quo facilius accipi possit: prius positus / figu  
raſq; eorum indicabo. Igitur caluaria in  
cipit ex interiore parte concaua: extrinsecus  
gybba: utrinq; lauis & qua cerebri membranâ  
contegit: et qua cute capillum gignente con  
tegitur. Eaſq; simplex ab occipitio & temporibus: duplex usque  
in uerticem a fronte est. Ossaque eius ab exterioribus partibus  
dura: ab interioribus: quibus inter se connectuntur: molliora  
sunt. Interque ea uenæ discurrunt: quas his alimentum submi  
nistrare credibile est. Raro autem caluaria solida sine suturis  
est. Locis tamen æstuosius facilius inuenitur. Et id caput firmi  
ssimum: atq; ad uolore tutissimum est: ex cæteris: quo futurae pa  
uiores sunt. eo capitis ualitudo commodior est. Neque enim  
certus earum numerus est: sicut ne locus quidem: Fere tamen  
duæ super aures / tempora a superiore capitis parte discernunt  
Tertia ad aures per uerticem tendens / occipitium a summo ca  
pite diducit. Quarta ab eodem uertice p mediũ caput ad frõtem  
pcedit eaſq; mō sub imo capillo desinit: mō frõtem ipsâ secās i  
ter sup̄cilia finitur. Ex his cætera q̄dem futurae i ūguem cōmie  
tuatur.



## LIBER

Haec uero quae super aures transversae sunt. totis oris paulatim  
 extenuantur: atque ita inferiora ossa superioribus leniter insi-  
 dunt. Crassissimum uero in capite os post aurem est: quae capi-  
 llus. ut uerisimile est: ob id ipsum non gignitur. Subiis quoque  
 musculis: qui tempora connectunt: os medium in exteriorem  
 partem inclinatum positum est. At facies futuram habet ma-  
 ximam: quae a tempore incipiens per medios oculos naresque  
 transversa peruenit ad alterum tempus. Aqua breues duae sub  
 interioribus angulis deorsum spectant. Et malae quoque insum-  
 ma parte singulas transversas futuras habent. A mediusque na-  
 ribus aut superiorum dentium gingiuis per medium palatum u-  
 na procedit: aliaque transversa idem palatum secat. Et futurae  
 quidem in plurimis haec sunt. Foramina autem intra caput ma-  
 xima oculorum sunt. deinde narium: tum quae in auribus habe-  
 mus. Ex his quae oculorum sunt: recta simpliciaque ad cere-  
 brum tendunt. Narium duo foramina osse medio discernun-  
 tur. Siquidem haec primum a superciliis angulisque oculorum  
 osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine  
 uersae quo propius ori descendunt: eo magis caruncula quoque  
 molliuntur. Sed ea foramina quae a summis ad imas nares sim-  
 plicia sunt. ibi rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaque ex his  
 ad fauces per uia spiritum & reddunt & accipiunt: alia ad cere-  
 brum tendunt. In ultima parte in multa & tenuia foramina dis-  
 sipantur: per quae sensus odoris nobis datur. In aure quoque  
 primo rectum & simplex iter procedendo flexuosum fit. quod  
 ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur:  
 per quae facultas audiendi est: iuxtaque ea duo paruuli quasi  
 sinus sunt: superque eos finitur os: quod transversum a genis  
 tendens ab inferioribus ossibus sustinetur. iugale appellari po-  
 test ab eadem similitudine aqua id graeci zygo des appellant.  
 Maxilla uero est molle os: eaque una est: cuius eadem & media  
 & etiam ima pars mentum est. a quo utriusque procedit ad tempora solae  
 ea mouetur. Nam maxilla cum toto osse: quod superiores dentes exigit  
 immobiles sunt.



Verum ipsius maxillæ partes extreme quasi bicornes sunt. Alter processus intra latior / uertice ipso tenuatur: longiusque procedens sub osse iugali subit: & super id temporum musculis illigatur. Alter breuior & rotundior: & in eo sinu qui iuxta foramina auris est cardinis modo fit: ibique huc & illuc se inclinans / maxillæ facultatem motus præstat. Duriores osse dentes sunt: quorum pars maxillæ: pars superiori ossi malarum hæret. Ex his quaterni primi quia secant temnici a grecis nominantur. hi deinde quattuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere maxillares quaterni sunt: præter quod in his, in quibus tres ultimi: qui sero gigni solent: non increuerunt. Ex his priores singulis radicibus: maxillares utique binis: quidam etiam ternis quaternisue nituntur. Fereque longior radix breuiorem dentem erit, rectaque dentis recta etiam radix: curui flexa est. exque eadem radice in pueris nouus dens subit: qui multo sæpius priorem expellit. interdum tamen supra infra ue eum se ostendit. Caput autem spina excipit. Ea constat ex uertebriis quattuor & uiginti. Septem in ceruice sunt duodecim ad costas. reliquæ quinque sunt proximæ costas. Hæ teretes breuesque ab utroque latere / processus duos exigunt. Medix perforatæ: qua spinæ medulla cerebro commissa descendit. Circa quoque per duos processus tenuibus cauis peruiæ: per quæ a membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. Omnesque uertebrae exceptis tribus summis a superiore parte in ipsis processibus parum desidentis sinus habent. ab inferiore alios deorsum uersus processus tenuibus cuius peruiæ: per quæ a membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. Omnesque uertebrae exceptis tribus summis a superiore parte in ipsis processibus parum desidentis sinus habent. ab inferiore alios deorsum uersus processus exigunt. Summa igitur protinus caput sustinet / per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo fit: ut caput sursum deorsum uersum tuberibus exaspere tur: secunda superiori parti inferiore. Quod ad circuitum per



tinet / pars summa angustiore orbe finitur. Itaq; superior sum-  
 ma circumdata / in lacera quoq; caput moueri sinit. Tertia eo-  
 dem modo secundam excipit. Ex quo facilis cervici mobili-  
 tas est. Ac ne sustinere quidem caput posset: nisi utrinq; re-  
 ualentesque nerui collum continerent: quos cerotas graeci ap-  
 pellant. Siquidem horum inter omnes flexus alter semper in-  
 tus ultra prolabi superiora non patitur. Iamque uertebra ter-  
 tia tubercula quae inferiori inserantur: exigit. Caeterae proces-  
 sibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur. ac per si-  
 nus quos utrinque habent / superiores accipiunt: multisque ner-  
 uis & multa cartilagine continentur. Ac si cuncto flexu modico  
 in promptum dato caeteris negociis homo & rectus insistit &  
 aliquid ad necessaria opera curatur. Infra cervicem uero sum-  
 ma costa contra humeros sita est: inde undecim inferiores us-  
 que ad imum pectus perueniunt. haec primis partibus rotun-  
 dae & leniter quasi capitulatae uertebrae transversis proces-  
 sibus ibi quoque paulum insinuat inhaerent. Inde patescunt  
 & in exteriorem partem recuratae paulatim in cartilagine-  
 m degenerant. Eaque parte rursus in interiora leniter flexae com-  
 mictuntur cum osse pectoris. Quod ualens & durum a faucibus  
 incipit: ab utroque latere lunatum: & a praecordis iam ipsum  
 quoque cartilagine mollium terminatur. Subcostis uero prio-  
 ribus / quinque quas rhoas graeci nominant: breues renuioresque  
 atque ipse quoque paulatim in cartilagine uersae: extremis  
 abdominis partibus inhaerescunt: imaque ex his maiore iam p-  
 te nihil nisi cartilago est. Rursus a ceruice duo lata ossa utrin-  
 que ad scapulas tendunt. nostri scapulae operata: omoplatas  
 graeci nominant. Ea in summis uerticibus sinuata / ab his trian-  
 gula: paulatimque lateſcentia ad spinam tendunt. & quo lati-  
 ora quaque parte sunt / hoc hebetiora. Aequae ipsa quoque in  
 imo cartilaginosa posteriore parte uelut innatant: quoniam  
 nisi in summo nulli ossi inhaerescunt. Ibi uero ualidis muscu-  
 lis neruisque constricta sunt. At a summa costa paulo interius



¶ ubi ea media est: os excrefcit: ibi quidem tenue: procedens  
 uero quo propius lato scapularum offi fit: eo plenius latiusq;  
 & paulatim in exteriora curuatum. quod propius altera uer-  
 cis parte modice incumefcens: fufinet iugulum. Id autem ip-  
 fum recuruum ac neq; inter duriffima offa numerandum: alte-  
 ro capite in eo quod pofuit: altero in exiguo finu pectoralis of-  
 fis infidit: paulumq; motu brachii mouetur & cum lato offe  
 scapularum infra caput eius neruis & cartilagini conneftitur.  
 Hinc humerus incipit extremis utrinq; capitibus tumidus mol-  
 lis fine medulla cartilaginofus. medius teres durus medullo-  
 fus leniter gibbus & in priorem & in posteriorem partem. Prior  
 autem pars est: quæ a pectore est: posterior: quæ ab fcapulis  
 interior, quæ ad latus tendit: exterior: quæ ab eo recedit. quod  
 ad omnes articulos pertinere in ueterioribus patebit. Superius  
 autem humeri caput rotundius q̃ cætera offa. de quibus adhuc  
 dixi: uerticilatis fcapularum offibus inferitur ac maiore parte  
 extranfitu neruis deligatur. At inferius: duos proceffus ha-  
 bet. inter quos quod medium est: magis etiam extremis parti-  
 bus finuatur. Quæ res fedem brachio præftat. Quod conftat  
 ex offibus duobus. Radius: quam cercida græci appellant: fu-  
 perior breuiorque & primo tenuior rotundo & leniter cauo ca-  
 pite exiguum humeri tuberculum recipit. atq; ibi neruis & car-  
 tilagine continetur. Cubitus inferior longiorq; & primo pleni-  
 or in fummo capite: duobus quali uerticibus extantibus in finu  
 humeri quem inter duos proceffus eius effe propofui: fe infe-  
 rit. Primo uero duobus radiis brachii offa iuncta paulatim  
 dirimuntur: rurfusq; ad manum coeunt modo craffitudinis mu-  
 tato: Siquidem ibi radius plenior: cubitus admodum tenuis e-  
 Deinde radius in caput cartilaginofum confurgens: in uerticem e-  
 ius finuatur. cubitus rotundus in extremo: parte altera paulum  
 procedit. Ac ne fæpius dicendum fit. illud ignorari non oportet:  
 plurima offa in cartilaginem definere: nullum articulum  
 non fic finiri. Neq; enim aut moueri poffet: nifi leui innitere



## LIBER.

tur: aut cum carne nervisque coniungi / nisi ea media quaedam materia committeret. In manu uero prima palmae pars ex multis minutisque ossibus constat: quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia & triangula structura quadam inter se connectuntur. cum inuicem superior alterius angulus / alterius planities sit. eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concavis species. Verum ex manu duo exigui processus in sinu radii coniunguntur. Tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent: a quibus ipsi digitus oriuntur: qui ex ossibus ternis constant: omniumque eadem ratio est. Interius os in uerticem sinuatur: recipitque exterioris exiguum tuberculum: nervique ea continent: a quibus unguis indurescunt. Ideoque non ossi: sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. Ima uero spina in coxarum osse desidit: quod transversum longeque ualentissimum / uulvam / uesicam. rectum intestinum tuetur: idque ab exteriori parte gibbum: ad spinam resupinatum a lateribus id est in ipsis coxis sinus rotundos habet: a quibus oritur os quod pectinem uocant. idque super intestina subpube transversum uentrem format: rectius inuicis: recuruatum magis in exteriora inflexum: ne partum prohibeat. Inde femina oriuntur. quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt: cum illa ex caeteris rotundissima sint. Infra uero duos processus apriore & a posteriore parte habent. Dein dura & medullosa & ab exteriori parte gibba habent: rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus coxae sicut humeri in ea ossa / quae scapularum sunt: coeuntur. cum infra introitus leniter intendunt: quo aequalius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur: quo facilius excipi a cruribus possint. Quae commissura osse paruo molli cartilaginosa tegitur: patellam uocant. Haec super innatans. nec ulli ossi inhaerens: sed carne & nervis deligata: pauloque magis ad femoris os tendens inter omnes crura



flexus iuncturam tuetur. Ipsum autem crus est ex ossibus duobus. etenim per omnia femur humero: crus uero brachio / simile est. adeo ut habitus quoque & decor alterius ex altero cognoscatur. Quod ab ossibus incipiens etiam incari respondet. Vetum alterum os ab exteriori parte / supra positum est. quod ipsum quoque supra recte nominatur: Id breuius / supraque tenuius ad ipsos talos intumescit; Alterum a priore parte positum / cui tibiae nomen est / longius & in superiore parte plenius solum cum femoris inferiore capite committitur. sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa infra supraque coniuncta media / ut in brachio dehiscunt. Excipitur autem crus infra ossa extransuerso talorum: idque ipsum super os calcis situm est quod quadam parte sinuatur: quadam excessus habet: & proredentia extalo recipit: & in sinum eius inseritur. idque sine medulla durum magisque in posteriorem partem proiectum / teretem ibi figuram representat. Cetera ossa pedis adeorumque in manu sunt similitudinem instructa sunt. Placae / palmae / digiti / digitis. ungues / unguibus respondent.

Ossa uitiata & corrupta quibus signis cognoscantur & quatione curentur: Caput: II.

**O** Mne autem os ubi iniuria accessit: aut uitiatur: aut finditur: aut fragitur: aut foratur: aut colliditur: aut loco mouetur. Id quod uitatum est. primo fere pingue fit: deinde uel nigrum / uel cariosum. Quae super natis grauius ulceribus aut fistulis: hisque uel longa uetustate uel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet autem ante omnia os nudare ulcere exciso et si latius eius uitium est / quam ulcus fuit. carnem subsecare: donec integrum os undique pateat. tunc id quod pingue est semel iterum ne satis est admoto ferramento adurere: ut ex eo statu secedat. aut eradere donec iam aliquid cruoris ostendatur. quae integrioris nota est. nam necesse est aridum sit id quod



## LIBER OCTAVVS

uitiatum est. Idem incartilagine quoque læsa faciendum est. Siquidem ea quoque scalpello radenda est: donec integrum id sit quod relinquatur. Deinde siue os siue cartilago rasa è nitro bene trito reispargendum est. Neque alia facienda sunt ubi caries, nigritie siue in summo osse est. Siquidem id uel paulo diutius eodem ferimento adurendum: uel radendum est. Qui radit hæc: audacter imprimere ferramentum debet: ut & agat aliquid & maturius desinat. Finis est: cum uel ad albū os uel ad solidum uentum est. Albo finiri ex nigritie uitium: soliditate quadam excarie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. Si quando autem altius descenderit utrunlibet dubium est. In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue iforamen demittitur, quod magis minutue intrando uel in summo cariem esse uel altius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore & ex febre. Quæ ubi mediocria sunt: illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen ad acta terebra fit. Nam finis uitii est ubi scobis nigra esse desinit. Igitur si caries alte descendit: per terebram urgueda crebris foraminibus est. quæ altitudine uitium æquent. Tum in ea foramina demittenda cædencia ferramenta sunt. donec inde siccum os extoto fiat. Si mul enim post hæc & resoluetur ab inferiore osse quodcumque uitiatum est: & is sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea feretur: aut mediocris. Sin autem nigrities est: aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit: oportet excidi. Atque idem incarie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totum uitiatum: totum eximendum est. Si inferior pars integra est: eatenus quod corruptum est excidi debet. Item siue capitis. siue pectoris os: siue costa cariola est: inutilis uitio est: & excidendi necessitas est. Neque audienti sunt qui osse nudato diem tertium expectant: ut tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri potest eodem momento & cutis incidenda est: & os deregendum: & omni uitio liberandum est. Longe



## LIBER

pernitiosissimum est / quod inosse pectoris est: quia uix etiam  
si recte cessit curatio ueram sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur. & de Modiolo: & Terebra ferra-  
mentis ad id paratis. Caput. III.

**E**xciditur uero os duobus modis. Si paruulum est / quod  
laxum est: modiolo / quem choenicion græci uocant. Si  
spatiosus: terebris: Vtriusque rationem proponam. Modiolus  
ferramentum concavum / teres est imis oris ferratum: pro quo mediū  
clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebra-  
rum autem duo genera sunt. Alterum simile ei / quo fabri utū-  
tur. Alterum capituli longioris: quod ab acuto mucrone inci-  
pit: deinde subito latius fit: atque iterum ab alio principio pau-  
lo minus quam æqualiter sursum procedit. Si uitium in angusto  
est: quod comprehendere modiolus possit. ille potius aptatur.  
Et si caries subest. medius clauus in foramen demittitur. Si ni-  
grities: angulo scalpri sinus exiguus fit / qui clauum recipiat:  
ut eo insistente circum actus modiolus delabi non possit. De-  
inde his habena quasi terebra conuertitur. Estque quidam pre-  
mendi modus: ut & foretur & circum agatur. quia si leuiter im-  
primitur: parum proficit. Si grauiter: non mouetur. Neque ali-  
enum est instillare paulum rosæ uel lactis: quo magis lubrico  
circumagatur. Quod ipsum tamen si copiosius escaciem ferra-  
menti hebetat. at ubi iam inter modiolo pressum est: medius  
clauus educitur: & ille per se agitur. Deinde cum sanitas infe-  
rioris partis scobe cognita est: modiolus remouetur. at si lati-  
us uitium est / quam ut illo comprehendatur: terebra res agen-  
da est. Ea foramen fit in ipso sine uitiosi ossis atque integri: de-  
inde alterum non ita longe. tertiumque donec totus is locus /  
qui excidendus est / his cauis cinctus sit. atque ibi quoque qua-  
tenus terebra agenda sit. scobis significat. Tunc excisarius  
scalpet ab altero foramine ad alterum malleolo adactus / id quod  
inter utrumque medium est: excidit. ac sic ambitus similis ei  
fit: qui in angustiore orbem modiolo imprimitur. Vtro mo-



do uero id circumductum est: idem excisorijs scalper: in os  
se corrupto planus summam quanque testam læsit: donec inte-  
grum os relinquatur. Vix unquam nigrities integrum: caries  
per totum os perrumpit: maximeque ubi uitiata caluaria est.  
Id quoque signi specillo significatur: qui depressus in id fora-  
men / quod infra solidam sedem habet: & ob id renitens aliqd  
inuenit & madens exit. Si purum inuenit: altius descendens in-  
ter os & membranam nihil oppositum inuenit: educitur que  
ficcus / non quo non subsit aliqua vitiosa sanies. sed quoniam  
ibi ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities / quam te-  
rebra detexit. siue caries / quam specillum ostendit: os transit  
modioli quidem usus fere superuacuum est / quia latius pateat  
necesse est / quod iam alte processit. Terebra uero ea / quam  
secundo loco posui utendum / ea que ne nimis incalescat subin-  
de in aquam frigidam demittenda est. Sed tum maiore  
cura agendum est. cum iam aut simplex os dimidium per-  
foratum est: aut in duplici / superius. Illud / spatium ip-  
sum: hoc / sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habe-  
na: suspendendaq; magis sinistra manus est: & saepius attol-  
lenda: & foraminis altitudo cōsideranda: ut quādocunq; os p-  
rumpitur sentiamus: neq; pericitemur: ne mucrone cerebri mē-  
brana lædatur. Ex quo graues inflammationes cum periculo  
mortis oriuntur. Factis foraminibus eodem modo media sae-  
pe: sed multo circumspēctius excidenda sunt: ne forte angulus  
scalpri eandem membranam uiolet: donec fiat aditus: p quem  
mēbranæ custos immittatur: menyngophylacas græci uocāt.  
Lamina aenea est firma / paulum resima ab exteriori parte lae-  
uis: quæ demissa est: ut exterior pars eius cerebro propior sit.  
Subinde ei subiicitur quod scalpro discutiendum est. ac si exci-  
pit eius angulum: ultra transire non patitur: eoq; & audacius &  
tutius scalprū malleolo subinde medicus ferit: donec excisū ūdi-  
q; os eadē lamina leuetur: tolliq; sine ulla noxa cerebri pōt. V-  
bi totum os eiectum est: circum radendæ leuandæ que sunt  
oræ: & si quis scobis membranae insedit: colligendum.  
ff. i.



Vbi superiori parte sublata: inferior relicta est: non ora tantum: sed os quoque totum lauandum est: ut sine noxa postea cutis increseat. quæ aspero osse innascens protinus non sanitatem sed novos dolores mouet. Patefacto cerebro qua ratione agendum sit dicam: cum ad fracta ossa uenero. Si basis aliqua seruata est: super imponenda sunt medicamenta non pingua: quæ recentibus uulneribus accomodantur: supraque imponenda lana succida oleo atque aceto madens. Vbi tempus processit: ab ipso ore caro increscit: eaque factum manu sinu complet. Siquod etiam os adustum est: a parte sana recedit: subitque inter integram atque emotuam partem caruncula: quæ quod abscessit: expellat. eaque fere quia testa tenuis & angusta est: squama est. idest lepis agræcis nominatur. Potest etiam euenire: ut exitu neque findatur os: neque pfringatur sed summum tamen collidatur: exaspereturque. Quod ubi incidit: radi & leuari satis est. Hæc quamuis maxime fiunt in capite: tamen cæteris quoque ossibus communia sunt. ut ubicunque idem incidet: eodem remedio sit utendum. Atque cum ea fracta: fissa: forata: collisa sint: quasdam proprias in singulis generibus: quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam: initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione. Caput. IIII.

**I**gitur ubi ea pectusa: protinus requirendum est: num bilis homo uomerit: num oculi eius obæcati sint: num obmutuerit: num per nares auresue sanguis ei effuxerit: num conciderit: num sine sensu quasi dormiens iacuerit. Hec enim non nisi osse fracto eueniunt. Atque ubi inciderunt: scire licet necessariam sed difficilem curationem esse. Si uero etiam torpor accessit: si mens non constat: si neruorum uel resolutio uel distentio secuta est. uerisimile est etiam cerebri membranam esse uiolatam eoque in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est potest etiam dubitari: an os fractum sit. Et protinus considerandum est:



lapide: an ligno: an ferro: an alio telo percussum sit, & hoc ipso leni / an aspero: mediocri / an uastiore: uehementer / an leniter. Quia quo mitior ictus fuit: eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est: quam certiore id nota explorare. Ergo qua plaga est: demitti specillum oportet / neq; nimis tenue / neque acutum: ne cum in quosdam sinus naturales inciderit / opinionem fracti ossis frustra faciat: neq; nimis plenum / ne paruulæ rimulæ fallant. Vbi specillum ad os uenit si nihil nisi lenæ & lubricum occurrit: integrum id uideri potest. Siquid asperi est: utiq; qua futuræ non sint: fractum os esse testatur. Asuturis se deceptum esse Hippocrates memoria prodidit, more scilicet magnorum uirorum & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia / quia nihil habent: nihil sibi detrahunt. Magno ingenio: multaq; nihilominus habituro conuenit etiam simplex ueri erroris confessio: præcipueque in eo ministerio: quod utilitatis causa posteris traditur: nequi decipiantur eadem ratione: qua quis ante deceptus est. Sed hæc quidem alioqui memoria magni professoris uti interponeremus effecit. Potest autem futura eo nomine fallere. quæque aspera est: ut aliquis hanc esse: etiam si rima est: existimet eoloco: quo subesse hanc uerisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet. sed os aperire tutissimum est. Nam neq; utiq; certa sedes: ut supra posui. futurarum est: & potest idē / & naturaliter commissum / & ictu fissum esse: iuxta ue aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam: ubi ictus fuerit uehementior: quanuis specillo nihil inuenitur: tamen aperire commodius est. At si ne tum quidem rima manifesta est inducendum super os acamentum scriptorium est: deinde scalpro id deradendū. Nigritiem enim continet siquid fissum est. Solet etiam euenire: ut altera parte fuerit ictus: & os altera fiderit. Itaq; si grauitur aliquis percussus est / si mala indicia subsecura sunt. neq; ea pte qua cutis discussa est: rima repicitur: nō incōmodum est parte altera cōsiderare: nunquis locus mollior sit & tumeat: cumq; aperire. Siquidem ibi fissum os repicitur: nec tamen magno negotio cutis sanescit etiā si frustra desecta ē.



.OCTAVVS.

Os fractum nisi succursum est grauibz inflammationibz afficit: difficiliusq; postea tractatur. Raro / sed aliquando tamen euenit: ut os quidem totum integrum maneat: intus uero exictu uena aliqua incerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat: isq; ibi concretus magnos dolores moueat: oculos quibus obcecet. Sed fere contra id dolor est: & eo loco cute incisa pallidum os reperitur. Ideoq; id quoq; os excidendum est. quacumq; autem de causa curatio hæc necessaria est: sinodum satis cutis patefacta est: latius aperienda est: donec quicquid læsum est inconspetu sit. Inquo ipso uidendum est: nequid ex ipsa membranula quæ subcute caluariâ cingit: super os relinquatur. siquidem hæc scalpro terebrisue lacerata uehementes febres cum inflammationibz excitat. Itaq; eam commodius est ex toto abosse diduci. Plagam / si exuulnere est. talem necesse est habeamus: qualem acceperimus. si manu faciendae est: ea fere cõmodissima ē: quæ duabus trāsuerfis linteis litteræ X. figuram accipit: ut deinde a singulis procedentibus ligulis cutis subsequatur. Inter quæ si sanguis fertur: spongia subinde in aceto tincta cohibendus est. occupandusq; obiectis lina-mentis. & caput altius excitandum. Neq; id uitium ullum metum nisi inter musculos: qui tempora continent; affert. sed ibiquoq; nihil tutius fit. In omni uero fisso fractoue osse protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant: quibus id exciderent. Sed multo melius est / ante emplastra experiri: quæ caluariæ causa componuntur. Eorumq; aliquid oportet ex aceto mollitum perse. super fissum / fractumue os imponere: deinde super id aliquanto latius quam uulnus est / eodem medicamento illitum linteolum & præterea succidam lanam aceto tinctam. Tunc uulnus deligare & quotidie resoluerē: similiterq; curare usq; ad diem quintum. A sexto die etiam uapore aquæ calidæ per spongiā fouere. cætera ex eadem facere. quod si carūcula increfcere coepit: & febricula aut soluta erit aut lenior & cupiditas cibi reuerterit / satisque somni accedet in eodem medicamento erit perseverandum.



## OCTAVVS

Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum ad  
 iecto caerato exrosa facto: quo facilius carnem producat. nā  
 per se reprimendi vim habet. Hac ratione saepe rimae callo  
 quodam impletur: estque ea / ossis uelut cicatrix. & latius fra-  
 cta ossa / si qua inter se nō cohaerebant / eodem callo glutinan-  
 tur: estque a. i. quanto melius uelamentum cerebro / quam caro  
 quae exciso osse increfcit. Si uero sub prima curatione febris  
 intenditur: breuesque somni: & hīdem per somnia tumultuosi  
 sunt: ulcus madet / neque alitur: & incernicibus glandulae ori-  
 uncur: magni dolores sunt: cibique super haec fastidium incre-  
 fcit. tum demum admanum scalprumque ueniendum est. Duo  
 uero subiectu caluariae pericula sunt: ne uel findatur: uel medi-  
 um deficiat. si fissum est: possunt orae esse compressae: uel ga-  
 altera super alteram excessit: uel etiam quia uehementer rur-  
 sus se commiserunt. Ex quo euenit ut humor ad membranā  
 quidem descendat: exitum uero non habeat: ac si eam irriter  
 & graues inflammationes moueat: Vbi medium defecit / ean-  
 dem cerebri membranā os urget. interdum etiam ex fractura  
 quibusdam uelut aculeis pungentibus. His ita succurrendum  
 est: ut tamen. quam minimum ex osse dematur. Ergo si ora al-  
 teri insedit: satis est id quod eminet plano scalpro excidere.  
 quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. At si  
 orae inter se cōprimuntur: alatere eius interposito digiti spa-  
 tio / terebra foramen faciendum est: ab eoque scalper duabus  
 lineis ad rimam agendus ad similitudinem. C: litterae: sicut ue-  
 rtex eius a foramine basis ad rimas it. quod si rima longius pa-  
 tet: ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita  
 nihil latens in eo osse concanum est: abundeque exitus datur  
 intus laedentibus. Ne si fractum quidem os defecit: totum ex-  
 cidi necesse est. sed si uer totum per fractum est & ab alio extoto  
 recessit: siue circumpositae caluariae inhaeret exigua pte ab eo  
 quod naturaliter se habet scalpro diuidendū ē. deinde in eo quod  
 defecit iuxta rimā quā fecimus foramina addenda sunt:

.ff. iii.



.OCTAVVS.

Si in angusto noxa est: duo. si latius patet: tria: septaq; eorū excidenda / & cum scalper utrinq; ad rimam agendus / sic ut lunatum sinum faciat: imaq; pars eius intus ad fracturam. cornua ad os integrum spectent. Deinde si qua labent & ex facili remoueri possunt. forfice ad id facta colligenda sunt: maximeq; ea / quæ acuta membranam infestant. si id ex facili fieri non potest: subiicienda lamina est: quam custodem eius membranæ esse proposui: & super eam quicquid spinosum est & intus eminet: excidendum est: eadem lamina quicquid deorsum insedit attollendum. Hoc genus curationis efficit / ut qua parte fracta ossa tamen in hærent: solidentur. qua parte abrupta sunt: sine ullo tormento sub medicamenti tempore excidant: spatiumq; inter hæc satis illi magnum ad extrahendam saniem relinquatur: plusq; in osse pro pugnaculi cerebrum habeat / quam habiturum fuit eo exciso. His factis ea membrana acri aceto respergenda est: ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit: cohibeatur. siue intus concretus cruor remanet: discutatur. Tum idem medicamentum eodem modo: qui supra positus est: mollicum ipsi membranæ imponendum est. Cæteraq; eodem modo facienda sunt: quæ ad linteolum illitum & lanam succidam pertinent collocandusq; is loco intepido: & curandum quoti die uulnus: bis etiam æstate. quod si membrana per inflammationem intumuerit: infundenda erit rosa tepida. Si usq; eo tumebit: ut super ossa quoq; emineat: coercebit eam bene trita lenticula: uel folia uitis contrita & cum recenti uel butyro uel adipe anserino mixta. ceruixq; molliri debet ligido cærato exirino facto. At si parum pura membrana uidebitur par modus eius emplastri & mellis miscendus erit: idq; super infundendum: eiusq; continendi causa unum aut alterum linamentum iniciendum: & super linteolo cui emplastrum illitum sit / contegendum. Vbi plus pura membrana est: eadem ratione adiciendum emplastro cæratum: ut carnem producat. Quod ad abstinentiam uero & primos ulterioresq; cibos poti



nesq; pertinet. eademque / iuulneribus præcepi / seruāda sūt.  
 eo magis / quo periculosius hæc pars afficitur. Quin etiam cū  
 iam non solum substineri sed ali iis quoque apparebunt. tamē  
 erunt uitanda quæcunque mandenda sunt. item fumus & quic  
 quid excitat sternutamentum. Spem uero certam faciunt mem  
 brana mobilis ac sui coloris: caro increescens rubicunda: faci  
 lis motus maxillæ atque ceruicis. Mala signa sunt. membrana  
 immobilis nigra uel liuida uel aliter coloris corrupti: demen  
 tia: acris uomitus: neruorum uel resolutio uel distentio: caro  
 liuida: maxillarum rigor atque ceruicis. Cæteraque quæ ad so  
 mnium: cibi desiderium: febrem: puris colorem attrinent: eadem  
 quæ incæteris uulneribus uel salutaria uel mortifera sunt. ubi  
 bene res cedit: incipit ab ipsa membrana: uel si os eo loco du  
 plex est: inde quoque caro increescere. eaque id / quod inter os  
 sa uacuum est: replet. Non nunquam etiam super caluariam  
 excrescit. Quod si incidit. i spargenda squama ætis est: ut id  
 reprimat / cohibeatq; ea carni superdando quæ ad cicatricem  
 perducat. Omnibusque ea locis commode inducitur: excepta  
 frontis ea parte: quæ paulum super id est quod inter superci  
 lia est. Ibi enim uix fieri potest. ut per omnem ætatem sit ex  
 ulce ratio. quæ liteolo medicamentum habente cōtegenda sit.  
 Illa utiq; capite fracto seruāda sunt ut dōec iā ualida cicatrix  
 erit soluenda: uicentur frequens balneum: maior uini modus.

## De narium fractarum curatione.

## Caput. V.

**I**N naribus uero & os & cartilago frangi solet, & quidem  
 modo aduersa: modo alatere. si aduersa fracta sunt /  
 alterumue ex his: nares desidunt. difficulter spiritus trahitur.  
 si alatere os fractum est. is locus canus est. si cartilago. in alte  
 ram partem nares declinantur. Quicquid in cartilaginem inci  
 dit. excitandum leniter est / aut subiecto specillo: aut duobus  
 digitis utrinque compressis. Deinde in longitudinem implica



ta linamenta & molli pellicula cineta circumfutaque / intus ad  
iicienda sunt. Aut eodem modo compositum aliquid ex ari  
do penicillo. Aut grandis pinna gummi uel fabrili glutine il  
lita & molli pellicula circumdata: quæ desidere cartilagine  
non sinat. Sed si aduersa ea fracta est: æqualiter utraque na  
ris implenda est. Si alatere: crassius esse debet ab ea parte in  
quam nasus iacet: ab altera tenuius id in quod inseritur. Extrin  
secus autem circumdanda habena est mollis media illita mix  
tis inter se similia & turis fuligine. eaque ultra aures ducenda  
& fronti duobus capitibus agglutinanda est: Id enim corpo  
ri quasi gluten inhærescit & cum induruit nates commode con  
tinet. Sin quod intus inditum est lædit: sicut maxime fit ubi  
interior cartilago pfracta est: excitatae nates eadem tantum  
modo habena continendae sunt. Deinde post quatuordecim  
dies id ipsum demendum est. Resoluitur autem aqua calida:  
eaque tum is locus quotidie fouendus est. Sin os fractum est:  
id quoque digitis insuam sedem reponendum est. atque ubi ad  
uersum id ictum est. utraque naris implenda est. ubi a latere  
ea inquam os impulsus est. imponendumque caeratum & pau  
lo uehementius deligandum est. quia callus eo loco non ad sa  
nitatem tantummodo: sed etiam ad tumorem increfcit. A ter  
tio die fouendum id aqua calida est. tantoque magis quanto  
propius esses sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta:  
nihilominus extrinsecus singula insuas sedes digitis erunt co  
mpellenda: imponendaq; extrinsecus eadem habena: & super  
eam caeratum neq; ultra fascia adhibenda est: At si quod frag  
mentum undique resolutum cum caeteris non glutinabitur / in  
telligetur qdem ex humore: qui multus ex uulnere feretur: uul  
fella uero extrahetur. Finitisque inflammationibus impone  
tur aliquod medicamentum exiis quae leniter reprimunt. Pe  
ius est ubi aut ossi / aut cartilagini fractæ / cutis quoque uulnus  
accessit. Id admodum raro fit. si incidit: illa quidem nihilo  
minus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. Cuti uero



super imponendum emplastrum aliquod exiis: quæ recentibus  
vulneribus accommodata sunt. sed insuper nullo uinculo deli-  
gandum est.

De aurium fracturarum curatione: Caput. VI.

**I**N aure quoque interdum rumpitur cartilago. quod si inci-  
dit. anteq̃ pus oriatur: imponendum glutinans medica-  
mentum est. Sæpe enim suppurationem prohibet & aurem con-  
firmat. Illud & in hac & in naribus ignorari non oportet. non  
quidem cartilaginem ipsam glutinari: circa tamen carnem in-  
crescere solidariq̃ eum locum. Itaque si cum cute cartilago  
rupta est: cutis utrinque sinitur. Nunc autem de ea dico: quæ cu-  
te ita frangitur: In ea uero si iam pus natum est: aperienda al-  
tera parte cutis: & ipsa cartilago contra / lunata plaga exci-  
denda est. Deinde utendum est medicamento leniter suppri-  
mente. quale lycium est aqua dilutum / donec sanguis fluere  
desinat. Tum imponendum linteolum cum emplastro / sic ut  
pingue omne uideatur: & a parte posteriore lana mollis auri su-  
biicienda est: quæ quod est inter hanc & caput compleat. Tū  
ea leniter deliganda est: & a tertio die uapore: ut in naribus po-  
sui: fouenda. Atq̃ in his quoq̃ generibus abstinencia primi  
temporis necessaria est: donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fracturæ curatione. deq̃ quibusdam ad omnia ossa  
pertinentibus. Caput. VII.

**A**B his ad maxillam uenturus indicanda quædam puto com-  
muniter ad omnia ossa pertinentia: ne sæpius eadem dice-  
da sint. Omne igitur os modo rectum ut lignum in longitudi-  
nem finditur: modo frangitur transuersum: interdum obliquū  
atq̃ in ipsum non nunquam retusa habet capita: non nunquam  
acuta. Quod genus pessimum est. quia neq̃ facile committun-  
tur: quæ nulli retuso innituntur: & carnem uulnerant: interdū



neruum quoque aut musculum. Quin etiam aliquando plura fragmenta a fragmento fiunt. Sed in aliis quidem ossibus extoto sepe fragmentum a fragmento recedit. Maxillæ uero semper a aliqua parte etiam uexata ossa inter se coherent. Igitur in primis digitis duobus utrinque prementibus & ab ore & ab cute omnia ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde si transversa maxilla fracta est: sub qua casu fere dens super proximum dentem excedit. Vbi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes: aut si hi labant: posteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturæ super uacuum est. Cætera eadem facienda sunt. Nam linteolum duplex madens uino & oleo super iniiciendum cum eadem similia & eadem turis fuligine est. Deinde aut fascia: aut mollis habena media in longitudinem incisa: ut utrinque mentum complectatur: & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. Illud quoque ad omnia ossa perueniens dictum erit: famem primum esse necessariam: deinde adie tertio humidum cibum: sublata inflammatione paulo plenior: eumque qui carnem alat: per omne tempus uinum esse alienum: Deinde tertio die resolui debere: foverique per spongiam uapore aquæ calidæ. eademque quæ primo fuerit superdari. Idem die quinto fieri: & donec inflammatio finitur. quæ uel octauo die/ uel septimo, fere resoluitur. Ea sublata: rursus ossa esse tractanda: ut si quod fragmentum loco suo non est: reponatur. Neque id esse soluendum nisi duæ partes eius temporis intra quod quæque ossa conseruntur: transierint. Fere uero intra quartūdecimū & unū & uigesimalū diē sanescunt maxilla: maxilla: iugulum: pectus: latus: os scapularū: costæ: spinæ: roxarum: os tali: calx: manus: planta. Inter uigesimalū & trigesimalū diem crura: brachiaque. Inter septimum & uigesimalū & quadragesimalū humeri & femina. Sed in maxilla illud quoque adiiciendum est: quod humidus cibus diu assumendus est. Atque etiam cum tempus processit: in lagano similibusque aliis perseverandum donec extoto maxillam callus firmaret. Item utique primis diebus habendum silentium.



## De iuguli fracti curatione

## CAPVT. VIII.

**I**ugulum uero si transuersum fractum est: nonnunquam per se rursus recte coit, & nisi mouetur: sanari sine iunctura potest. Non nunquam uero / maxime q̄ ubi motum est: elabitur, fereq; id quod a pectore, sub id quod ab humero est: in posteriore partem inclinatur. Cuius ea ratio est: quod per se non mouetur: sed cum humeri motu consentit. Itaque eo subistente sub id humerus agitatur. Raro uero admodum in priorem partem iugulum inclinatur: adeo ut magni professores nunquam se uidisse memorie mandarint. Sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. Verum ut dissimilis uterq; casus est: sic quædam dissimilia requirit. Vbi ad scapulas iugulum tendit: simul dextra manu plane propellendus in posteriorem partem humerus est: & illud in priorem attrahendum. Vbi ad pectus conuersum est: ipsum quidem retro dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. Ac si is inferior est: non id quod a pectore est: deprimendum est: quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. Si casu superior est. id quod a pectore est implendum lana: & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt: incidi contra curis debet: ex ossibus ea, quae carnem uulnerant: præcidenda sunt. tunc retusa ossa committenda sunt. Si quod ab aliqua parte eminet: opponendum ei triplex lindeolum est in uino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt: excipienda sunt ex ferula facto canali culo: eodem que intus incerato: ne fascia diducatur. quae iugulo composito circumdanda est sæpius potius quam ualentius. Quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro uero iugulo: si id fractum est: ad alam sinistra. a sinistro: ad dextram. Rursus que sub ala sua fasciari debet. Post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est: brachium ad latus. si in partem priorem: ad ceruicem deligandum est. Supinus que homo collocandus: cætera que eadem facienda: quæ supra comprehensa sunt. Sunt uero plura ossa fere immobilia



uel dura uel cartilaginosa: quæ uel franguntur: uel forantur uel colliduntur uel finduntur. ut malæ pectus. latus: os scapularum: costæ spina costarum: os tali: calx. manus: planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra uulnus est: id suis medicamentis nutriendum est. Quo sanescente rimas quoque ossis, aut si quod ferumen est. callus implet. Si cutis integra est: & os læsum esse ex dolore colligimus: nihil aliud / quam quiescendum: imponendumque caeratum est: & leniter deligandum: donec sanitate ossis dolor finiatur.

## De costarum fracturarum curatione

## CAPVT. VIII.

**P**ropriè tamen quædam decocta dicenda sunt: quia iuxta uiscera est: grauioribus que periculis is locus expositus est. Hæc quoque igitur interdum sic finditur: ut ne summum quidem os / sed interior pars eius. quæ rara est / lædatur interdum sic ut eam totam is casus perripuerit. Si tota fracta non est: nec sanguis expuitur / nec febricula sequitur: nec quicquam suppurat / nisi admodum raro / nec dolor magnus est. tactu tamen is locus leniter indolescit / abunde est eadem quæ supra scripta sunt facere. et a media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab uno uero & uigesimo die quo utique os esse debet glutinatum id agendum. Cibis uberioribus est utendum: ut corpus quam plenissimum fiat: quo melius os uestiat. quod illo loco tenerum / adhuc iniuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis uitandus clamor sermoque: tumultus: ira: motus uehementior corporis: fumus puluis / & quicquid uel tussim uel sternutamentum mouet. Ne spiritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa perfracta est / casus asperior est. Nam & graues inflammationes & febris & suppuratio & sæpe uitæ periculum sequitur & sanguis spuitur. Ergo si uires patiuntur ab eo brachio: quod super eam costam est: sanguis mittendus est. Si non patiuntur: alius tamen sine ullo acridu



cenda est: diutiusque inedia pugnandum. Panis uero ante septimum diem non assumendus: sed una sorbitione uiuendum imponendumque ei loco caeratum ex lino factū: cui costa quoque resina adiecta sit. aut Polyarchi malagma: aut panacis ex uino & rosa & oleo: superque imponenda lana lucida mollis & dux fasciaea mediis orsae/minimeque astrictae. Multo uero magis omnia uitanda / quae supra posui: adeo ut ne spiritus quidem sapius mouendus sit. Quod si tussis infestabit: adid portio sumenda erit: uel ex tryxagine uel ex ruta uel ex herba trychade uel ex cumino & pipe. Grauioribus uero doloribus urgentibus cataplasma imponi quoque conueniet uel ex lolo uel ex hordeo: cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdum supiacebit. Noctu uero idem aut caeratum. aut malagma: aut panis: quia potest cataplasma decidere. Ergo quoti die quoque resoluetur: donec iam caerato aut malagmate possimus esse contenti. & decem quidem diebus extenuabitur fame corpus. ab undecimo uero alii incipit. Ideoque etiam laxiorque primo fascia circūligabitur: fereque ea curatio ad quadragesimum diem pueniet. quae si modus erit suppurationis: plus malagma quam caeratum addigerendum perficiet. Si suppuratio uicerit: neque per quae superscripta sunt discuti potuerit: omnis mora uitanda erit: ne os infra uicietur. sed qua parte maxime tumebit: demittendum erit candens ferramentum. donec ad pus pueniat: idque effundendum. Si nunc caput se ostendit: ubi maxime pus subit: sic intelligimus. Creta cimolia totum locum illinimus: et siccare patiemur: Quo loco maxime humor in a seuerant: ibi pus proximum erit: eaque uri debet. Si latius aliquid abscedet: duobus aut tribus locis erit perforandum: demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo. quod summum lino sit deminutum: ut facile educatur. Reliqua eadem: quae in caeteris adustis facienda sunt. Vbi purum erit ulcus: alii corpus debet: ne tabes perniciose futura id malum subsequatur. Non nunquam etiam leuius ipso osse affecto & inter initia neglecto: non pus: sed humor quidam muccis similis



intus coit : mollescit que contra cutis: in qua simili ulatione utendum est.

De spine curatione

**I**N spina quoque est quod proprie notemus. Nam si id quod exvertebra excedit aliquo modo fractum est: locus quidem concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur. quia necesse est ea fragmenta spinosa esse Quo fit ut homo interiorem partem subinde nitatur. Haec noscendae rei causa sunt. Medicamentis uero .iisdem opusest : quae plurima parte huius capitis exposita sunt .

De humerorum: brachiorum: femorum: crurum . digitorumque fractorum uel euulsorum communibus curationibus .

CAPVI .X.

**S**imiles rursus ex magna parte casus curationes que sunt humeris & femoribus. Communia etiam quaedam humeris: brachiis: femoribus: cruribus: digitis. Siquidem ea minime periculose media franguntur. Quo propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est: eo peior est. Nam & maiores dolores affert: & difficilior curatur. Ea maxime tolerabilis est simplex: transuersa. Peior ubi fragmenta: atque ubi obliqua. Pellimum ubi eadem acuta. Non nunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo saepius excidunt: aliud que super aliud effertur. Id que ante omnia considerari debet. & sunt notae certae. Si suis sedibus mota resimam: punctio nisque sensum representant: tactu inequalia sunt. Si uero non aduersa: sed obliqua iunguntur. quod fit ubi loco suo non sunt membrum id altero latere brevius est: & musculi eius tument. Ergo si hoc depressum est: protinus id membrum oportet extendere. Nam nerui/musculi que intenti possa contrahuntur neque in suum locum ueniunt: nisi illos per uim aliquis intendit.



Rursus si primis diebus id obmissum est. inflammatio oritur Sub qua & difficile & periculose his nervis adhibetur. Nam distentio nervorum uel cancer sequitur: uel ulcerum / ut diutissime alatur pus. Itaque si ante reposita ossa non sunt: postea ponenda sunt. Intendere autem digitum uel aliud quocumque membrum: si adhuc tenerum est etiam unus homo potest: cum alteram partem dextra: alteram sinistra prehendat. Valentius membrum duobus eget / qui in diversa contendant. Si firmiores nervi sunt: ut in uiris robustis / maxime que eorum feminibus & cruribus euenit: habenis quoque uel linteis fasciis utriusque capita articulorum deligenda: & per plures indiuersa ducenda sunt. Vbi paulo longius quam naturaliter esse debet membrum uis fecit: tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: indicium que ossi repositi est dolor sublatus. Et membrum alteri parti aequatum inuoluendum duplicibus / triplicis panni & in uino & oleo tinctis: quos linteos esse commodius est. fere uero his / sex opus est. Prima breuissima adhibenda: quae circa fracturam ter uoluta sursum uersum feratur. & quasi in coctea serpat: satis que est eam ter hoc quoque modo circuire. Altera dimidio longiore. ea que qua parte os eminet: ab ea si totum aequale est / unde libet super fracturam debet incipere priori aduersa: deorsum que tendere. atque iterum de fractura reuersa: in superiore parte ultra priorem fasciam desinere. Super has iniiciendum latiore linteo caeratum est: quod eas contineat. ac si qua parte os eminet / triplex ea pannos obiciendus eodem uino & oleo madens. Haec tertia fascia comprehendenda sunt / quarta que: sic ut semper insequens priori aduersa sit: & tertia tantum inferiore parte: tres in superiore faciant. quia satius est saepius circuire quam astringi. Siquidem id quod adstrictum est. alienatur & cancro opportunum est. articulum autem quam minime uincire opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est: necesse est.



## LIBER.

Deligatum uero membrum in diem tertium continendum est. Ea quoque iunctura talis esse debet: ut primo die nihil offenderit: non tamen lapsa uisa sit: secundo laxior: tertio iam pene resoluta. Ergo tum rursus id membrum deligandum: adicienda quoque prioribus quinta fascia est: iterumque quinto die resoluendum est: & sexta fasciis inuoluendum. Sic ut tertia & quinta infra: cetera supra finiantur. Quotienscunque autem soluitur membrum: calida aqua fouendum est. sed si iuxta articulum fractura est: diu instillandum uicium est, exigua parte olei adiecta: eademque omnia facienda donec adeo inflammatio soluitur: uel leuius quoque quam ex consuetudine id membrum fiat. Quod si septimus dies non dedit: certe nonus exhibet. Tum facillime ossa tractantur. Rursus ergo si parum commissa sunt. committi debent. si qua fragmenta eminent: in suas sedes reponenda sunt. Deinde eodem modo membrum deligandum: ferulae quoque super accomodandae sunt: quae fissae circumpositae quoque ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinata: ab ea latior: ualentior quoque ferula imponenda est. easque omnes circa articulum esse oportet resinas: ne hunc laedant: nec ultra astringi: quam ut ossa contineant: & cum spatio laxentur. tertio quoque die paulum habenis suis coartat: ac si nulla prurigo: nullus dolor est sic manere donec duae partes eius temporis. quod quoque os conseruet: compleantur: postea leuius aqua calida fouere quia primo digerit materiam opus est: tum euocari. ergo caerato quoque liquido id pleniter est unguendum: perficiendaque summa cutis est: laxiusque id deligandum est. Tertio quoque die soluendum sic: ut remota calida aqua: cetera eadem fiant. Tantummodo singulae fasciae quotiens resolute fuerint: subtrahantur.

### De fracti humeri curatione

**H**aec communia sunt. Illa propria. Siquidem humerus fractus non sic. ut membrum aliud intenditur. Se



homo collocatur alto sedili . medicus autem humiliore aduersus . Vna fascia brachium amplexa ex ceruice ipsius / qui laesus est / id sustineat . Altera ab altera parte super caput data / ibi accipit nodum . Tertia iuncto imo humero deorsum demittitur ibi quoque capitibus eius inter se iunctis . Deinde ab occipitio ipsius minister sub ea fascia / quam secundo loco posui : correpto si dexter humerus ducendus est : dextro : si sinister : sinistro brachio demissum inter femina eius : qui curatur baculum tenet . medicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi planam iniicit dextram / si sinister : sinistram / si dexter humerus sumatur . simulque alteram fasciam minister attollit alteram premit medicus . quo fit ut leniter humerus extendatur . Fasciis uero : si medium aut imum os fractum est : breuioribus opus est : si summum : longioribus . ut ab eo sub altera quoque ala perpectus & scapulas porrigantur . Protinus uero brachium cum deligatur / sic inclinandum est : id quod afficit ut ante fascias quoque sic figurandum sit . ne postea suspensum aliter : aliter cum deligabatur : humerum inclinet . Brachio que suspeso ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est . Perque fit : ut minime moueatur . ideo que ossa sic se habent / ut aliquis composuit . Cum ad ferulas uentum est : extrinsecus esse earum longissimae debent : a lacerto breuiiores : sed sub ala breuissimae . Saepius que eae resoluendae sunt / ubi in uicinia cubiti humerus fractus est : ne ibi nerui rigescant : & inutile brachium efficiant . Quotiens solutae sunt / fractura manu continenda : cubitus aqua calida fouendus : & molli caerato perfriandus : ferulae que uel omnino non imponendae contraementia cubiti : uel aliquanto breuiiores sunt .

De brachii fracti curatione .

**A**T si brachium fractum est : in primis considerandum est / alterum os : an utrumque comminutum sit : nō quo alia in eiusmodi casu curatio admoouenda : sed primum ut ualentius extendatur / si utrumque os fractum est : quia necesse est

.gg. iii.



minus nervos contrahi altero osse integro: eosque intendente. Deinde ut curiosius omnia incontinentis ossibus fiant. si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum est: plus opis in eo quam in fasciis / ferulis que est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maxime brachii naturalis habitus sit. idque involutum mitella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio per angustis capitibus collo iniicitur. atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Id que paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet. Quod si ex summo cubito id factum sit glutinare id uniendo alienum est. Fit enim brachium immobile. ac si nihil aliud quam dolori occursum est: idem qui fuit eius usus est.

**I** De crurum femorumque fractorum curatione.  
 In crure aequae ad rem pertinet alterum saltem os integrum manere. Commune vero ei femorique est. Quod ubi deligatum est. in canalem coniiciendum est. Is canalis & inferiori parte foramina habet: per quae si quis humor excesserit / descendat: & a planta moram: quae simul & sustineat eam & delabi non patiat: & a lateribus cava: per quae loris datis mora quae / crus femur que ut collocatum est detineat. Esse etiam is debet a planta si crus fractum est: circa poplicem. si femur: usque ad coxam. si iuxta superius caput femoris: sic ut ipsa quoque ei coxa sit. Neque tamen ignorari oportet si femur fractum est / fieri brevius: quia nunquam in antiquum statum reuertitur summis que digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamen femori debilitas est: ubi fortunae negligentia quoque accessit.

**D** De fracti digiti curatione.  
 Digitum satis est ad unum furculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros brachia crura femina digitos que contractos pertinentia.  
**H** Is proprie ad singula membra pertinentibus / rursus illa communia sunt / primis diebus fames: deinde tum cum iam



increfcere callum oportet : liberalius alimentum . longa a uino  
abftinentia . fomentum aquae calidae / dum inflammatio eft :  
liberale . cum ea defit : modicum . Tum etiam longior u'teriori  
bus & liquido caerato membris : et mollis tamen unctio . Neq;  
protinus exercendum id membrum . fed ad antiquos ufus redu  
cendum eft . Grauius aliquanto eft : cum offis fracturae carnis  
quoque uulnus acceffit : maximeque fi id mufculi femoris aut  
humeri fenferunt . Nam & inflammationes multo grauiores &  
promptiores cancos habent . Ac femur quidem / fi offa inter  
fe cefferunt / fere praecidi neceffe eft . Humerus uero quoque in  
periculum uenit : fi facilius conferuatur . Quibus periculis etiā  
magis id expositum : quod iuxta ipfos articulos idum eft . Cur  
iofius igitur agendum eft : & mufculus quidem per mediam pla  
gam tranfuerfus praecidendus . Sanguis uero / fi parum fluxit .  
mittendus : corpus inedia extenuandum . ac reliqua quidem  
membra lentius intendenda . & lenius iniis offa in fuam fedem  
reponenda funt . His uero neque intendi neruos : neque offa  
tractari fatis expedit . Ipsi que homini permittendum eft : ut  
sic ea collocata habeat / quemadmodum minime laedunt . Om  
nibus autem his uulneribus imponendum primo linamentum  
eft uino madens . cui rosae paulum admodum adiectum fit . cæ  
tera eadem deliganda fasciis funt aliquanto quam uulnus la  
tioribus : laxius fcilicet , quam fi ea plaga nō efferet . quanto faci  
lius & alienari & occupari cancro uulnus potest numero poti  
us fasciarum id agendum eft : ut laxae quoque æque contineāt .  
Quod in femore humero que fic fiet : fi offa forte recte con  
currerint . fin aliter fe habebunt : eatenus circundari fasciā de  
bebit : ut impositum medicamentum contineat . Cætera eadem  
quae fupra fcripsi / facienda fūt : praeterquam quod neque fe  
rulis neque canalibus : inter quae uulnus fanefcere non potest .  
Sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis opus eft : inge  
rendumque fubinde ineas eft calidum oleum & uinum magis  
que in primo / fame utendo uini calida aqua fouendum : fri  
gusq; omni ratione uitandum & tranfeundum ad medicamen



## LIBER

ra / quæ puri mouendo sunt: maior q̄ uulneri q̄ ossi cura agen-  
 da. Ergo quotidie soluendum / nutriendum quæ est. Inrerquæ  
 siquod paruum fragmentum ossis eminet: id si retusum est /  
 intuam sedem dandum. si acutum / ante acumen eius longi-  
 us est præcidendum: si breuius limandum: & utrinque scalpro  
 limandum. tum ipsum recondendum est. ac si id manus facere  
 non potest: uulsella / quali fabri utuntur: iniicienda est / recte  
 se habendi capiti ab ea parte / qua lima est: ut ea parte / qua  
 cibra est eminens os intuam sedem compellat. Si id maius  
 est: membranulis que cinguntur: sinere oportet ea submedica-  
 mentis resolui: idq; os / ubi iam nudatū est abscidere / quod  
 maturius scilicet faciendum est. potest que ea ratione & os coi-  
 re et uulnus sanescere. Illud suo tempore: hoc pro ut se habet.  
 Nonnunquam etiam in magno uulnere euenit / ut fragmenta  
 quaedam uelut emoriantur neque cum cæteris coeant. Quod  
 hic quoque ex modo fluentis humoris colligitur. Quo magis  
 necessarium est sæpius ulcus resolvere atq; nutrire. Sequitur  
 uero ut id os per se post aliquot dies excidat. cum tam misera  
 antea cōditio uulneris sit. tamen id interdum maius diutiusq;  
 facies. Sæpe enim integra cutis / osse abrumpitur: protinus q;  
 prurigo et dolor oritur. Quæ soluere / si accidit: maturius o-  
 portet: & fouere aqua per aestatem frigida: per hyemem egeli-  
 da deinde cæratum myrtæū imponere. Interdum fractura qui-  
 busdam / uelut aculeis carnem uexat: quo aprurigine & puncti-  
 onibus cognito: aperire id melius: eos que aculeos præcidere  
 necesse habet. Reliqua uero curatio inutroque hoc casu eadem  
 est: quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. Cibi hic  
 quoque utendum est carnem producentibus. si breuius adhuc  
 membrum est: & ossa loco suo non sunt / paxillus tenuis q̄ le-  
 uissimi generis inter ea demitti debet / sic ut capite paulum su-  
 pra ulcus emineat: isq; quotidie plenior adigendus est / donec  
 par id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouendus: uul-  
 nus sanandum est: cicatrix inducta fouenda frigida aqua est  
 in qua myrtus: hedera: aliae ue similes uerbenæ sint: allinendū



que medicamentum est: quod siccet: & magis etiam hic quiescendum donec id membrum confirmetur. si quando uero ossa non confrebuerunt: quae saepe soluta: saepe mota sunt: inaperto deinde curatio est. possunt enim coire. si uetustas occupauit: membrum extendendum est: ut aliquod laedatur. Ossa inter se manu diuidenda, ut concurrendo exaperentur: ut siquid pingue est eradatur: totumque id quasi recens fiat. Magna tamen cura habita, ne nerui musculi uel laedantur. Tum uino fouendum est: in quo malicorum decoctum sit: imponendumque id ipsum oui albo mixtum. Tercio die resoluendum fouendumque aqua in qua uerbenae de quibus supra dixi decoctae sunt. Quinto die idem faciendum: feruleque circundandae. Caetera & ante & post eadem facienda, quae suprascripsi. sole tamen interdum transuersa inter se ossa conferuere. eoque & breuius membrum & indecorum fit: si capita acutiora sunt: assidue punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & dirigi debent. In hoc modo fit. Calda aqua multa membrum id fouetur & ex exarato liquido perfricatur intunditurque & inter haec medicus pertractans ossa: ut adhuc tenero callo manibus ea diducit: compellitque id quod eminet in suam sedem & si parum ualuit ab ea parte in qua os se inclinat inuolutam lanam regulam obicit. Atque ita deligando assuescere iterum uetustae sedi cogit. Nonnunquam autem recte quidem ossa ceperunt superincreuit uero nimius callus ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit diu leuiterque id membrum perfricandum est ex oleo & sale & nitro multumque aqua calida salsa fouendum: & imponendum malagma quod digerat: astrictiusque alligandum oleribusque et praeterea uomitu utendum. Perque et cum carne callus quoque exteruatur. Confertur aliquid de sinapi quod cum ficu in alterum par membrum impositum. donec paulum erodat roque euocet materiam. Vbi is tumor extenuatus est. rursus ad ordinem uitae reuertendum est.



**A**C de fractis quidem ossibus haecenus dictum sit. Mouen-  
 tur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo quae  
 iuncta sunt inter se deiscunt: ut cum latum scapularum os ab  
 humero recedit: & in brachio radius a cubito: & in cute cibi  
 a artura: interdum a saltu, calcis os a tulo. quod raro tamen  
 fit. Modo articuli suis sedibus excidunt: ante de prioribus di-  
 cam. Quorum ubi aliquid iacidit: protinus is locus cauus est  
 depressus: quae digitus sinum inuenit. Deinde grauis inflamma-  
 tio oritur: atque in talis praecipua, siquidem febres quoque &  
 cancri & neruorum, uel distentiones uel rigores: qui caput sca-  
 pulis annectunt: mouere consuevit. Quorum uitandorum cau-  
 sa facienda eadem sunt: quae in ossibus mollibus lesis a iquid  
 ubi incidit protinus iis locis proposita sunt. ut dolor tumor  
 quae per eam tollantur. Nam diducta ossa nunquam rursus in-  
 ter se iunguntur. et ut aliquid decoris eo loco sit nihil usus  
 admittitur. Maxilla uero et uertebra omnesque articuli cum ua-  
 lidis neruis comprehendantur: excidunt aut uel expulsi: aut a  
 liquo casu neruis uel ruptis uel infirmatis faciliusque in pueris  
 et adolescentulis: quam in robustioribus. hiq; elabuntur in prio-  
 rem: & in exteriorem partem: quidam omnibus morbis: quidam  
 certis. Sunt quae quaedam communia omnium signa. quaedam  
 propria sunt cuiusque siquidem semper ea parte tumor est: in  
 qua os prorumpit ea sinus: a qua recessit. et haec quidem in  
 omnibus deprehenduntur: alia uero si in singulis. Quae simul ac  
 quae de quoque dicam proponenda erunt. Sed ut excidere om-  
 nes articuli non possunt: sic non omnes reponuntur. Caput e-  
 nim non nunquam compellitur: neque in spina: uertebra. neque  
 ea maxilla quae utraque pars prolapsa antequam reponeretur  
 inflammationem mouit. Rursus qui neruorum uicio prolapsi  
 sunt: compulsi quoque in suas sedes: iterum excidunt. At qui-  
 bus in puericia exciderunt: neque reposita sunt: minusquam cæ-  
 teri crescunt. Omniumque quae loco suo non sunt: caro ea in-  
 crescit: magisque in proximo membro: quam in ulteriore. Ve-  
 puta si humerus loco suo non est: maior in eo ipso fit: quam in



brachio: maior in hoc / quam in manus acie: Tum pro sedibus  
& pro casibus / qui inciderunt: aut maior aut minor usus eius  
membrum relinquitur. quoque in eo plus usus superest: eo minus  
id extenuatur. Quicquid autem loco suo motum est: ante in  
flammationem reponendum est. Si illa occupauit: dum cong  
escat. Tunc laceflendum est. Vbi finita est: tentandum est in  
iis membris: quae id patiuntur. Multum autem eo confert &  
corporis & neruorum habitus. Nam si corpus tenue: si humidū  
est / si nerui infirmi: expeditius os reponitur. Sed & primo fa  
cilius excidit: & postea minus fideliter continetur. Quae cō  
eraria his sunt: melius continent. Sed id quod expulsū est:  
difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem  
leuare / super sucida lana ex aceto imposita. A cibo si ualentio  
ris articuli casus est triduo: interdum etiam quinque diebus ab  
stinere / debere: Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curi  
osius quae haec facere iis ossibus motis: quae ualidis plenis quae  
musculis continentur. si uero etiam febris accessit: multo ma  
gis deinde ex die quinto fouere aqua calida: remota quae lana  
caeratum imponere ex cyprino factum: nitro quoque adiecto  
donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infractionem ei mem  
bro adhibere. cibis uti bonis: uti uino modice: iam quae ad usus  
quoque suos id membrum promouere. quia motus ut in dolo  
re pestifer: sic alias saluberrimus corpori est. Hæc communia  
sunt: nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione.

CAPVT. XII.

**M** Axilla in priorem partem propellitur: sed modo altera  
parte: modo utraque. Si alteram in contrariam partem:  
modo utraque ipsa mentum quae inclinatur: dentes paribus nō  
respondent. sed sub iis qui secant canini sunt. At si utraque:  
totum mentum in exteriorem partem promouetur. inferioresque  
dentes longius quam superiores excedunt: intenti quae super



musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est sic ut minister a posteriore parte caput eius continereat. uel sic ut iuxta parietem is sedeat: subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro. eo que caput per ministrum urgeatur quo sit immobilius. Tū medici digiti pollices linteolis uel fasciis ne dilabantur inuoluti in os eius cōiiciendi: caeteri extrinsecus admouendi sunt. Vbi uehementer maxilla apprehensa est: si una parte procidit: concutiendum mentum & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda & os eius comprimendum est sic ut omnia pene uno momento fiant. Si in utraque parte prolapsa est eodem omnia facienda. sed æqualiter retro maxilla agenda est. Reposito osse si cum dolore oculorum & cervicis ille casus incidit: ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus uero quorum ossa mota sunt: primo liquidioribus cibis conueniat: tum his præcipue: adeo ut sermo quoque frequenti motu oris per nexuos lædat.

De capite luxato.

CAPVT. XIII.

**C** Apud duobus processibus induos sinus summae uertebrae demissis super ceruicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt: quo fit ut nervus sub occipicio extendatur: mentum pectori agglutinetur: neque bibere is: neque loqui possit: interdum si ne uoluntate semen emittat. Quibus celerrime mors superuenit. Ponendum autem hoc esse credidi: non quo curatio eius rei ulla sit: sed ut res inditiis cognosceretur: & non putaret sibi medicum defuisse signi sic aliquem perdidissent.

De spina luxata

CAPVT. XIII.

**I**dem casus manet eos: quorum in spina uertebrae exciderunt. Id enim non potest fieri: nisi ex medulla quae per



## OCTAVVS

mediam: & duabus membranulis/quae per duos a lateribus processus feruntur: et nervis/qui continent ruptis. Excidunt autem et in posteriorem partem et in priorem et supra septum transversum et infra. In utranque partem exciderit / a posteriore parte vel cumor / vel sinus oritur. Si super septum id incidit: manus resolvuntur: vomitus / aut distentio nervorum insequitur. Spiritus difficulter movetur: dolor ut guet: et aures obtusae sunt. Si sub septo: femina resolvuntur: urina supprimitur: interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus ut tardius quam ex capitis: sic tamen intra triduum homo moritur. Nam quod Hippocrates dixit vertebra in exteriorem partem prolapsa: primum hominem collocandum esse & extendendum: tum calce aliquem super ipsum debere consistere: id intus impellere: in iis accipiendum est: quae paulum excesserunt: non iniis/quae toto loco mutatae sunt. Non nunquam. n. nervorum imbecillitas efficit: ut quamvis non exciderit vertebra: paulum tamen in priorem partem promineat. Id non iungat. sed ab interiore parte non contingit quidem posse. ab exteriore si propulsum est/plerumque iterum redit: nisi quod admodum rarum est: nisi nervis restituta est.

De humero luxato.

## CAPVT. XV

**H**umerus autem modo in alam excidit: modo in partem priorem. Si in alam delapsus est & iunctus cubitus recedit ab latere: rursus iuxta eiusdem partis autem cum humero porrigi non potest. Longius quae altero id brachium est. Si in priorem partem summum quidem brachium extenditur / minus tamen quam naturaliter: difficilius quae in priorem partem quam in posteriorem cubitus porrigitur. Igitur si in alam humerus excidit: & vel puerile adhuc est corpus vel molle certe et imbecillibus nervis intentum est: satis est collocare id in sedili et ex duobus ministris alteri imperare: ut caput late scapularum ossibus leniter reducat. alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem renum sub ala eius coire simulque et ille os et altera manu brachium

hb. ii.



## LIBER

eius ad latus impellere. At si uisius corpus: nerui ue' robustiores sunt: necessaria est spathula lignea: & quæ crassitudinem duorum digitorum habet: longitudine ab ala ad digitos peruenit. In qua summa capitulum est rotundum & leniter cauum: ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt inter se spatio distributibus: in quæ ea lora mollia coiciuntur. Eaq; spatha fascia inuoluta quo minus tactu lædat ad alam a brachio dirigitur: sicut caput eius summae alae subiiciatur. Deinde loris suis ad brachium deligatur: uno loco paulum infra humeri caput: altero paulum supra cubitum: tertio supra manum. Cui rei protinus interualla tunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum sup' scalæ gallinariæ gradum traicitur ita alte ut consistere homo ipse non possit, simul quæ in alteram partem corpus demittitur: in alteram brachium intenditur. Eoque fit ut capite ligni caput humeri impulsu in suam sedem modo cum sono modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est uno Hippocrate lecto: sed non alia magis usu comprobata est. At si in priorem partem humerus excidit supinus homo collocandus est: fasciaque aut habena media a la circundanda est: capitq; eius post caput hominis ministro tradenda: brachium alteri: præcipiendumque ut ille habenam: hic brachium extendat. Deinde medicus caput quidem hominis sinistra debet repellere: dextra uero cubitum cum humero attollere: & os in suam sedem compellere. Faciliusque id in hoc casu quam in priore reuertitur. Reposito humero lana a lae subiicienda est. Si interiore parte os fuit: ut ei opponatur. Si in priore parte: ut tamen commodius deligatur. Tum fascia primum sub ala obuoluta caput eius debet comprehendere: deinde profectus ad alteram alam: ab ea quæ ad scapulas: rursusque ad eiusdem humeri caput tendere. Saepiusque ad eandem rationem circumagi: donec bene id teneat. Vinctus hac ratione humerus commodius continetur. Si adductus ad latus sit, ad id quoque fascia deligatur.



**I**N cubito autem tria coire: ossa humeri: & radii: & cubiti ipsius ex iis quae prima parte huius uoluminis posita sunt: intelligi potuit. Sed cubitus qui innexus humero est: ab hoc excidit. radius qui adiunctus est. interdum trahitur: interdum subsistit. In omnes uero quattuor partes excidere cubitus potest. sed si in priorem prolapsus est: extensum brachium est: neque recuruatur. Si in posteriorem: brachium curuum est: neque extenditur. breuiusque altero est. Interdum febrem uomitumque bilis mouet. Si in exteriorem interiorem uel brachium porrectum est: sed paulum in eam partem a qua os recessit recuruatum: quicquid incidit: reponendi ratio una est. Neque in cubito tantum est: sed in omnibus quoque membris longis: quae per articulum longa testa iunguntur. Verumque membrum in diuersas partes extendere donec spatium inter ossa liberum sit. Tam id os quod excidit. ab ea parte inquam plapsum est in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt: prout nerui ualent aut ossa huc illuc uel sederunt. Ac modo manibus solis utendum est: modo quaedam alia adhibenda. ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est: extendi per duas manus: interdum etiam habenis iniectis satis est. Deinde rotundum aliquid a lateris parte ponendum est. & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere. quae fracto cubito supra posita est: & tum ossa reponere. Reliqua curatione eadem est quae in omnibus. Celerius tantum & saepius id resoluendum est: multoque magis aqua calida fouendum: diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius quam in ullo alio articulo: siue extra remansit: siue intus reuertit: callus circumdatur. isque si per quietem increuit: flexus illius postea prohibet.



**M**anus quoque in omnis quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit porrigi digiti non possunt. Si in priorem non inclinantur. Si in alterutrum latus: manus incontrarium. id est aut ad pollicem: aut ad minimum digitum conuertitur. Reponi non difficillime potest. Super durum locum & renitentem ex altera parte intendi manus: ex altera brachium debet: sic ut pna sit. Si in posteriorem parte os excidit: supina. Si in priorem si in interiorem exteriorum uel in latus. Vbi satisneruididucti sunt. Si in alterutrum latus percidit manus brachium incontrarium repellendum est. At his / quae in priorem / posteriorem uel partem prolapsa sunt: superimponendum durum aliquid. id quae supra prominens os manu urguendum est: per quod uis adiecta facilius id in suam sedem compellit.

## De palma

## CAPVT. XVIII.

**I**n palma quoque interdum suis sedibus promouentur: modo in priorem partem: modo in posteriorem. In latus. non moueri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est: quod omnium commune est. Tumor ab ea parte: in quam os uenit: sinus ab ea aqua recessit. Sed sine intentione digito / tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

## De digitis.

## CAPVT. XVIII.

**A**t in digitis totidem fere casus / eademque signa sunt. quae in manibus. Sed in his exstendendis non aequae uis opus est: cum & articuli breuiores & nerui minus ualidi sint. Super mensam tantummodo intendi debent / qui uel in priorem uel in posteriorem partem exciderunt. cum iam palma compelli: atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

## De femore

## CAPVT. XX



**C**um de his dixerim: de iis quoque quae in cruribus sunt /  
videri possum dixisse. Siquidem etiam in hoc casu quae  
dam similitudo est femori & humero: & tibiae & cubito: pedi  
& manui. Quaedam tamen separatim quoque de his dicenda  
sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur. saepissime  
in interiorem: deinde in exteriorem: raro admodum in prio  
rem / aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsum est  
crus longius altero & uastius est. Extra enim pes ultimus spec  
tat. si in exteriorem: breuius: rarumque fit & intus inclinatur.  
Calx ingressu terram non contingit: sed planta ima. melius  
que id crus superius corpus / quam in priore casu fert: minus  
que baculo eget. si in priorem crus extensum est: implicari que  
non potest. alteri cruri ad calcem par est. sed ima planta mi  
nus in priorem partem inclinatur: dolor que in hoc casu prae  
cipuus est: & maxime urina supprimitur. Vbi cum dolore infla  
matio quieuit: commode ingrediuntur totusque eorum pes est  
Sed & si in posteriorem extendi non potest crus: breuiusque  
est: ubi constitit: calx quoque terram non contingit. Magnum  
autem femori periculum est: ne uel difficulter reponatur: uel  
repositum rursus excidat. Quidam iterum semper excidere  
contendunt. sed Hippocrates & Diocles & Philotimus & Ni  
leus & Heraclides tarentinus / clari admodum auctores / ex to  
to se restituisse memoriae prodiderunt. Neque tot genera ma  
chinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur Hi  
pocrates: Andreas: Nileus: Nymphodorus: Protarchus: He  
raclides repperissent: si id frustra esset. Sed ut haec falsa opi  
nio est: sic illud uerum est. Cum ibi ualentissimi nerui / muscu  
li que sint: si suum robur habent uix admittere: si non habent  
postea non contineri. Tentandum igitur est: & si tenerius mem  
brum est: satis est habenam alteram ab inguine: alteram a ge  
nu intendi. Si ualidius: melius adducent / qui easdem habenas  
ad ualida bacula deligarint: tumque eorum fustium imas par  
tes oppositae morae obiecerint: superioresque ad se utraq; ma  
nu traxerint. Etiam num ualentius intenditur membrum sup



scannum: cui ab utraque parte axes sunt: ad quos habenae illae deligantur. qui ut intorcularibus conuersi rumpere quoque si quis perseuerauerit / non solum extendere neruos & musculos possit. collocandus aut homo super id scannum est / aut pronus aut supinus / aut in latus: sic ut semper ea pars superior sit: in quam os prolapsus est: ea etiam inferior: a qua recessit. Neruis extentis si in priorem os uenit: rotundum aliquid super inguen ponendum: subitoque super id genu adducendum est eodem modo eademque de causa: qua idem in brachio fit. priusque si complicari femur potest: intus est. In caeteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt: medicus debet id quod eminet retro cogere, miniliter contra inde coxam propellere. Posito osse nihil aliud noui curatio requirit: quam ut diutius is in lecto detineatur: ne si motum adhuc neruis laxioribus femur fuerit: rursus erumpat.

De genu.

CAPVT. XXI.

**G**enu uero & in exteriorem & interiorem & posteriorem partem excidere notissimum est. in priorem non prolabi plerique scripserunt. Potestque id uero proximum esse cum inde opposita patella ipsa quoque caput tibiae contineat. Meges tamen eum cui in priorem partem excidisset: a se curatum esse memoriae prodidit. In his casibus intendi nerui rationibus iisdem: quas infemore rettuli possunt. Et id quidem quod in posteriorem partem excidit eodem modo rotundo aliquo super popliteum imposito: adductoque eo crure reconditur. Caetera uero manibus simul tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De talo:

CAPVT. XXII.

**T**alus in omnes partes prolabitur. Vbi in interiorem partem excidit: ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. Vbi huic contrarius talus, contrarium etiam signum ex



eat. Si in priorem partem erumpit a posteriore: latus nervus durus & insanus est: minusq; his opus est. si in posteriorem calx pene conditur: plaga maior fit. Reponitur autem is quoque per manus / prius in diuersa pede & crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est: ne is talus qui totum corpus sustinet parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat. rursus que prorumpat. Calciamenti quoque humilioribus primo tempore utendum: ne iunctura talum ipsum laedat.

De planta

CAPVT. XXIII

**P**lantae ossa iisdem modis quibus in manu prodeunt: iis iisdemque conduntur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere: ne cum media plantam in unum quod eius iunctura necesse est: liber talus in medio relictus materiam plenioris recipiat: ideoque suppuret.

De digitis.

CAPVT. XXIII.


**I**n digitis nihil ultra fieri debet: quam quod in iis: qui sunt in manu positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri. Haec facienda sunt in iis casibus. ubi sine uulnere ossa exciderunt. Hic quoque & ingens periculum est: & eo grauius: quo maius membrum est. quo uel ualidioribus nervis / aut musculis continetur. Ideoque humeris, femoribus que metus mortis est. ac si reposita ossa sunt: spes nulla est. Non repositis tamen: non nullum periculum est. Eoque maior in utroque timor est: quo propius uulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse, praeter digitos & plantas & manus dixit. atque in his quoque diligenter esse agendum: ne praecipitarent. Quidam brachia quoque & crura reposuerunt. Et ne cancri / distentiones que nervorum orientur: sub quibus in eiusmodi casu fie




ret mors matura: sanguinem ex brachio misernat. Verum ne  
 digitus quidem: in quo minimum ut malum / sic etiam piculum  
 est: reponi debet ante inflammationem: aut postea cum iam ue  
 tas res est. Si quoque reposito osse / nervi distenduntur: rur  
 sus id prius expellendum est. Omne autem membrum: quod  
 cum ulnere loco motum / neq; repositum est: sic iacere conue  
 nit ut maxime cubantem iuuat: tantum ne moueatur: ne ue de  
 pendeat. In omniq; tali morbo magnum ex longa fame præ  
 sidium est. Deinde ex curatione eadem quae propo sita est: u  
 bi ossibus fractis uulnus accessit. Si nudum os eminet: impedi  
 mento semper futurum est. Id quod excedit: abscidendum  
 est. Imponendaque super arida linamenta sunt et medicamen  
 ta non pinguiâ: donec quae sola esse in eiusmodi re sanitas po  
 test: ueniat. Nam et debilitas sequitur: et tenuis cicatrix inda  
 citur. quae necesse est / facile noxae postea pateat.

CORNELII CELSI DE MEDICI  
 NA LIBER FINIT FLOREN  
 TIAE A NICOLAO IM  
 PRESSVS ANNO  
 SALVTIS M  
 CCCC L  
 XXV  
 III











cf. 2.

100

C394 me  
1478

#19762061



114 CELSUS. De Medicina. (Fol. 10a) Corneli Celsi De  
Medicina Liber Incipit. (Colophon) Corneli Celsi De  
Medicina Liber Finit Florentiae A Nicolao Impressus Anno  
Salutis MCCCCLXXVIII.

The copy which  
Q. bought  
at the Huth  
Sale for  
£36. See  
W.O.'s note  
in Huth  
Catalogue, lot  
1389. (pt. 2)

Sm. folio, Roman letter, 195 leaves (A<sub>8</sub> blank cut away),  
with catchwords and foliation; on Fol. 1a the arms argent  
two bars gules are emblazoned, and on Fol. 10a a large capital  
in gold and colours; several wormholes in blank portions of  
first few leaves carefully repaired and a part of Fol. 10  
mended, several words being filled in, otherwise a fine large  
copy, bound in red morocco gilt, Harleian style, by J. Clarke  
Florence, Nicolo di Lorenzo, 1478

Quaritch.  
Catalogue 321  
'Dec., 1912.'

Sold to  
Coll. of Phys.,  
Phila.

84 0 0

Compare Huth's description &  
W.O.'s note in Huth Catalogue lot 1389.  
(pt. 2). Buy this for £36.00 + send to Coll. Phys. Phila.

From O.O. 2.18.







